



22500280558




Digitized by the Internet Archive
in 2014

<https://archive.org/details/b2041335x>

PHARMACOPOEA

AUSTRIACA.

EDITIO QUINTA.



BIBLIOTHECA
DEL D. P. LABUS

VIENNÆ.

CÆS. REG. AULÆ ET IMPERII TYPOGRAPHIA.

1855.



M15739

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY	
Coll.	Wellcome
Coll.	
No.	Q1740
	. EA8
	1255
	P53

Erllass des Ministeriums des Innern

vom 20. October 1854, Z. 25069, giltig für alle Kronländer,

betreffend

die neue Ausgabe der österreichischen Pharmakopöe.

Ueber die unter dem Titel: „Pharmacopoea austriaca. Editio quinta. Viennae. C. R. Aulæ et Imperii Typographia. 1855“, erschienene neue Ausgabe der österreichischen Pharmakopöe wird verordnet:

1. Vom 1. Jänner 1855 an ist nach dieser neuen Pharmakopöe in allen Apotheken eines jeden Kronlandes zu dispensiren.
2. Sämmtliche Apotheker haben daher sogleich die hiezu erforderlichen Vorbereitungen zu treffen, und sich ein Exemplar der neuen Pharmakopöe anzuschaffen.
3. Alle Sanitätsbeamten, praktischen Aerzte, Wund- und Geburtsärzte, Thierärzte und Apotheker haben sich mit dem Inhalte der neuen Pharmakopöe genau bekannt zu machen und darnach sich zu benehmen.
4. Die Länderstellen werden hiemit beauftragt, die gegenwärtige Verordnung in geeigneter Weise noch besonders zur Kenntniss des ärztlichen Personales und der Apotheker zu bringen.

Freiherr von Bach m. p.

Prooemium.

Pharmacopoea austriaca anno 1836 edita, quae hucusque publica lege-sanciti auctoritate valebat, jam dudum scientiarum naturalium artisque medicae et pharmaceuticae progressibus respondere desiit.

Itaque novam Pharmacopoeam per omnes Imperii terras valentem elaborare consultum fuit.

Quem ad finem Provinciarum gubernacula Tenentes indagare jubebantur, quae medicis et pharmacopolis desiderentur Pharmacopoeae emendationes.

Collegiorum medicinalium in Provinciis et medicorum physicorum aliorumque artis medicae et pharmaceuticae peritorum consilia erant requisita.

Quorum e relationibus C. R. rerum internarum Ministerio transmissis multum quidem boni et praeclari prodierat, tamen postulata quoque enotuerant, quae opinionem singulorum magis, quam utilitatis et salutis publicae rationem sequebantur, aliove respectu Pharmacopoeae limites finemque excedebant.

Ne plus autem, neve minus, quam par ac utile et omnibus aequum esset, promulgetur, Supremum hoc Gubernaculum necessitatem agnovit, novam Pharmacopoeae editionem sub auspiciis Summi rerum medicinalium Regininis concinnandi.

Quâ laboris adminicula consilia rerum peritorum e supra dictis Provinciarum relationibus scaturiebant, et maxima parte ea sese offerebant, quae Collegium medicorum, C. R. rerum internarum Ministerio subordinatum, assumtis egregiis quibusdam medicis et pharmacopolis, proposuit desideranda.

Quo modo novissimis scientiarum medicinalium experiētiis edocta Suprema Auctoritas arsit, illarum desideriiis imperia rei publicae, quantum licuit, accommodare.

Per futuri autem temporis apta intervalla brevīa novas Pharmacopoeae austriacae editiones curare conclusum et consultum est, quarum quaelibet, novis et artis pharmaceuticae et scientiae medicae inventionibus ac emendationibus experientia probatis aucta, cum scientiarum et rei publicae evolutione progrediatur.

Regulae et notationes generales.

§. 1.

Medicamina obligata, quae omni in pharmacopolio praesto esse debent, et medicamina non obligata, quae praesto habere pharmacopola lege non tenetur, quae vero in officina prostantia ad normam generalem parata sint, designantur per Elenchos, quos de his et de illis Provinciae gubernacula Tenens constituit.

§. 2.

Medicamina, quorum dispensatio absque medici legitimi praescriptione inhibita est, signo † notata sunt.

Medicamina, quae a reliquis seclusa, et illa, quae sub clave domini vel ejus vices gerentis asservanda sunt, tabulae in fine additae exhibent.

§. 3.

Praeparata, quae optimae indolis in officinis chemicis inveniuntur, et a pharmacopola majori pretio plurique opera parantur, quam emuntur, quâ praeparata ex officinis chemicis venalia declarabantur. Quae autem genuina, non inquinata, nec corrupta sint oportet.

§. 4.

Nonnulla corpora ad usus domesticos pertinentia, attamen usui quoque medico non raro inservientia recipiebantur, ut noctu aliove momento, quo e mercatorum taberna comparari nequeant,urgerter necessaria in pharmacopoliis saltem reperiantur.

§. 5.

Quocunque nomine, sive alphabetico primario, sive inter synonyma admisso, medicus in formula praescripta usus est, semper pharmacopola id medicamentum dispensare debebit, de quo sub hoc nomine Pharmacopoea agit.

§. 6.

Si medicamentum, quod et crudum et depuratum seu rectificatum in pharmacopoliis prostat, praescripserit medicus, nulla addita illorum distinctione, depuratum seu rectificatum semper dispensetur.

Ita quoque si medicamentum, ejus plures adsunt concentrationis et fortitudinis gradus, sine expressa hujus significatione praescriptum fuerit, dilutum et mitius semper dispensandum est.

§. 7.

Reagentia sub finem operis inducta in omni pharmacopolio omni tempore praesto esse debent.

§. 8.

Medicorum tandem praxim exercentium officium erit singulare, methodi, qua nunc parari jubentur medicamina, horumque inde natae virtutis studio diligenter incumbere. Nam hoc respectu multa hujus Pharmacopoeae praeparata ab iisdem Pharmacopoeae prioris editionis valde sese differunt (quod imprimis de extractis et tincturis quibusdam valet), quia in desiderio et consilio fuit, medicamina praebere virtutis jam minori dosi efficacioris.

1. **Acetum aromaticum.**

Acetum antisepticum. Acetum prophylacticum seu cardiacum. Acetum quatuor latronum.

R̄. Herbae sicc. Absinthii

” **Rutae**
Foliorum Menthae piperitae
” **Rosmarini**
” **Salviae**
Florum Lavandulae
Radicis Angelicae
” **Calami aromatici**

Bulbi Allii

Corticis Cinnamomi

Nucis moschatae

Caryophyllorum

Aceti crudi

Acidi acetici concentrati

*āā drachmas sex,
unciam unam.*

*āā drachmam unam,
libras quatuor,
uncias quatuor.*

Macera per triduum in vase vitreo bene clauso.

Colaturae expressae adde:

Camphorae *drachmas tres,*

in

Spiritus Vini rectificatissimi *uncia una*

solutae.

Stent adhuc per diem, deinde filtrentur.

Sit limpidum, servetur in vasis vitreis, bene obturatis.

† 2. **Acetum Colchici.**

R̄. Bulbi Colchici recentis conscissi *uncias duas,*
Aceti crudi *libram unam.*

Macera in vase vitreo per triduum, deinde cola leni expressione et filtratum serva.

3. **Acetum crudum.**

Acidum aceticum dilutum. Acetum e spiritu vini.

In officinis propriis e spiritu vini aqua diluto ope fermentationis acidae paratum in usum pharmaceuticum emitur. Sit decolor, ab acidis alienis, substantiis acerbis et metallis purum, et ejus aciditatis, ut unciae duae Natri carbonici crystallisati drachmas duas perfecte neutras reddant.

† 4. **Acetum Scillae.**

Acetum scilliticum.

R̄. Bulbi Scillae recentis minutim conscissi *uncias duas,*
Aceti crudi *libram unam.*

Macera in vase vitreo per triduum, leniter expressum cola et filtratum serva.

5. **Acidum aceticum concentratissimum.**

Acetum radicale. Acetum glaciale.

R̄. Natri acetici crystallisati *uncias decem,*
 in sartagine ferrea leni igne semper terendo exsicca, donec massa in pulverem album aequabilem dilapsa fuerit.

Pulverem adhuc calidum immitte in cucurbitam vitream. Affunde:

Acidi sulfurici concentr. puri *uncias sex.*

Cucurbitae cito adjuuge refrigeratorium Liebigianum cum excipulo refrigerato, et destilla balneo arenae donec *unciae tres* transierint.

Destillatum forsitan vel acido sulfuroso, vel hydrochlorico inquinatum digere in vitro bene clauso per aliquot dies saepius agitando super: vel

Mangani hyperoxydati pulv. *drachmas duas,*

vel

Natri acetici siccati

drachman unam,

demum liquorem decantatum rectifica.

Praeparatum in vase vitreo optime clauso serva.

Sit limpidum, odoris fragrantissime acidi, minime empyreumatici vel sulfurosi quid prodens, inflammabile, gravitatis specificae 1,063—1,070, ab acidis alienis et metallis purum.

6. Acidum aceticum concentratum crudum.

Acetum concentratum crudum.

Praeparatum officinarum chemiearum.

Sit decolor, non empyreumaticum, gravitatis specificae 1,040.

7. Acidum aceticum concentratum purum.

Acetum concentratum purum.

R̄. Acidi acetici concentr. crudi

libras quatuor,

digere per aliquot horas eum

Kali bichromici

drachmis duabus,

dein rectifica.

Sit limpidum, coloris expers, odoris minime sulfurosi vel empyreumatici, calore penitus avolet, gravitatis specif. 1,040, vel ejus aciditatis, ut uncia dimidia drachmas tres Natri carbonici crystallisati neutras reddat.

Ne sit empyreumate, acidis alienis vel metallis inquinatum.

8. Acidum benzoicum.

Flores Benzoës. Acidum benzoilicum. Sal acidum seu essentiale Benzoës.

R̄. Benzoës grosse tusae

libram unam.

Immitte in fundum plauum sartaginis ferreae rotundae (diametr. 8—9", altitud. 1—2"). Supra sartaginem expande chartam bibulam laxioris texturae ita, ut marginibus, ope glutinis amylacei firmatis, claudatur. Vasi ferreo impone eonum e charta densiori formatum et apice probe clausum, quem inferne funiculo adliga.

Sartagine tali modo adaptata et in balneum arenae immissa, fiat per quatuor aut sex horas, leni et aequabili igne sublimatio. Post refrigerium cono chartaceo Acidi benzoici crystallulos inhaerentes in vase vitreo serva.

Crystalluli sint foliacei vel aciculares hexagoni, albi vel vix subflavicantes, nitoris margaritacei, tenerrimi et ad halitum fere flexiles, odoris amoene benzoici, saporis modice dulciusculi deinde acidulo aeris, fauces pungentis. Calore liquescant, et denique ebulliendo avolent penitus in fumis pulmones irritantibus. Una pars Acidi benzoici in 200 partibus aquae frigidae et in 25 partibus aquae fervidae, in spiritu vini rectificatissimo facile solvatur.

9. **Acidum boracicum.**

Acidum boricum. Sal acidus Boracis. Sal sedativus Hombergi.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Crystalli sint lamellares hexagones, albae, margaritaceo nitentes, subtenaces, ad tactum pinques, inodoraе, saporis vix perspicue acidi, fere amariuscule, solvantur facile in aqua fervida et in spiritu vini rectificato, hujus flammam viride colorent. — Ne sint acido sulfurico vel hydrochlorico inquinatae. Impurae nova crystallisatione depurentur.

† 10. **Acidum chloro-nitrosum.**

Acidum nitroso-muriaticum. Aqua regia.

Rx. Acidi hydrochlorici concentr.

partes duas,

Acidi nitrici concentr.

partem unam.

Ex tempore parandum.

11. **Acidum citricum.**

Acidum Citri.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Crystalli sint rhombicae, decolores, saporis grate sed vehementius acidi, in aëre immutabiles, temperatura leni fatiscant, calore aucto

liquecant, sub 150° C. decomponentur, in aquae parte aequali facillime solvantur.

Ne sit acido sulfurico, tartarico, ealearia et metallis inquinatum.

+ 12. **Acidum gallicum.**

Sal essentialis gallarum.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Crystalli sint aciculares tenuissime longae, albae, sericeo nitentes, inodorae, saporis styptici, modice aciduli, aëri expositae sub leni calore fatiseant, solvantur in temperatura ordinaria in centum aquae partibus, facilius in spiritu vini et aethere.

Solutio aquosa eum salibus ferri oxydati mixta, colorem induit saturate atro-coeruleum, gelatinam animale non praecipitat.

+ 13. **Acidum hydrochloricum concentratum erudum.**

Acidum muriaticum concentratum erudum. Acidum salis fumans. Spiritus salis fumans.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sit ab arsenico liberum, ponderis specifici 1,160.

+ 14. **Acidum hydrochloricum concentratum purum.**

Acidum muriaticum concentratum purum. Acidum hydrochloratum concentratum. Acidum salis.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sit liquor limpidus, decolor, odoris acidi pungentis, saporis admodum acidi, sine residuo volatilis, ponderis specifici 1,120.

Continet in 100 partibus 24 partes acidi anhydri.

Ne sit arsenico, acidis alienis, metallis vel salibus inquinatum.

15. **Acidum hydrochloricum dilutum purum.**

Acidum muriaticum dilutum. Acidum hydrochloratum dilutum. Spiritus salis acidus.

R \acute{x} . Acidi hydrochlorici concentrati *libram unam.*

Misce cum

Aquae destillatae

libra una.

Sit gravitatis specificae 1,060.

Continet in 100 partibus 12 partes acidi anhydri.

† 16. **Acidum hydrocyanicum.**

Acidum hydrocyanatum. Acidum borussicum.

R. Kalii ferro-cyanati flavi in pulverem triti *unciam semis*,
immitte in cucurbitam vitream, affunde :

Acidi sulfurici concent. puri

drachmas duas,

Aquae destillatae

uncia semis

antea diluti.

Adaptato refrigeratorio Liebigiano et excipulo glacie refrigerato,
cui inest

Aquae destillatae

uncia semis,

fiat destillatio ex balneo arenae ad siccitatem usque.

Liquori in excipulo obtento adde aquae destillatae tantum, ut liquor
in centum partibus contineat acidi hydrocyanici anhydri partes
duas.

Servetur caute in lagenulis vitreis non coloratis, nec ultra dimidium
unciae capacibus, charta atra obduetis, et bene obturatis.

Liquor, admodum venenosus, sit limpidus, decolor, odoris pecu-
liaris narcotici, penitus volatilis, addito liquore kali caustici, ferri sul-
furici et excedente acido hydrochlorico praecipitatum praebeat coe-
ruleum.

† 17. **Acidum nitricum concentratum purum.**

R. Acidi nitrici crudi

libras quatuor.

Immitte in retortam vitream, cui inest

Kali nitrici

uncia una.

Fiat destillatio leni calore in excipulum bene refrigeratum, donec
destillatio cessat.

Liquor primum prodiens seponatur, quamdiu chlori vestigia ope solu-
tionis nitratis argenti deteguntur.

Liquorem postea prodeuntem collige, cum aqua destillata ad pond. specif. 1,300 dilue et in vase epistomio vitreo elauso serva. Sit decolor aut parum flavescens, odoris acidi, saporis eaustici, ex toto volatilis.

Continet in 100 partibus 40 partes acidi anhydri.

Ne sit acido sulfurico, chloro vel salibus inquinatum.

† 18. **Acidum nitricum crudum.**

Praeparatum officinarum ehemicarum.

Sit gravitatis specificae 1,350.

† 19. **Acidum nitricum dilutum purum.**

Aqua fortis.

R. Acidi nitrici concentrati puri

Aquae destillatae

aa libram unam.

Misce.

Sit liquor limpidus, decolor, gravitatis spec. 1,140.

Continet in 100 partibus 20 partes acidi anhydri.

† 20. **Acidum phosphoricum glaciale.**

Praeparatum officinarum ehemicarum.

Sit pellucidum, in aqua omnino solubile, ab acido sulfurico liberum, tantummodo vestigia calceis vel magnesiaae continens.

† 21. **Acidum phosphoricum purum.**

R. Acidi phosphorici glacialis *uncias duas,*
solve in

Aquae destillatae

unciis duodecim.

Liquor saturetur

Gas hydrothionico

et stet dein per aliquot dies in loco calido, ad perfectam sulfureti arsenici praecipitationem.

Postea calefiat ad perfectam gas hydrothionici expulsionem, filtretur et diluatur ad pondus spec. 1,130.

Sit limpidum, decolor, inodorum, saporis mere acidi, solutionem albuminis ne praecipitet, per ammoniam neutrum in solutione argenti nitrici praecipitatum flavum producat.

Ne sit acido sulfurico, nitrico, phosphoroso, arsenico inquinatum, tantummodo vestigia calcariae et magnesia ostendens.

Continet in 100 partibus 15 partes acidi anhydri.

22. **Acidum pyrolignosum.**

Acidum pyroxylicum. Acetum ligni empyreumaticum.

Liquor in officinis chemicis, e lignis imprimis durioribus destillatione sicca paratus, limpidus, fuscus, admodum acidus, odoris empyreumatici, acidum aceticum, kreosotum et alia destillationis siccae producta continens.

23. **Acidum succinicum.**

Acidum succinicum empyreumaticum. Sal Succini.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Crystalli in officinis chemicis e succino paratae, prismaticae, flavescentes, saporis acidi, odorem olei succini spirantes, in aëre haud mutabiles, in temperatura 176° C. liquescunt, calore aucto in fumis pulmones irritantibus penitus avolant.

Solvitur in 25 part. aquae frigidae, in tribus partibus fervidae, in alcohole et aethere.

Servetur in vasis bene clausis. Ne sit adulteratum.

†24. **Acidum sulfuricum anglicanum.**

Acidum sulfuricum concentratum crudum. Oleum Vitrioli anglicanum.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sit pond. specif. 1,840—1,845, ab arsenico liberum.

†25. **Acidum sulfuricum concentratum rectificatum.**

Oleum Vitrioli depuratum.

Rx. Acidi sulfurici anglicani

libras duas.

Immitte ope infundibuli, tubulo longo instructi, in retortam vitream, ejus capacitatis, ut dimidia pars vacua maneat, cavendo ne retortae collum per immissionem liquoris inquinetur.

Additis Platini aliquot filis e retorta arenae imposita et satis deorsum declinata fiat destillatio, commissuris apertis in excipulum. Decima sexta circiter liquidi pars transmissa seponatur, et adaptato novo excipulo antea calefacto continuetur destillatio ad remanentiam *unicarum quatuor*.

Cave ne per ebullitionem nimiam aliquid acidi in retorta contenti in excipulum injiciatur.

Acidum ita rectificatum in langenis epistomio vitreo clausis serva.

Sit olei instar fluens, coloris et odoris expers, peracidum, corrosivum, omnino volatile, grav. spec. 1,845.

In 100 partibus 81 partes acidi anhydri continens.

Ne sit acido nitrico aut nitroso, sulfuroso, arsenico aut metallis inquinatum.

26. **Acidum sulfuricum rectificatum dilutum.**

Spiritus Vitrioli.

R̄. Acidi sulfurici conc. rectificati *unciam unam,*

Aquae destillatae *uncias sex.*

Misce, acidum in aquam lente instillando.

Liquor limpidus, decolor, gravit. spec. 1,090.

Continet in 100 partibus 11 partes acidi anhydri.

† 27. **Acidum tannicum.**

Tanninum.

R̄. Gallarum turcicarum ruditer tusarum *q. v.*

Immitte in infundibulum separatorium vitreum, tubo longo instructum, ad basin gossypio repletum et epistomio suberino elausum; superaffunde:

Miscelae e quatuor voluminibus Aetheris et

uno volumine Spiritus vini rectificatissimi *q. s.*

ut Gallae obtegantur.

Stent per 48 horas in loco frigido.

Dein epistomio suberino remoto collige liquorem guttatim effluentem in lagenam vitream.

Gallis novam portionem ejusdem miscelae infunde et liquidum guttans unacum liquore supra parato evapora in patina porcellanea ampla leni calore ad siccum.

Residuum in pulverem redactum servetur vase bene clauso.

Sit pulvis flavescens, saporis austeri peradstringentis, in aqua et spiritu vini facile solubilis.

Solutio aquosa in solutione gelatinae animalis praecipitatum exhibeat albidum, elastico-tenax.

28. **Acidum tartaricum.**

Acidum Tartari. Sal essenziale Tartari.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Crystalli sint decolores, prismaticae vel tabulae-formes, inodores, saporis cum acerbitate grate aciduli, in aëre immutabiles, in dimidia parte aquae frigidae, difficile in alcohole solubiles, calore aucto sine residuo combustibiles.

Sint ab acido sulfurico, gypso et metallis liberae.

† 29. **Aether aceticus.**

Naphtha aceti. Naphtha seu Aether vegetabilis.

R̄. Natri acetici crystallisati, ad perfectum

siccitatem redacti *uncias sedecim.*

Immitte in cueurbitam vitream et affunde miscelam ex:

Spiritus vini rectificatissimi *unciis sedecim,*

Acidi sulfurici concentrati anglicani *unciis viginti.*

Stet per viginti quatuor horas, dein adaptato refrigeratorio Liebigiano fiat destillatio in excipulum vitreum bene refrigeratum, donec transierint

unciae duodeviginti.

Destillatum conquassa cum

Solutiōnis Natrii chlorati *aequali volumine*

perfecte saturatae.

Liquor aethereus separetur, stet super Calcio chlorato per 24 horas, dein rectificetur balneo aquae et servetur in vasis bene clausis.

Sit liquor limpidus, decolor, odoris proprii grati, ab omni acido liber, penitus volatilis, in aquae destillatae minore quantitate, quam in partibus decem non solubilis, grav. sp. 0,890.

† 30. **Aether crudus.**

Aether sulfuricus crudus.

Praeparatum officinarum chemiearum.

Sit ponderis speciei 0,730.

† 31. **Aether depuratus.**

Aether sulfuricus. Aether Vitrioli. Naphtha Vitrioli.

R. Aetheris crudi

q. v.

Admisce pauxillum kali caustiei soluti ad perfectam neutralisationem.

Totus liquor sine decantatione immittatur retortae vel eueurbitae vitreae, adaptato refrigeratorio Liebigiano eum exepulo vitreo glacie refrigerato, rectificetur in balneo aquae, et servetur vasis vitreis optime clausis in loco frigido.

Sit liquor decolor, limpidissimus, odoris vehementer aetherei, in aquae partibus decem solubilis, eum quavis quantitate spiritus vini miscendus, in temperatura ordinaria facillime avolans vaporibus valde inflammabilibus, in temperatura 36° C. ebulliens, ponderis speciei 0,730.

Aetherem a spiritu vini, oleo vini, et ab acidis liberum esse oportet.

† 32. **Agaricus albus.**

Polypori officinalis Fries (*Boleti Laricis* Jacq.) fungi ex *Hymeniorum pileatorum* subordine, qui Germania australiori et Helvetia truncis ramosis Pini Laricis innascitur, frusta decorticata et siccata, mercabilia.

Sistit frusta variae magnitudinis, levia, spongiosa, tenacia, friabilia, subfarinosa, digitos contractantis inquinantia, odore farinae recentis, saporis subdulis, amaricantis, aeris.

Ab anobiis corrosus rejiciatur.

33. **Agaricus Chirurgorum.**

Agaricus quercinus praeparatus.

Polypori fomentarii Fries fungi ex *Hymenomycetum* subordine, qui per omnem fere Europam mediam in truncis annosis imprimis

Quereuum nascitur, frusta mereabilia, maceratione in aqua et tusione cum malleis ligneis, potissimum in Hungaria, praeparata, in vulgus notissima.

A merce Kali nitrico impraegnata cave.

† 34. **Aloë lucida.**

Aloë socotrina.

Succus induratus e foliis elicitus diversarum specierum generis Aloës (*Aloës vulgaris* Lam. *Al. socotrinae* Lam. *Al. purpurascens* Haw. *Al. spicatae* Thunb. *Al. arborescens* Miller etc.) plantarum e *Liliacearum* ordine, quae in Africa australi et India orientali occidentaliq[ue] nascuntur. Sistit frusta variae magnitudinis verniceo nitentia, e fusco viridique purpuraseentia, fractura lucida, ad margines subdiaphana, in calore mollescentia, in frigore friabilia, pulverem flavum, odoris nauseosi, saporis amarissimi, aromatici, largientia.

Solvitur majore ex parte in aqua, fere ex toto in spiritu vini. Rejiciatur Aloë caballina, fere atra, foliorum fragminibus, et mucosissimo sordida.

35. **Alumen crudum.**

Sulfas Aluminae et Lixivae cum aqua.

Sal in officinis chemicis paratum, sistit crystallos octaëdricas, decolores, pellueidas, inodoras, saporis styptico-subduleis. In aëre paululum fatiscit, leni calore aqua evaporata in massam spongiosam (Alumen ustum) abit, calore aucto decomp[on]itur.

Solvitur in 18 partibus aquae frigidae.

Ne sit Oxydo ferri vel Alumine ammoniacali inquinatum.

36. **Alumen ustum.**

Alumen calcinatum seu spongiosum. Sulfas Aluminae et Lixivae anhyder.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Massam sistit amorpham, albissimam, levem, spongiosam, parum adstringentem. Aëri per longius tempus exposita, humoribus attractis, omnino solvitur.

Servetur in loco sicco.

Cave ab alumine nimio calore usto, qui emissam praeter aquam etiam acidi sulfurici partem perdidit.

37. **Ammoniacum.**

Gummi Ammoniacum.

Gummiresina *Umbelliferarum* nondum bene cognitarum in Oriente crescentium, sistit glebas vel grana opaca, extus flava intus albida, pingui splendentia, duriuscula, fragilia, calore mollescentia, difficulter et nonnisi frigore in pulverem redigenda, odoris peculiaris, ingrati, saporis acris.

Rejiciantur cum reliquis mixta grana nigricantia, fere inodora.

†38. **Ammonia pura liquida.**

Spiritus salis ammoniaci causticus. Liquor Ammonii caustici.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sit limpidus, decolor, odoris penetrantis ammoniacalis, saporis acris, caustici, ex toto volatilis, ponderis specif. 0,960.

Sit liber ab acido carbonico, sulfurico, chloro, metallis et partibus empyrenematicis.

Continet in 100 partibus 10 partes Ammoniac purae.

39. **Ammonium aceticum solutum concentratum.**

Liquor Ammonii acetici concentratus. Acetas Ammoniae solutus concentratus.

Rx. Acidi acetici concentrati *uncias octo.*

Ingere

Ammonii carbonici siccii in pulverem triti *uncias duas v. q. suf.*
ad perfectam neutralisationem.

Repone in locum tepidum ad perfectam gas carbonici evolutionem, deinde adde:

Aquae destillatae

q. s.

ut liquor sit pond. specif. 1,050, decolor, limpidus, odoris et saporis minime empyreumatici, sed salini, subpungentis, ex toto volatilis, acidi excedentis tantum vestigia praebens.

40. **Ammonium aceticum solutum dilutum.**

Spiritus Mindereri. Acetas Ammoniae solutus dilutus. Liquor Ammonii acetici dilutus.

R. Ammonii acetici soluti concentrati

unciam unam,

Aquae destillatae

uncias quatuor.

Misce.

Sit gravitatis specificae 1,010.

Ex tempore v. nonnisi minori quantitate paretur.

41. **Ammonium carbonicum pyro-oleosum solutum.**

Spiritus Cornu Cervi rectificatus. Carbonas Ammoniae pyro-oleosus solutus. Liquor Ammonii carbonici pyro-oleosi.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Liquorem venalem destillationi subijce, donec dimidia pars elicita fuerit.

Sit liquor limpidus, flavesceus, odore ammoniacali, empyreumatico, ex toto volatilis, ponderis specifici 1,060.

42. **Ammonium carbonicum siccum.**

Alkali volatile siccum. Carbonas Ammoniae alcalinus.

Paratur in officinis chemicis, sal in massis albis subcrystallinis, fibrosis, superficie pulverulentis et in aëre partim avolantibus. Odor nares faucesque irritans, sapor alcalinus acris.

Sit in igne penitus volatilis, a metallis, salibus et empyreumate liberum.

Solvitur in aquae frigidae partibus tribus, in spiritu vini fere insolubilis est.

Servetur in vasis bene clausis.

43. **Ammonium carbonicum solutum.**

Carbonas Ammoniae solutus. Liquor Ammonii carbonici. Spiritus salis ammoniaci aquosus.

R. Ammonii carbonici *unciam unam,*
solve in

Aquae destillatae frigidae *unciis quatuor.*

Sit liquor limpidus, decolor, ex toto volatilis.

44. **Ammonium chloratum crudum.**

Sal ammoniacum crudum. Ammonium muriaticum crudum. Murias Ammoniae.

Sal in officinis chemicis paratus, prostat in crystallis vel placentis convexo-concavis, crystallino-fibrosis, albis, pellucidis, duris, inodoris, saporis salini, pungentis, vix mutatur in aëre, solvitur in aquae frigidae partibus circiter tribus, et in fervidae pondere fere aequali, igne avolat.

45. **Ammonium chloratum depuratum.**

Sal ammoniacum depuratum. Flores salis ammoniaci simplices. Murias Ammoniae purus. Ammonium muriaticum depuratum.

R. Ammonii chlorati crudi *q. v.*
solve in

Aquae destillatae calidae *quantitate sufficiente.*

Solutionem filtra et in crystallos redige.

Crystallos albissimas bene siccatas serva.

Sint a salibus, metallis et empyreumate liberae.

46. **Ammonium chloratum ferratum.**

Ammonium muriaticum martiatum. Flores salis ammoniaci martiales. Murias ferri ammoniacalis. Sal ammoniacum martiatum.

R̄. Ammonii chlorati depurati
Ferri sesquichlorati crystallis.

uncias sex,
uncias duas et dimidiam,

solve in

Aquae destillatae *s. q.*

Liquidum filtratum in vase porcellaneo in balneo aquae et continua agitatione ad siccitatem usque evapora, et in pulverem contere.

Servetur in vase bene clauso loco obscuro.

Sit pulvis subcrystallinus, aurantiacus, saporis austeri pungentis, in aëre humescens, in aqua penitus solubilis.

47. **Ammonium succinicum pyro-oleosum.**

Spiritus Cornu cervi succinatus. Liquor Ammonii succinici.

R̄. Ammonii carbonici pyro-oleosi soluti *uncias sex,*
Acidi succinici *unciam unam,*

vel quantum requiritur ad saturationem.

Filtratum serva in vase optime clauso.

Sit liquor limpidus, flavescens, per aetatem fuscescens, neuter, in calore totus volatilis, saporis salsi, pungentis, odoris ammoniacalis et olei succinici empyreumatici.

Sit sponderis specifici = 1,08.

48. **Amygdalae amarae.**

Amygdali communis Linn. arboris in Syria et Africa boreali sponte crescentis, apud nos in vineis et hortis cultae, ex ordine *Amygdalearum*, semina ovata, compressa; constant ex integumento membranaceo, luteo-fusco, longitudinaliter rugoso-striato, pulverulento scabro; et ex embryone albo, carnoso, in cotyledones duas plano-convexas secedente, radícula minima, recta.

Sunt saporis amarissimi, odoris fere nullius, digitis autem cum paululo aquae tritae, odorem spargunt gratum proprium aethereum.

49. **Amygdalae dulces.**

Semina varietatis hortensis *Amygdali communis* Linn. ab amygdalis

amaris eharacteribus externis nullo modo diversa, sed amari principii omnino expertia, sapore dulei distinguenda.

† 50. **Amygdalinum.**

Praeparatum officinarum chemiearum.

Servetur in vase vitreo bene elauso.

Sistit erystallos albas, inodoras, in aqua et spiritu vini fervido faeile, in spiritu vini frigido difficulter, in aethere non solubiles. In emulsione amygdalarum dulcium solutae, odorem peeuliarem olei amygdalarum amaranum exhalant.

Amygdalini grana septemdecim in emulsione amygdalarum dulcium soluta respondent eireiter Aeidii hydroeyaniei anhydri grano uni.

Ne sit odoris rancidi.

51. **Amylum Marantae.**

Arrow-root.

Amylum e cellulis rhizomatis *Marantae arundinaceae* Linn. plantae *Cannacearum* ordinis in insulis Antillanis ereescentis separatum, pulverem sistit albissimum, impalpabilem, inodorum, insipidum, addito jodo coeruleum eolorem assumentem.

Amyli Marantae grana decem cum aquae bullientis uneis duabus massam praebent mueilaginosam, pellueidam. Eadem Amyli Solani tuberosi quantitas eodem modo tractata eundem eharacterem exhibet. Eadem vero Amyli Tritiei quantitas eodem modo traetata sistit massam eohaerentem mueilaginosam turbidam.

Amylum Solani tuberosi cum Acidi hydrochloriei concentrati parte aequali mixtum et aqua dilutum, odorem herbaceum, leguminum faseoli recentium eonscissorum odori comparandum exhalat.

52. **Amylum Tritiei.**

Amylum e seminibus *Tritici sativi* Linn. ex ordine *Graminearum* in officinis propriis separatum, venditur in frustis parvis, faeillime in pulverem redigendis. Et siccum et aqua fervida mixtum odoris plane expers sit.

† 53. **Aqua amygdalarum amararum concentrata.**

R̄. Amygdalarum amararum *libram unam.*

Contusione et expressione sine calore ab oleo liberatis affunde

Aquae communis *libras quinque,*

macera per duodecim horas et destillando

abstrahe *libram unam.*

Aquam elicitam bene agita ad olei solutionem, oleum forsitan non solutum separa.

Servetur in lagenulis vitreis bene obturatis, loco obscuro et frigido.

Sit aqua limpida vel parum lactescens, odoris amygdalarum amararum penetrantis atque ejusdem saporis; uncia una hujus aquae praebeat grana tria praecipitati Argenti cyanati.

54. **Aqua amygdalarum amararum diluta.**

R̄. Aquae amygd. amarar. concentr. *unciam dimidiam,*

Aquae destillatae *uncias duodecim.*

Ex tempore paranda.

55. **Aqua Anisi.**

R̄. Seminum Anisi vulgaris contusorum *libram unam,*

Aquae communis *libras decem.*

Macera per duodecim horas et abstrahe *libras sex.*

56. **Aqua antihysterica foetida.**

Aqua foetida Pragensis.

R̄. Galbani *unciam unam,*

Asae foetidae *unciam unam et dimidiam,*

Myrrhae *drachmas sex.*

Radicis Valerianae officinalis

„ **Zedoariae** *aa uncias duas,*

„ **Angelicae** *unciam dimidiam,*

Foliorum Menthae piperitae *unciam unam et dimidiam,*

Herbae Serpylli

Florum Chamomillae roman. *āā unciam unam,*
Castorei *drachmam unam.*
 Conscissis, contusis et in retortam immissis affunde :
Spiritus vini rectificati *libram unam et dimidiam.*
 Stent per viginti quatuor horas, tunc affunde :
Aquae communis *q. s.*
 et fiat destillatio *librarum trium.*
 Sit turbida, graveolens, ab oleo aethereo supernatante libera.

57. **Aqua aromatica spirituosa.**

Balsamum embryonis.

R. Florum Lavandulae
Foliorum Salviae
 „ **Melissae**
 „ **Menthae crispae** *āā uncias quatuor,*
Nucis moschatae
Caryophyllorum
Macidis
Corticis Cassiae Cinnamomeae
Radicis Zingiberis
Seminum Foeniculi *āā uncias duas.*
 Conscissis et contusis affunde :
Spiritus vini rectificati *libras quatuor,*
Aquae communis *libras viginti.*
 Post macerationem duodecim horarum abstrahe
 libras sexdecim.

58. **Aqua Aurantiorum florum.**

Aqua Naphae.

Praeparatum officinarum chemicarum.
 Metallis inquinata rejicienda.

59. **Aqua calcis.**

Aqua Calcariae.

R. Calcis vivae recenter ustae *libram unam,*

consperge in vase fictili

Aquae communis

unciis circiter sex,

post plenam extinctionem admiscee

Aquae communis

libras triginta.

Serva in vase vitreo, interdum agitando.

Ante usum aquam limpida a sedimento defunde, et filtratam exhibe.

Liquor limpidus, saporis alcalini.

60. **Aqua carminativa simplex.**

R. Florum Chamomillae romanae

libram semis,

Corticum Aurantiorum

„ **Citri**

Foliorum Menthae crispae

Seminum Carvi

„ **Coriandri**

„ **Foeniculi**

an unciam unam et semis,

conscissis et contusis affunde:

Aquae communis

libras sexdecim,

post macerationem viginti quatuor horarum abstrahere

libras octo.

61. **Aqua carminativa regia.**

R. Aquae carminativae simplicis

libram unam et semis,

Spiritus aromatici

libram dimidiam,

Sacchari albi

uncias tres,

Coccionellae

drachmam dimidiam.

Misce, et post digestionem viginti quatuor horarum filtra.

Filtratum conserva.

62. **Aqua Carvi.**

Paretur e seminibus Carvi contusis, ut Aqua Anisi.

63. Aqua Castorei.

R̄. Castorei europaei conscissi	<i>unciam unam et semis,</i>
Aquae communis	<i>libras septem,</i>
Spiritus vini rectificati	<i>libram unam;</i>
abstrahe	<i>libras sex.</i>

64. Aqua cerasorum nigrorum.

R̄. Nucleorum cerasorum nigrorum silvestr.	
contusorum	<i>libras duas,</i>
Aquae communis	<i>libras octo.</i>
Macera per viginti quatuor horas saepius agi-	
tando, deinde abstrahe	<i>libras quatuor.</i>

65. Aqua Chamomillae.

R̄. Florum Chamomillae vulg. siccator.	<i>libram unam,</i>
Aquae communis	<i>libras duodecim;</i>
abstrahantur	<i>librae quatuor.</i>

66. Aqua Chlori.

Chlorina liquida. Aqua oxymuriatica. Liquor Chlori.

R̄. Acidi hydrochlorici venalis	<i>uncias tres,</i>
Aquae communis	
Mangani hyperoxydati nativi pulverati	<i>aa unciam unam.</i>

Immitte in cucurbitam vitream satis capacem, et junge cum duobus excipulis Woulfianis, quorum primum continet:

Aquae communis	<i>unciam unam,</i>
alterum:	

Aquae destillatae	<i>libras duas.</i>
--------------------------	---------------------

Fiat leni igne destillatio, donec Chlorum non amplius evolvitur.

Liquor in primo excipulo contentus effundatur, liquor alterius in vasis bene obturatis loco frigido et obscuro servetur.

Sit liquor flavescens, odoris suffocantis, saporis nauseosi, styptici, colores vegetabiles destruat.

67. Aqua Cinnamomi simplex.

R. Corticis Cassiae Cinnamomeae contusi *libram unam,*
 Aquae communis *libras duodecim.*
 Macera per duodecim horas, deinde abstrahe *libras sex.*

68. Aqua Cinnamomi spirituos.

R. Corticis Cassiae Cinnamomeae contusi *libram unam,*
 Aquae communis *libras quinque,*
 Spiritus vini rectificati *libram unam.*
 Macera per duodecim horas, tum abstrahe *libras tres.*

69. Aqua Cochleariae.

R. Foliorum Cochleariae recentium *libram unam,*
 Aquae communis *libras octo ;*
 abstrahantur *librae quatuor.*

70. Aqua destillata simplex.

R. Aquae communis *q. v.*

Fiat lege artis destillatio ex vesica optime mundata, ita ut liquidi duodecima circiter pars primum in excipulum stillans rejiciatur, deinde destillatio tandiu continuetur, donec totius aquae adhibitae tres fere quadrantes in excipulum transmissae fuerint.

71. Aqua Foeniculi.

Paretur e seminibus Foeniculi contusis, ut Aqua Anisi.

72. Aqua Fragorum.

R. Fragorum maturorum *libram unam,*
 Aquae communis *libras octo ;*
 abstrahere *libras quatuor.*

73. Aqua Juniperi.

Paretur e baccis Juniperi maturis contusis, ut Aqua Anisi.

74. Aqua Kreosoti.

R̄. Kreosoti	<i>grana viginti,</i>
solve agitando in:	
Aquae destillatae	<i>mucis quatuor.</i>
Filtratum exhibe.	
Ex tempore paranda.	

75. Aqua Lavandulae.

Paretur e floribus Lavandulae siccatis, ut Aqua Chamomillae.

† 76. Aqua Laurocerasi.

R̄. Foliorum Laurocerasi recentium con-	
scissorum	<i>libram unam,</i>
Aquae communis	<i>libras tres;</i>
abstrahe	<i>libram unam.</i>

Oleo deposito per conquassationem soluto, serva in lagenulis e vitro nigro, vel nigro obductis, bene obturatis, in loco frigido.

Aqua subtrubida, odore et sapore penetrante Amygdalarum amararum, ejus concentrationis, ut uncia una ad minimum tria grana Argenti cyanati praebeat.

77. Aqua Melissa.

Paretur e foliis Melissa siccatis, ut Aqua Chamomillae.

78. Aqua Menthae crispae.

Paretur e foliis Menthae crispae siccatis, ut Aqua Chamomillae.

79. Aqua Menthae piperitae.

E foliis Menthae piperitae siccatis paretur, ut Aqua Chamomillae.

80. Aqua Persicae foliorum.

R̄. Foliorum Persicae recentium	<i>libram unam.</i>
Aquae communis	<i>libras octo;</i>
abstrahe	<i>libras quatuor.</i>
Servetur in lagenis vitreis nigro obductis, bene clausis, loco frigido.	

81. Aqua Petroselini.

Paretur e radice Petroselini cum herba recenti, ut aqua Cochleariae.

† 82. Aqua phagedaenica decolor.

Liquor mercurialis.

R̄. Hydrargyri bichlorati corrosivi	<i>grana sedecim,</i>
Ammonii chlorati depurati	<i>drachmam unam,</i>
Aquae destillatae	<i>libras quatuor.</i>
Solve, filtra et conserva in lagena vitrea.	

† 83. Aqua phagedaenica lutea.

R̄. Hydrargyri bichlorati corrosivi	<i>drachmam unam,</i>
Aquae calcis	<i>libram unam.</i>
Misce. Ex tempore paranda.	

† 84. Aqua plumbica.

Aqua saturnina. Plumbum acetieum basicum solutum dilutum.

R̄. Aquae destillatae	<i>libram unam,</i>
Plumbi acetici basici soluti	<i>drachmas duas.</i>
Ex tempore paretur.	

85. Aqua Rosarum.

R̄. Florum Rosarum sale conditorum	<i>libram unam,</i>
Aquae communis	<i>libras octo;</i>
abstrahe	<i>libras tres.</i>

86. Aqua Rutae.

Paretur ex herba Rutae siccata, ut Aqua Chamomillae.

87. Aqua Rubi Idaei.

Paretur e baccis Rubi Idaei recentibus, ut Aqua Fragorum.

88. Aqua Salviae.

Paretur e foliis Salviae siccatis, ut Aqua Chamomillae.

89. Aqua Sambuci.

Paretur e floribus Sambuei siccatis, ut Aqua Chamomillae.

90. Aqua Tiliae.

Paretur e floribus Tiliae siccatis, ut Aqua Chamomillae.

91. Aqua Valerianae.

Paretur e radice Valerianae siccata, ut Aqua Chamomillae.

† 92. Aqua vegeto-mineralis Goulardi.**Aqua Goulardi.**

Ry. Plumbi acetici basici soluti	<i>drachmas duas,</i>
Aquae communis	<i>libram unam,</i>
Spiritus vini rectificati diluti	<i>unciam unam.</i>
Ex tempore paretur.	

93. Aqua vulneraria acida Thedenii.**Aqua Thedenii.**

Ry. Aceti erudi	<i>libras tres,</i>
Spiritus vini rectificati	<i>libram unam et dimidiam,</i>

Acidi sulfurici diluti
Mellis despumati
 Miscé et filtratum serva.

libram dimidiam,
libram unam.

94. **Aqua vulneraria spiritiosa.**

Aqua vulneraria cum alcohole.

R̄. Florum Lavandulae

Herbae Hyssopi

„ **Origani**

„ **Rutae**

„ **Serpylli**

Foliorum Melissa

„ **Menthae crispae**

„ **Rosmarini**

„ **Salviae**

aa unciam unam,

conscissis affunde:

Spiritus vini rectificati

uncias decem,

Aquae communis

libras duodecim.

Post macerationem duodecim horarum abstrahere *libras decem.*

95. **Argentum foliatum.**

Argentum in lamellas tenuissimas ductum.

Ne sit metallis alienis inquinatum.

† 96. **Argentum nitricum crystallisatum.**

Nitras Argenti.

R̄. Argenti puri

q. v.

solve leni igne in:

Acidi nitrici diluti puri

quantitate sufficiente.

Solutionem decolorem filtra, evapora, et ad crystallos formandas in locum frigidum sepone.

Muriam iterato evapora, donec crystalli non amplius concreseant.

Crystallos eum pauxillo aquae destillatae ablutas et siccatas in vitro serva.

Crystalli tabulaeformes, inodorae, neutrae, saporis metallici amaricantis, in aëre non mutantur, leni igne liquefiunt, aucto destruuntur, materies organicas colore nigro inquinant et destruunt, in aqua et spiritu vini facile solvuntur.

Sint liberae ab omni oxydo metallico alieno.

† 97. **Argentum nitricum fusum.**

Lapis infernalis.

R̄. Argenti puri

q. v.

Solve leni igne in:

Acidi nitrici diluti puri

quantitate sufficiente.

Solutionem leni igne evapora in vase porcellaneo ad siccitatem, dein ignem sensim auge, donec olei instar fluxerit, et liquidum modulo ferreo prius bene mundato et calefacto infunde, ut refrigeratione bac-
cillorum formam habeat.

Baccilli in vase bene clauso servandi sint albi vel cinerescentes, fractura crystallina e centro radiata, caeterum eosdem characteres exhibeant cum Argento nitrico crystallisato.

98. **Argentum purum.**

R̄. Argenti

q. v.

solve in:

Acidi nitrici diluti puri

quantitate sufficiente.

Solutionem dilue cum:

Aquae communis

q. s.

Deinde instilla:

Acidum hydrochloricum crudum,

quamdiu praecipitatum album gignitur, quod aqua destillata calida perfecte edulea, edulcato affunde:

Aquae destillatae,

cum parva quantitate

Acidi hydrochlorici mixtae,

q. s.

ut praecipitatum bene obtegatur, et adde immergendo lamellam ferri puri. Stent tamdiu, donec praecipitatum album in colorem cinereum penitus mutetur.

Deinde lamella ferri separata, Argentum praecipitatum primum cum parva quantitate acidi hydrochlorici diluti et postea cum aqua destillata penitus edulcetur.

Argentum purum inde prodiens sicca.

Est pulvis nigro-cinereus.

Sit liberum a metallis alienis.

† 99. **Arsenicum album.**

Acidum arsenicosum. Oxydum Arsenici album.

In officinis metallurgicis paratum, prostat in massis compactis, ponderosis, albis, vel pellucidis, vel opacis, inodoris, difficile in aqua solvendis, calore fumum album emittentibus, super prunas odorem alliaceum spargentibus.

Venenum perniciosissimum, caute prae caeteris servandum, et quidem sub domini clave, loco a reliquis pharmacis plane remoto.

100. **Asa foetida.**

Gummi-resina Asae foetidae.

Succus lacteus solis calore induratus, e radice stirpis vulnerata *Ferulae asae foetidae* Linn. ex *Umbelliferarum* ordine, in Persia meridionali crescentis, collectus.

Sistit glebas e granis variae magnitudinis, sublucidis, ochroleucis, albidis, roseo-fuscis, purpurascentibusque compactas, odoris vehementissime alliacei, saporis peculiaris, cum aliqua acredine leviter amaricantis.

Frigore in pulverem lutescentem friabilis, calore tenax, subglutinosa, sub digitis lentescens. Cum aqua fontana liquorem lacteum praebet, in spiritu vini ultra dimidiam partem solvatur.

Pulvis hieme tritus, et ab immixtis quisquilliis ope cribri setacei ad hoc destinati purgatus, servetur intra chartam loco non nimis calido et sicco.

† 101. **Atropinum.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Exhibet crystallos albas, tenuissimas, plerumque in glomerula con-

voluntas, Chinino sulfurico vix dissimiles, saporis amarissimi aeris. In temperatura 90° C. liquescit, in temperatura 140° C. ex parte sublimatur, in aquae fervidae partibus tercentis, in viginti quinque partibus aetheris, facillime in alcohole solvitur. Solutio aquosa fortiter alcaline reagit.

Sit ab inquinamentis purum.

† 102. **Aurum natronato-chloratum.**

Aurum natronato-muriaticum. Murias Auri et Sodae.

R̄. Auri puri *drachmam,*
solve in

Aquae regiae *s. q.*

Solutionem in balneo aquae ad siccum evapora, tunc admisce:

Natrii chlorati *grana octodecim.*

Mixtionem solve in

Aquae destillatae *sufficiente quantitate.*

Iterum in balneo aquae ad siccum evapora, contere, et in vase vitreo optime clauso in locum obscurum reponc. Sit pulvis aurantiacus, in aëre haud mutabilis, saporis metallico-acris, in igne candente praeter aurum sal relinquens.

In decem granis circiter quinque grana auri puri, vel circiter octo grana auri chlorati continet.

103. **Aurum praecipitatum purum.**

R̄. Auri *q. v.*
solve in

Aquae regiae *q. s.*

solutionem evapora leni calore fere ad siccum. Tunc solve in

Aquae destillatae *sufficiente quantitate,*

filtra, praecipita cum

**Solutione Ferri sulfurici puri frigide et
ex tempore parata.**

Praecipitatum digere primo cum:

Acido hydrochlorico diluto,

dein cum:

Aqua destillata

bene eduleatum sieca.

Sit a metallis alienis liberum.

104. Axungia porcina.

Pinquedo e mesenterio *Suis Scrofae* Linn. a partibus membranaceo-cellulosis leni calore separata et aqua elota, unguenti fere econsistentia, homogenea, nivea, inodora, saporis blandi.

105. Baccae Ebuli.

Fruetus baecati reeentes *Sambuci Ebuli* Linn. suffrutieis ereeti, in ruderatis subsylvatieis Europae mediae crescentis, ex *Caprifoliacearum* ordine, mensibus Septembris et Octobris apud nos maturi, subglobosi, apice depresso umbilicati, epidermide nigrieante, nitidula, glabra; parenchymate sueeulento, violaece-rubro; odore nauseoso; sapore acidulo amaro.

Cave, ne baccae immaturae colligantur, vel nimis maturae, parenchymate fere exsuceo, maturis nimis multae sint admixtae.

106. Baccae Juniperi.

Galbuli earnosi siecati *Juniperi communis* Linn. fruticis apud nos monticoli, e *Coniferarum* ordine, globosi, pisi magnitudine, apice gibbis tribus notati; integumento exteriore in reeentibus nigro-violaeceo nitido, in sieeatis nigro; parenchymate pulposo, bruneo, demum spongioso; odore grato balsameo; sapore subduli et eum aliqua amaritudine aromatico.

107. Baccae Lauri.

Lauri nobilis Linn. arboris Europae australis ex ordine *Laurinearum* baccae maturae exsiceatae, eerasi magnitudine, ovatae, fuseo-nigrae, rugoso-reticulatae, monospermae. Odor peculiaris laurinus, sapor amarus eum modico aromate.

108. **Baccae Mori.**

Fructus carnosī (syncarpia) *Mori nigrae* Linn. arboris apud nos passim cultae, e *Morearum* ordine, conico-subglobosi; e baccis spuriis plurimis inter se connatis, nigrescentibus, nitidis, parenchymate succulento, grate acidulo gravibus, compositi.

109. **Baccae Phytolaccae.**

Phytolaccae decandrae Linn. plantae *sui ordinis* in America boreali indigenae, nunc in Europa calidiore efferatae et cultae baccae atro-violaceae, succo purpureo scatentes, globoso-depressae, decemsuleatae.

110. **Baccae Ribis.**

Fructus carnosī recentes *Ribis rubri* Linn. fruticis hortensis e *Ribesiacearum* ordine, cuivis noti, globosi, vertice umbilico emarecido notati; epidermide subdiaphana, rubra, glabra, parenchymate succulento rubro, subdulci, acidulo-vinoso scatente.

111. **Baccae Rubi Idaei.**

Fructus baccati *Rubi Idaei* Linn. fruticis e *Rosacearum* ordine, apud nos silvestris et etiam in hortis culti, ex acinis monospermis, succulentis, in conum hemisphaericum, basi cavum collectis, compositi; acinorum epidermide rubra, subpruinosa; parenchymate suaveolente, e dulci grate acidulo.

Baccae fruticis silvestris majorem acidi et aromatis copiam, cum minori sacchari quantitate continentes, hortensibus praeferendae.

112. **Baccae Sambuci.**

Fructus baccati recentes *Sambuci nigrae* Linn. arbusculae e *Caprifoliacearum* familia ubique apud nos obviae, Septembri et Octobri mensibus maturi; epidermide violaceo-nigricante, odore singulari et sapore grate acidulo a baccis Sambuci Ebuli facillime distinguendi.

† 113. **Baccae Spinae Cervinae.**

Baccae maturae recentes *Rhamni cathartici* Linn. fruticis nostratis sylvestris, e *Rhamnearum* ordine, Octobri maturae, globosae, pisi fere magnitudine, laeves, nitidae, bitetraspermae, epidermide nigra, parenchymate rubro, sapore amaro-acri.

114. **Balsamum Copaivae.**

Succus aethereo-resinosus, ex incisio truncis arborum Americae meridionalis imprimis Brasiliae interioris, generis *Copaifera* Linn. ordinis *Caesalpinearum*, effluens, pellucidus, flavus, olei pinquis consistentia, odoris proprii, fragrantis, saporis cum aliqua acredine amaricantis, inflammabilis, in spiritu vini rectificato, aethere et oleis penitus solubilis.

Nec Terebinthina nec oleis pinguibus adulteratum sit.

115. **Balsamum peruvianum nigrum.**

Succus aethereo-resinosus, e *Myrospermi pubescentis* Ruiz, arboris e *Papilionacearum* ordine, Americae tropicae australis, cortice laeso effluens, nigro-fuscus, in guttis singulis fusco-ruber, diaphanus, syrupi instar lentus, tactu digitos inquinans, vix tenax, in aëre minime siccescens, odoris gratissimi, qualem fere Vanilla et Benzoë redolent, saporis aromatici, subamari et acris diu haerentis.

Solvitur fere in spiritus vini rectificati partibus quinque, cum aqua destillatum oleum aethereum non praebet, flammae admotum minime ardet, aquae injectum subsidet.

Merx genuina a plurimis modis adulterata, characteribus indicatis facile distinguitur.

116. **Balsamum vitae Hoffmanni.**

R̄. Olei Lavandulae

„ Majoranae

„ Citri

„ Caryophyllorum

aa scrupulum unum,

Olei Macidis„ **Succini rectificati***an scrupulum dimidium.*„ **Cinnamomi***guttos quinque,***Balsami peruviani***drachmam dimidium,***Spiritus aromatici***libram unam.*

Stent in digestionem per aliquot dies, dein miscela bene saturata
filtretur et servetur.

+ 117. Baryum chloratum.**Baryta muriatica. Terra ponderosa salita.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sint crystalli albae, tabulaeformes vel lamellares, saporis cum notabili
acredine acerbis, in aëre non mutantur, in aquae frigidae partibus duabus
et dimidia, in fervidae una et dimidia parte solvantur, in aethere
insolubiles.

Sint a Calce, Strontiano et omni inquinamento metallico liberae.

118. Benzoë.**Resina Benzoës. Asa dulcis.**

Resina indurata, e *Styracis Benzoin* Dryand. arboris e *Styracinearum*
ordine, in insulis Sumatra et Borneo crescentis, cortice ad lignum usque
inciso manans; adfertur in frustulis albis, adiposo-splendentibus, solutis
vel substantia rubro-fusca compactis, partim pellucidis, partim luci imper-
viis, odoris imprimis dum calefit gratissimi, saporis subdulcis pungentis.

In spiritu vini rectificato facile solubilis, relictis partibus heterogeneis
admixtis, quibus plus minus inquinata est.

119. Bismuthum.**Marcasita.**

E mineris Bismuthi in officinis metallurgicis liquatum massas exhibet
amorphas structura foliacea, vel crystallos regulariter octaedricas,
rubicundo-exalidas, metallice nitentes, gravit. specific. 9,822.

Solvitur in acido nitrico, igne leni liquecit, et facile in pulverem
redigitur.

† 120. **Bismuthum subnitricum.**

Bismuthum nitricum praecipitatum. Magisterium Bismuthi.

R. Bismuthi pulverati *libram unam,*
 Kali nitrici depurati *unciam unam.*

Misce et in crucibulo inter agitandum per quadrantem horae leni igne fluant.

Metallum in aquam effusum a scoriis separa.

Nuncingere in cucurbitam vitream

Acidi nitrici concentrati *uncias quatuor et dimid.*
 et immitte sensim

Bismuthi ut supra depurati et grosse tusi *uncias duas, vel quantum in acido leni calore solvitur.*

Solutionem decantatam misce cum

Aquae destillatae *libris duodecim.*

Praecipitatum inde ortum filtrando separa, et cum

Aquae destillatae frigidae *parva quantitate*
 ablutum leni calore loco umbroso sicca.

Sit pulvis albissimus, subcrystallinus, inodorus, acido nitrico diluto sine effervescencia solubilis.

Sit ab arsenico liberum.

121. **Bolus armena.**

Argillae species, ferro oxydato gravis, ex insula Lemnos (Stalymene), occurrit in frustis amorphis fusco-rubris, levibus, tactu pinguibus, digitos inquinantibus, odoris argillacei, saporis terreo-subausteri. Aquae immersa cum strepitu dissiliat et cum acidis non effervesca.

122. **Bulbus Allii.**

Bulbus *Allii sativi* Linn. plantae *Liliaceae* ubicunque cultae, subrotundus; epidermide chartacea, alba, parenchymate albo, carnoso, scatente succo mucilaginoso sublactescente, odoris peculiaris vehementis notissimi, saporis cum aliqua dulcedine acris.

† 123. **Bulbus Colchici.**

Bulbus recens *Colchici autumnalis* Linn. plantae e *Melanthacearum* ordine in pratis subsylvaticis ubique apud nos crescentis, solidus, subconicus, hinc convexus inde planus, et sulco profundo bulbillum floriferum excipiente exaratus, tunicis subcoriaceis flavo-fuscis involutus, intus albus, odoris inamoene raphanacci, saporis amaricantiduleis, aeris.

Collige bulbos tempore plantae florentis, et adhuc recentes, a tunicis et adhaerentibus fibris radicalibus purgatos, ad praeparanda pharmaca adhibe.

† 124. **Bulbus Scillae.**

Bulbus *Scillae maritimae* Linn. plantae ex ordine *Liliacearum*, in Europae mediterraneae littoribus crescentis, pugni mole, ovato-ventricosus, e tunicis imbricatis, rubris vel albidis, scabiosis, basi carnosus, placentam centalem solidam ambientibus formatus.

Servatur recens, arena tectus, loco frigido; vel habentur squamae in aëre siccatae, fragiles, in vitris clausis.

Recens incisione auram spargit aerem, lacrymas elicientem, saporem habet aerem, insigniter amarum; succus cuti illinitus erythema excitat. In squamis siccis saporis amaritudo praevalet.

125. **Butyrum Cacao.**

Oleum Cacao unguinosum.

R. Seminum Cacao

q. v.

leniter tosta, decorticata et mundata contere in mortario ferreo calefacto, donec in pultriculam tenuem redaeta sint, quam in saeculis e charta bibula alba vel linteo densiori confectis inclusam, inter preli torcularis laminas calefactas fortissime exprime.

Oleum leni calore liquatum et per chartam bibulam albam filtratum, in capsulas papyraceas, vel ferreas stanno inductas, effunde, frigidum loco frigidiusculo serva.

126. Butyrum recens.

Pinquedo cremoris lactis vaccini, probe subacti, recens, sine sero inhaerente, minime salsa, neque pigmentis colorata.

Sit odoris expers, saporis blandi.

127. Calcaria carbonica cruda.**Creta alba.**

Eligatur albissima, non nimiam terrae siliceae vel aluminae admixtam copiam habens.

128. Calcaria carbonica depurata.**Creta depurata.**

Rx. Calcariae carbonicae crudae pulverat. *q. v.*
misce cum

Aquae communis fervidae *s. q.*

et stet per horam, ut creta subsideat.

Decantata aqua eadem operatio bis terve repetatur, deinceps elutrietur creta, ut a particulis arenosis mundetur et exsicceetur.

Sit pulvis niveus, subtilissimus, insipidus.

129. Calcaria caustica.**Calx viva. Calcium oxydatum.**

Sit alba, aqua inspersa calefiat et in pulverem subtilissimum dilabatur.

Recens usta servetur in vase optime clauso.

Substantiis heterogencis nimis inquinata rejiciatur.

130. Calcaria chlorata.**Calcaria oxymuriatica. Calcaria hypochlorosa.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sit pulvis albus, chlorum redolens, saporis amaro-styptici, humorem lente attrahens, in aqua e parte solubilis.

Servetur in vasis vitreis bene clausis, a luce remotis.

131. Calcaria phosphorica.

R̄. Calcii chlorati fusi *uncius sex,*
 solve in
Aquae destillatae *libris quatuor.*
 Liquori filtrato adde solutionem ex
Natri phosphorici crystallisati *unciis quadraginta*
 et
Aquae destillatae fervidae *libris septem.*
 Praecipitatum inde natum in filtro collectum, aqua destillata bene
 ablutum et siccatum conserva.
 Sit pulvis albus, in aqua insolubilis, a metallis alienis purus.

132. Calcaria sulfurata.

Hepar Sulfuris calcareum. Sulfuretum Calcis.

R̄. Calcariae causticae
Sulfuris citrini *aa libram.*

In pulverem redaeta et mixta ingerantur in crucibulum figulinum
 opereulo tegendum et per quadrantem horae fortiter incandescant.
 Crucibulo refrigerato summum stratum caute remove et massam flaves-
 centem cito pulveratam in vase bene clauso conserva.

133. Calcium chloratum.

**Calcaria muriatica. Murias Calcis. Hydrochloras
 Calcariae.**

Sal ex residuo praeparationis Ammoniae purae extractum, solvatur
 in sufficiente quantitate aquae, filtretur et evaporetur ad perfectam
 siccitatem. Massa sicca illico candefiat in crucibulo Hessiano, donec
 olei instar fluat. Tum effundatur in lapidem calefactum et bene mun-
 datum. Refrigerata servetur in vasis optime clausis.

Sit massa solida, albescens, structurae fibrosae, saporis amaro-aeris,
 calefacientis. In aëre deliquescit, facillime solvitur in aqua et spiritu vini.

134. Camphora.

Stearoptenum olei aetherei, e trunco, ramis et foliis *Camphorae*

officinarum Nees (*Lauri Camphorae* Linn.) arboris e *Laurinearum* familia, in China et Japonia ope destillationis paratum, et in officinis chemicis Europae sublimatione purgatum, occurrit in placentis orbicularibus, supra convexis, subtus concavis.

Massa alba, crystallina, diaphana, levis, pinguiuseula, odoris penetrantis, admodum peculiaris, saporis aromatici, amaricantis, primum caloris, tum frigoris sensum in ore excitans, friabilis, difficulter tamen et nonnisi cum guttulis aliquot spiritus vini adpersa in pulverem redigenda, temperatura ordinaria volatilis.

In vasis optime clausis servanda.

135. **Candelae fumales.**

Pastilli fumales.

R. Pulveris Carbonum ligni depurati	<i>libras quinque,</i>
Olibani	
Mastiches	
Benzoës	<i>una libram dimidiam,</i>
Corticis Cascarillae	<i>uncias duas,</i>
Kali nitrici depurati	<i>uncias quatuor.</i>
Misce, et cum	
Mucilaginis Gummi Tragacanthae	<i>sufficiente quantitate</i>
fiat massa, e qua formentur lege artis candelae.	

† 136. **Cantharides.**

Muscae hispanicae.

Lytta vesicatoria Fabr. (*Meloë vesicatorius* Linn.) insectum *Coleopterum* in maxima Europae et Asiae occidentalis parte obvinum, passimque apud nos annis calidioribus mensibus Junio et Julio potissimum Fraxinos, Ligustra et Syringas gregatim depascens, totum ex aureo-viridi splendens, antennis nigris, filiformibus, mollibus, coriaceis, odoris admodum ingrati, saporis initio parum manifesti, deinde acerrimi.

Cantharides igne leni, optime tamen siccatae, in vasis optime clausis servandae, et ab anobiis acarisque, quibus facile corrumpuntur, cautius defendendae.

† 137. **Capita Papaveris.**

Capsulae Papaveris.

Capsulae *Papaveris somniferi* Linn. plantae *Papaveraceae* opii-ferae, apud nos passim cultae, ante plenam maturitatem, quamdiu ex incisione succus laeteus manat, collectae, et leni igne siceatae, nucis Juglandis magnitudine, subglobosae vel ovato-oblongae, glabrae, saepe glauco-pruinosaе, coronatae stigmate sessili, disciformi, lato, decem-radiato, sub stigmate poris decem apertae, saporis nauseoso-amari.

138. **Carbo ligni depuratus.**

Carbo vegetabilis.

R̄. Carbonum ligni Pini tusorum *q. v.*

Coque saepius agitando in

Aquae fontanae *sufficiente quantitate.*

Post exsiccationem excandescat in vase ferreo bene clauso, cujus operculum foramine parvo pervium est, donec vapores et fumos emit-tere cessaverit, tum illico in vas bene clausum reponatur.

139. **Carbo ossium.**

Cornu cervi ustum nigrum. Ebur ustum. Spodium.

Praeparatum venale. Occurrit in frustis ossium Mammalium forma, vel in pulverem redactus.

Pro usu lavetur saepius aqua fervida.

Sit coloris saturate nigri, nec in aqua bulliente liquidum sordide flavum praebeat.

140. **Carbo spongiae.**

Spongia usta.

R̄. Spongiae marinae (strumalis dietae) a lapidibus et parti-bus heterogeneis bene pur-gatae

q. v.

Uratur in crucibulo tecto, donec fumus per commissuras exire cesset. Carbo ex frige facto crucibulo exemptus, et in pulverem subtilem tritus, servetur.

141. Carragheen.

Lichen Carragheen. Muscus Carragheen.

Sphaerococcus crispus Agardh. (*Fucus crispus* Linn.) Alga ad maris atlantici littora Europae frequens, e *Floridearum* ordine, fronde cartilaginea, plana, dichotoma, marginibus crispa, recens rubra vel subviridis, siccatione cornea, sordide luteo-alba. In aqua fervida solvitur in gelatinam Bassorinae similem, Jodi vestigia continentem.

142. Caricae.

Ficus Caricae Linn. arboris ex ordine *Morearum*, in Europa australi et Asia mediterranea passim cultae, receptacula fructifera pyriformia, siccata et in formam orbicularem compressa, albo-flaventia, pulverulenta, pulpa viscidula, fructus exiguos lenticulares includente, repleta.

Caricae nigrescentes, exsuccae, fere insipidae vel acidulae, odoris inamoeni, vel ab insectis corrosae rejiciantur.

143. Caryophylli.

Caryophylli aromatici Linn. arboris ex ordine *Myrtacearum*, in insulis Moluccis indigenae, nunc inter tropicos totius orbis cultae, flores ante corollae expansionem decerpti, in aqua fervente necati et in sole siccati, claviculos referunt unguiculares obscure ferrugineos, ex hypanthio compositos cylindrico subtetragono, calycis laciniis quatuor lanceolatis erectis coronato, et e corolla tetrapetala clausa, sphaerulae minutae forma.

Sint obscure ferrugini, ponderosi, odoratissimi, saporis acri-aromatici, triti oleum aethereum sudantes.

144. Cassia Fistula.

Cassiae Fistulae Linn. arboris *Caesalpinaceae* indicae, in Africa et America cultae, lomenta pedalia et longiora subcylindrica, pollicis

circiter diametro, furva vel nigricantia, laevia, nitida, sublignosa, indehiscencia, septis transversis lignosis, in loculos divisa plurimos monospermos, praeter semen disciforme durissimum includentes pulpam atram, dulcem, semen ambientem et figentem.

Lomenta pulpa penitus exsiccata, agitatione sonum edentia, in merendo rejice.

145. **Castoreum.**

Substantia animalis unguinosa, oleoso-resinosa sui generis, in organis seccernentibus folliculosis eum praeputio communicantibus, in *Castoris Fibri* Linn. animalis *Mammalis palmipedis*, in Europae et Asiae borealis fluviis et lacubus viventis, tam marium quam feminarum abdomine inter anum et genitalia sitis, contenta.

Castoreum ex animali in veteri orbe degente unice adhibendum, optime apud nos e Castore Danubii et Albis ripas, tum minores fluvios et laeus in Austria, Bohemia et Hungaria sparsim tamen accolente obtinetur, deficiente vero mera indigena ex Polonia et Russia (Castoreum moseoviticum) emendum est. Sistit folliculos geminos, magnitudinis plus minus inaequalis, quandoque cum folliculis duobus minoribus, massam unguinosam (axungiam Castorei) continentibus junctos, plerumque adhuc inter se connexos, e pyriformi ovatos, obtusos, ovi gallinaei ad pugni fere molem, ita ut longitudo latitudinem duplo circiter superet, glabros, turgidos, parum compressos, et ad gradum exsiccationis plus minus molles vel duros. Folliculus quisque constat e membranis quatuor, duabus externis tenacioribus, integumentum formantibus, et duabus intimis in processus plures irregulares, plicatos productis, quarum ultimarum plieis substantia officinalis adhaeret; massa primum mollis, post exsiccationem tandem pulverulento-sicca et friabilis, coloris obscure hepatici vel nigro-fusei, opaca, odoris proprii gravis, saporis resinoso-subacris, amaricantis.

Castorei genuini solutio alcoholica aqua instillata lactescit, et addito pauxillo Ammoniae purae liquidae iterum fit clarior.

Castoreum americanum seu canadense, etiam anglicanum dictum, e Castore americano Richards. in America boreali gregatim vivente collectum, rejice.

Folliculi sunt multo minores, fere oblongo-cuneiformes, compressi, rugosi, integumento tenui, subpapyraceo, in lamellas haud separabili, praediti; eeterum substantia minus odora, saporis magis amari.

Cave a folliculis faetieis, massa resinosa repletis.

146. **Catechu.**

Succus Catechu. Terra japonica.

Extractum siecum, e ligno *Mimosae Catechu* Linn. et *Acaciae complurium specierum*, arborum *Mimosearum*, in India orientali paratum, adfertur in plaentis obscure-fuseo-rubicundis, fractura strata plura, obscuriora eum pallidioribus alternantia exhibentibus.

Odor nullus, sapor admodum adstringens subdulcis.

Sit in spiritu vini diluto maxima ex parte solubile, et cum Liquore ferri chlorati colore griseo-virideseente, nec autem coeruleo-nigro turbetur.

147. **Cera alba.**

Cera flava per apricationem sub frequenti eum aqua adspersione colore flavo orbata, sistit ceram albam, magis duram, fragiliorem, minus odoram.

148. **Cera flava.**

Favorum ab *Api mellifica* Linn. insecto *Hymenoptero* exstructorum substantia solida, expressione et coctione eum aqua melle privata, calore liquata, eolata et refrigerata, solida, parum tenax, manus calore glutinosa, frigore fragilis, odoris mellei.

149. **Ceratum Cetacei.**

Emplastrum Spermatis Ceti.

R_y. *Cerae albae*

Sebi ovilli

aa libram unam,

Cetacei

Axungiae porcinae

aa libram dimidiam.

Leni igne colliquefacta et eolata effunde in capsulas chartaceas.

Sit coloris albissimi, minime rancidum.

150. **Ceratum citrinum.****Emplastrum citrinum.****Ry. Terebinthinae****Sebi ovilli****Resinae Pini****Cerae flavae***aa libram dimidiam,**libram unam,**libras duas.*

Colliquefacta et colata effundantur in tabulas.

151. **Ceratum fuscum.****Unguentum fuscum.****Ry. Emplastri diachyli simplicis***libram unam.*

Coque perpetua agitatione, donec massa colorem nigro-fuscum acceperit, deinde adde:

Cerae flavae**Sebi ovilli****Axungiae porcinae***aa uncias quatuor,**uncias sex.*

Humido consumpto effunde in tabulas.

152. **Ceratum ad labia flavum.****Unguentum labiale.****Ry. Butyri recentis****Passularum minorum***libras duas,**uncias quatuor,*

eum

Aquae fontanae*s. q.*

redige in pulvem molliorem, et coque leni igne ad humidi consumptionem, deinde per linteum trajice et adde:

Cerae flavae*uncias octo.*

Colata et semirefrigerata effunde in capsulas chartaceas.

153. **Ceratum ad labia rubrum.****Ry. Butyri recentis****Passularum minorum***libram unam,**uncias duas.*

eum

Aquae fontanae*s. q.*

in pulterem molliorem redige et coque leni igne ad humidi consumptionem,
dein per linteam trajice et adde:

Radicis Alkannae*unciam dimidiam,***Cerae albae***uncias quatuor.*

Fluant leni calore et colata effundantur in capsulas chartaceas.

154. Cetaceum.**Sperma Ceti.**

Substantia animalis pinguis sui generis, in eavis oecipitis ductuque subentaneo dorsali *Physeteris macrocephali* Linn. animalis *Cetacei* contenta, elotione a sanguine depurata et ab oleo inhacrente liberata.

Venalis sistit massam albissimo-nitentem, lamellosam, subpellucidam, tactu lubricam, friabilem, odoris et saporis fere expertem. Liquescat temperatura 40° R.

Cetaceum flavidum, raneidum rejice.

155. Chininum citricum.**R. Chinini sulfurici***q. v.*

solve in:

Aquae destillatae*partibus viginti,*

addendo

Acidi sulfurici diluti*guttas aliquot,*

solutioni instilla

Ammoniae purae liquidae*q. s.*

ad perfectam praecipitationem.

Præcipitatum subsidendo depositum in filtro collectum, et cum

Aquae destillatae*minima quantitate*

lotum,

Acidi citrici

solutione saturetur. Liquor evaporando redigatur in crystallos, quae siccatae servantur.

Sint crystalli albae, tenues, aciculares, saporis amari, in aqua parum solubiles, ab inquinamentis purae.

156. **Chininum hydrochloricum.**

Chininum muriaticum.

R̄. Chinini sulfurici *uncia una,*
 solve in :
Aquae destill. bullientis *unciis quadraginta.*
 Misce cum solutione ex
Baryi chlorati *drachmis duabus et granis novem,*
 nec non
Aquae destill. fervidae *uncia una*
 parata.

Miscela ebulliat per quadrantem horae, dein filtrando separetur a Baryta sulfurica, quam aqua fervida ablues.

Liquor filtratus lenissimo calore evaporando et refrigerando in crystallos redigatur, quae iterata crystallisatione depurentur.

Sint crystalli albae, aciculares, sericeo-nitentes, admodum amarae, in aquae bullientis partibus viginti solubiles. Sint a Chinino sulfurico, Baryo chlorato et aliis inquinamentis purae.

157. **Chininum sulfuricum.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Crystallus exhibet tenuissimas, levissimas, aciculares, niveas sericeo-nitentes, subflexiles, saporis admodum amari, solvitur in 750 part. aquae frigidae et 30 part. fervidae, in spiritus vini rectificatissimi 60 partibus, in aethere vix solubiles, in aëre sicco et leni calore fatiscentes. Cum aqua addito pauxillo acidi sulfurici diluti liquorem limpidum, coerulescopalescentem praebeat. Acido sulfurico concentrato madefactarum color albus in temperatura ordinaria vix mutatur.

Ne sint inquinatae cum Gypso, Creta, Magnesia, acido boracico vel stearico, Saccharo, Amylo, Mannito, Cinchonino vel Salicino.

† 158. **Chloroformium.**

R̄. Calcariae chloratae *libras decem,*
Aquae communis *libras quindecim.*

Miscee exactissime in vesica sat ampla in pulvem aequabilem, dein affunde miscelam ex

Spiritus vini rectificatissimi

libra una

et

Aquae communis

libris duabus.

Adaptato alembico et juneturis bene elausis fiat destillatio balneo aquae in exipulum optime refrigeratum, donec librae circiter duae transierint.

Chloroformium aqua gravius ab ea separa et iteratis vicibus aqua lotum cum Acido sulfurico anglicano tamdiu conquassa, donec jam non coloretur. Ab acido separatum et cum solutione Natri carbonici diluta lotum rectifica balneo aquae super Calcium chloratum.

Liquor servetur in vasis optime clausis.

Sit decolor, limpidus, reactionis neutrius, odoris peculiaris grati, saporis subdulis reficientis, in aqua parum, facile in aethere et aleohole solubilis, non inflammabilis. Grav. sp. 1,49. Punetum ebullitionis 63,5° C.

Sit ab aqua, aleohole, acido sulfurico vel hydrochlorico, empyreumate et aliis inquinamentis purus.

159. **Cinchoninum sulfuricum.**

Praeparatum officinarum chemicarum, exhibet crystallos majores, columnares, rectangulas, duras, Chinino sulfurico nitius amaras. Solvitur in aquae frigidae sexaginta et in spiritus vini rectificatissimi septem partibus, in aethere insolubile.

160. **Coccionella.**

Cocci Cacti Linn. insecti *Hemipteri* in regionibus Mexicanis viventis, Opuntiam coccionelliferam aliasque Opuntiae species inhabitantis femellae siccae, granula referunt atro-purpurea, pruina alba adspersa, striis griseis transversis rugosa, succo purpureo turgida.

161. **Collodium.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sit liquor submucilaginosus, semipellucidus, reactionis neutrius.

In vitro optime clauso servetur.

162. **Colophonium.**

Resina e residuo destillationis olei Terebinthinae liquatione obtenta, compacta, friabilis, rubro-fusca, nitens, subdiaphana, pulverem praebet subflavo-album, in spiritu vini, oleis et aethere solubilem. Odor et sapor resinoso-terebinthaceus, debilis.

163. **Conchae marinae.**

Ostreae edulis Linn. animalis *Mollusci ucephuli* in maribus Europae degentis, notissimi, conchae orbiculares, iniquivalvae.

164. **Conchae praeparatae.**

Conchae marinae coquantur cum aqua communi, et seopis ab adherentibus quisquiliis mundatae, bene ablutae et siccatae, redigantur in pulverem, qui laevigatus servetur.

165. **Conserva Rosarum.**

R. *Florum Rosarum rubrarum recentium libram dimidium.*

Contundantur in mortario lapideo in pulvem, cui paulatim sub continua fusione admisce:

Sacchari albi	<i>libram unam,</i>
in	
Aquae Rosarum	<i>unciis quatuor</i>
soluti, ut fiat lege artis Conserva.	

166. **Corallium rubrum.**

Isidis nobilis Linn. *Corallineae* polyparium notissimum, venale, ab inquinamentis heterogeneis, quibus inerustatum esse solet, mundatum et in pulverem redactum servetur.

167. **Cortex Aurantiorum.**

Malicorium Aurantii.

Citri Aurantii Linn. arboris in regionibus calidioribus totius orbis cultae fructuum maturorum cortex detractus et siccatus, e strato

exteriore glanduloso-rugoso, fulvo, oleo aethereo scatente, aromatico (**flavedo corticis Aurantiorum** dicto), et e strato interiore spongioso, albo; amaro, compositus.

Oecurrit venalis in segmentis, quartam circiter partem fructuum aequantibus, tenuibus, duris, plus minus convolutis, siccatione extus sordide fuseo-aurantiacis v. subolivaceis.

In mereando corticem validius aromaticum elige.

168. **Cortex Cascarillae.**

Croton Eluteria Swartz, arboris in insulis Antillanis et Bahamensibus crescentis, e familia *Euphorbiacearum*, cortex e ramis validioribus detractus.

Sistit segmenta circiter bipollicaria, canaliculata v. semiconvoluta, extus cinerascens-fusca, rugulosa aspera, transversim breviter rimosa, lichenibus variis innatis saepissime maculata, superficie interiore laevi, badia vel fusca, sat dura et ponderosa, fractura transversa aequabili, fusca resinoso-nitida. Odor peculiaris, aromaticus, sapor aromatico pungens, haud grate amarus. Accensus fumum spargit Moschi odore gravem, caput obnubilantem. Rejice ramos teneriores, cortici interdum admixtos.

169. **Cortex Cassiae Cinnamomeae.**

Cortex Cassiae ligneae droguistarum Viennensium.

Cinnamomi aromatici Nees. arboris in China et insulis Sundaicis indigenae e familia *Laurinearum*, cortex prestans fasciculis libro colligatis, duarum quatuorve librarum ponderis. Frusta epidermide sunt liberata, palmaria, imo pedalia, tubulosa, simpliciter vel dupliciter convoluta, elausa, ad $\frac{1}{3}$ — $\frac{3}{4}$ lineae crassa, dura. Superficiem glabriusculam, rubro-badiam, nonnunquam maculis parvis fuscis adpersam, texturam fibrosam, fibris longitudinalibus, haud raro flexuosis et fragilibus, exhibent.

Odor grate aromaticus peculiaris, sapor Cinnamomo Zeylanico similis, sed aerior cum quadam dulecedine mucilaginoso.

170. **Cortex Chinae fuscus.**

Cortex peruvianus.

Cinchonae scrobiculatae Humb. et Bonpl. *Cinchonae micranthae* Ruiz et Pav. *Cinchonae glanduliferae* Ruiz et Pav. aliarumque specierum, arborum *Rubiacearum* in Andibus peruanis ereescentium cortex ramorum, prostat in segmentis utrinque convolutis, pennae anserinae v. digiti minoris circumferentia, vix ultra dimidiam lineam crassis, extus vestitis epidermide fusco-grisea, hinc inde furfuracea, rimis transversis parum profundis, margine vix tumido cinctis, et rugis longitudinalibus aspera. Fractura transversa strati extimi et interioris nigricantis acquabilis, nitidiuseula, intimi tenuiter fibrosa.

Odor peculiaris, modicus, sapor amaricans, subadstringens cum aliquo aromate.

Praeferuntur cortices de Huanueo et de Loxa.

171. **Cortex Chinae regius.**

Cinchonae Calisayae Wedd. arboris *Rubiaceae* in Andibus peruanis ereescentis cortex, adfertur in segmentis diversae magnitudinis, planis v. convolutis, plus minus crassis, cinnamomeis, epidermide extus vestitis v. denudatis, intus laevibus. Varietates sequentes distinguuntur:

- a) China regia *plana*, in segmentis planis v. canaliculatis epidermide denudatis, duris (minime autem spongiosis), plerumque robustioribus, unam ad sex lineas crassis, superficie interiore minime fibrosa.
- b) China regia *convoluta*, in segmentis simpliciter vel bis convolutis, plerumque satis robustis, ambitu pollicis vel sesquipollicis, tres ad sex lineas crassis, superficie externa epidermide induta farinosa, albida v. grisea, transversim rimosa, rimis margine elevato cinctis, saepissime lichenes varios innatos et adnatos gerente.

Utraque varietas subflexilis, tenax, difficiliter in pulverem redigenda, diffracta fracturam monstrat in stratis exterioribus satis acquabilem, in interioribus fibrosam. Odor levissimus, coriarius, sapor amarissimus.

172. **Cortex Chinae ruber.**

Cinchonae nitidae Ruiz et Pav. arboris *Rubiaceae* in Andibus peruanis erescens cortex, offertur in frustis interne et externe obscure et laete rubro-fuseis, crassioribus, ponderosis; saporis valde amari adstringentis, haud ingrati.

173. **Cortex Cinnamomi Zeylanici.**

Cinnamomum acutum.

Cinnamomi Zeylanici Blum. (*Laurus Cinnamomum* Linn.) arboris humilis ex ordine *Laurinearum*, imprimis in insula Zeylon cultae, cortex e ramulis, potissimum trimulis detractus, radendo ab epidermide et exterioribus stratis depurgatus, et in solis ardore siccatus. Sistit bacillos, in fascies eentennarii pondere colligatos, pedales et sesquipedales, teretiuseulos, digiti minimi crassitie, e eortieis fragilis, chartae lusoriae crassitiem vix superantis, stratis pluribus, sibi invicem arete superpositis et eonvolutis, ita exstruetos, ut vacuum nullum in eentro remaneat. Color cinnamomeus sui generis, in pagina exteriori (eortiee) dilutior in flavum vergens, in interiori (libro) magis fuseescens. Fractura fibrosa, fibris flexibilibus. Odor peculiaris aromaticus. Sapor duleiter aromaticus, subadstringens, minime mucosus.

174. **Cortex Citri.**

Citri medicae Linn. arboris ex ordine *Aurantiacearum*, cortex e fructibus maturis detractus recens et siccatus, e strato exteriori punctato rugoso, vesiculis oleo aethereo foetis scatente, luteo-citrino, aromatico, subamaro, et ex interiori spongioso, albo, insipido constans.

† 175. **Cortex granati radicis.**

Punicae Granati Linn. arboris *Myrtaceae* in Oriente spontaneae et in Europa meridionali cultae, cortex e ramis radicis detractus, venundatur in segmentis canaliculatis, curvatis, quadrantem lineae ad unam lineam crassis, superficie exteriori gibbosa, aspera griseo-

lutea, viridi maculata, interiore sordide viridi vel lutescente, fissili, albarno pallide luteo passim adhaerente.

Fractura inaequalis flavescens, odor debilis nauseosus.

Sapor ingratus, amarus, adstringens.

† 176. **Cortex Mezerei.**

Daphnes Mezerei Linn. fruticuli humilis, ex ordine *Daphnoidearum* in Europae mediae et borealis sylvis montanis ereseentis, cortex extrema hyeme, cum flores prorumpant, e trunco et ramis validioribus detractus, explanatus et siccatus, frusta sistit loriformia, tenacissima, extus vestita epidermide fusea, glabra, intus albido-flavescencia subnitida.

Odor nullus. Sapor acerrimus, causticus.

177. **Cortex Nucum Juglandis viridis exterior.**

Cortex Nucum Juglandis.

Juglandis regia Linn. arboris hortensis notissimae, fructuum maturorum exocarpium carnosum, extus viride, glabrum, intus album, subspongiosum, ab endocarpio lignoso osseo (putamine) facile secedens, odoris peculiariter aromatici, saporis amaro-aeris subcorrosivi, digitos contraetantis colore fuseo maculans.

Siccatione fuseescit et saporem mitiorem, aucta amaritudine, acquirit.

178. **Cortex Quercus.**

Quercus pedunculatae Ehrh. et *Quercus sessiliflorae* Sm. arborum *Cupuliferarum* indigenarum, cortex e truncis junioribus, vere ante foliorum evolutionem detractus, extus argenteo-nitens vel cinereo-fuseus, glaber, rugoso-rimosus et tuberculatus, intus albidus, siccatione obscure cinnamomeus, fibroso-fissilis, inodorus, saporis admodum adstringentis.

179. **Cortex Salicis.**

Salicis fragilis Linn. et aliarum specierum affinium, amentis fructiferis pedunculatis, bracteis deciduis, arborum ad rivulos et fossas ubi-

que crescentium, ordinis *Salicinearum*, cortex e ramis bimulis trimulisve collectus, tenuis, flexibilis, extus fuscus, vel viridescens, laeviusculus, verniculose nitens, intus luteolus, odoris dum recens est amygdalini, saporis amaro-adstringentis.

180. **Cortex Simarubae.**

Cortex e radice *Simarubae officinalis* DC. et *Simarubae medicinalis* Endl. arborum Americae tropicae, ex ordine *Simarubacearum*, detractus adfertur in frustis variae longitudinis, plus minus latis et planis, duas circiter lineas crassis, levibus, spongiosis, fibroso-tenacissimis, superficie exteriori sordide flava, gibboso-verrucosa, aspera, interiore griseo-lutea, laevi. Odor nullus, sapor admodum amarus.

181. **Crocus.**

Croci sativi Linn. plantae *Irideae*, in Oriente indigenae, nunc in variis Europae partibus cultae, stigma trifidum, laciniis cuneiformibus, coloris saturate aurantiaci, odoris fragrantis, subnarcotici, saporis amaro-aromatici, masticatione salivam intense luteo tingens, e flore vix expanso resectum et caute siccatum. Servetur a luce remotus. Cave ab adulterato.

Habeantur in pharmacopoliis:

- a) *Crocus austriacus*, et
- b) *Crocus gallicus*.

182. **Cubebae.**

Piperis Cubebae Linn. fruticis ordinis *Piperacearum* in India orientali indigeni baccae exsiccatae, aridae, subglobosae, pedicello sursum incrassato innixae, atro-fusco-griseae, subgriseo-pruinosae, extus rugosae, rugis pentagona v. hexagona regularia formantibus, intus monospermae, semine cum pulpa exsiccata cohaerente, duro, fragili. Odor fragrans, aromaticus, sapor piperinus et camphoratus.

† 183. **Cuprum aceticeum crystallisatum.**

Aerugo crystallisata. Flores viridis aeris.

Præparatum officinarum chemicarum.

Sistit crystallos prismaticas virides, in aëre fatiseentes, saporis metallici, acerbi, in aquae fervidae partibus quinque, frigidae tredecim et dimidia solubiles.

184. **Cuprum aluminatum.**

Lapis divinus.

Rx. Cupri subacetici crudi

Aluminis

Kali nitrici depurati

aa uncias tres.

In pulverem trita et intime mixta liquecant igne lenissimo in vase murrhino. Refrigeratae massae in pulverem tritae optime misce:

Camphorae pulveratae

*drachmam unam et
dimidium.*

Serva in vase bene clauso.

Sit massa viridis, odoris camphorati insignis.

† 185. **Cuprum chloratum ammoniacale solutum concentratum.**

Rx. Cupri sulfurici depurati

unciam unam.

Solve in

Aquae destillatae

unciis decem.

Solutioni instilla:

Kali carbonici soluti

quantum sufficit

ad perfectam praecipitationem.

Praecipitati eum aqua iterato loti et siceati solve in

Acidi hydrochlorici diluti

s. q.

admisce

Ammonii chlorati depurati

unciam unam.

Adde

Aquae destillatae

*tantam quantitatem,
unciarum quinque.*

ut liquor sit ponderis

Sit liquor smaragdinus, limpidus, saporis styptici metallici, ejus drachma una contineat Cupri metallici granum dimidium et Ammonii chlorati grana duodecim.

† 186. **Cuprum chloratum ammoniacale solutum dilutum.**

Aqua antimiasmatica Köchlini simplex.

Rx. Cupri chlorati ammoniacalis soluti
concentrati

drachmam unam,

Aquae destillatae

uncias decem.

Misce et serva.

† 187. **Cuprum chloratum ammoniacale cum Hydrargyro solutum concentratum.**

Rx. Cupri chlorati ammoniacalis soluti concentr. *unciam unam,*

Hydrargyri bichlorati corrosivi

grana triginta.

Solve et filtratum serva.

† 188. **Cuprum chloratum ammoniacale cum Hydrargyro solutum dilutum.**

Aqua antimiasmatica Köchlini composita.

Rx. Cupri chlorati ammoniacalis cum Hydrargyro soluti concentrati

drachmam unam,

Aquae destillatae

uncias decem.

Misce et serva.

† 189. **Cuprum subaceticum crudum.**

Aerugo vulgaris. Viride aeris.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sistit glebas difficiliter frangendas, fractura sublamellosa, friabiles, e viridi plus minusve caeruleescentes.

Sit siccum, in acido acetico penitus fere solubile.

Aerugo venalis quisquiliis variis admixtis inquinata rejicienda est.

† 190. **Cuprum sulfuricum.**

Vitriolum Cupri seu coeruleum. Sulfas Cupri crystallisatus.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sistit crystallos cyaneas, rhomboideo-prismaticas, saporis ingrati styptici, in aëre paululum fatiscentes, in tribus partibus aquae frigidae, in una parte fervidae solubiles, in aleohole non solubiles.

Sit a zineo purum, nec ferro nimio inquinatum.

† 191. **Cuprum sulfuricum ammoniatum.**

Cuprum ammoniacale. Sulfas Cupri ammoniacalis.

R̄. Cupri sulfurici in pulverem triti *uncias duas.*

Solve in

Ammoniae purae liquidae *unciis sex,*

filtra in lagenam, cui inest

Spiritus vini rectificatissimi *libra una.*

Miscelam lagena obturata eonquassa, donec pulvis erySTALLINUS efformetur, quem in filtro eolleetum intra ehartam bibulam convolutam eeleriter sine calore exsicea et in vase elauso loeo frigido serva.

Sit saturate azureus, saporis nauseosi, substyptico-ammoniacalis et metallici, facile in aqua solubilis, in aëre jam temperatura ordinaria fatiseens.

Praeparatum aëris aditu partim deeompositum rejice.

† 192. **Decoetum Pollini.**

Decoetum Nucum Juglandum compositum.

R̄. Radicis Sarsaparillae

„ **Chinae nodosae orientalis** *āā unciam semis.*

Putaminum nucum Juglandis *uncias duas et semis.*

Punicis

Stibii sulf. nigri crudi in petia ligator. *āā drachmas duas,*

eoque eum

Aquae fontanae *libris tribus*

ad eolaturam

librae unius.

† 193. **Decoetum Zittmanni fortius.**

Decoetum Sarsaparillae compositum fortius.

R̄. Radicis Sarsaparillae concis. *uncias duodecim.*

Infunde cum

Aquae fontanae *libris septuaginta duabus,*
et digere per horas viginti quatuor additis intra sacculum linteum :

Pulveris Sacchari albi

„ **Aluminis** *aa drachmis sex,*

„ **Hydrargyri chlorati mitis** *uncia dimidia,*

„ **Cinnabaris facticiae** *drachma una,*

coque ad colaturam *librarum viginti quatuor.*

Sub finem coctionis adde :

Seminum Anisi vulgaris

„ **Foeniculi, singulorum**
contusorum, *aa unciam dimidiam,*

Foliorum Sennae *uncias tres,*

Radiceis Liquiritiae *unciam unam et dimidiam.*

Exprime et per panum cola.

† 194. **Decoetum Zittmanni mitius.**

Decoetum Sarsaparillae compositum tenue.

R. Radiceis Sarsaparillae concis. *uncias sex,*

additis speciebus e decocto fortiori residuis coque cum

Aquae fontanae *libris septuaginta duabus,*
ad colaturam *librarum viginti quatuor.*

Sub finem coctionis adde :

Corticis fructum Citri,

Seminum Cardamomi minoris,

Corticis Cassiae Cinnamomeae,

Radiceis Liquiritiae, singulorum

concisorum et contusorum, *aa drachmas tres.*

Exprime et per panum cola.

195. **Elaeosaccharum Anisi.**

R. Sacchari albi pulverati *drachmam unam.*

Misce terendo cum

Olei aetherei Anisi *guttis tribus.*

Hoc modo parantur **Elaeosacchara** sequentia:

Cinnamomi

Foeniculi

Menthae piperitae

Valerianae.

In universum ad Elaeosacchara, quae optime ex tempore paranda sunt, adhibe Olea aetherea optimae notae et minime vetustate eorrupta.

196. **Elaeosaccharum Aurantiorum.**

R̄. Fructum Aurantii

integrum, attere ad frustum

Sacchari albi,

donec superficies oleo aethereo impraegnata fuerit; hanc cultro abrasam et aëre siecatam in mortario in pulverem aequabilem redige.

197. **Elaeosaccharum Citri.**

E fructu Citri integro, paratur sicut elaeosaccharum Aurantiorum.

198. **Elaeosaccharum Macis.**

R̄. Macis

scrupulum unum.

Sacchari albi

unciam unam.

Misce terendo in mortario lapideo et in vase bene clauso serva.

199. **Elaeosaccharum Vanillae.**

R̄. Vanillae concisae

drachmam semis,

Sacchari albi

unciam unam.

Tere in mortario lapideo in pulverem subtilissimum aequalem.

200. **Electuarium aromaticum seu stomachicum.**

R̄. Pulveris herbae Absinthii

„ „ **Saturejae**

Pulveris herbae Serpylli

” foliorum Menthae pip.

” ” Salviae

” radicis Angelicae

” ” Serpentariae

” ” Zingiberis

” corticis Cassiae Cinnamomeae

” Caryophyllorum

” Nucis moschatae

aa unciam unam,

aa unciam semis.

aa drachmas duas.

Mellis depurati

q. s.

ut fiat electuarium.

† 201. **Electuarium aromaticum cum Opio.**

Electuarium anodynum. Theriaca.

R̄. Electuarii aromatici

unciā unam.

Opii puri

grana quatuor.

Misce.

202. **Electuarium lenitivum.**

Electuarium aperiens.

R̄. Pulpae Prunorum

libras tres,

Roob Sambuci

libram unam,

Pulveris foliorum Sennae

” **Kali tartrici aciduli**

aa libram semis,

Mellis despumati

q. s.

ut fiat electuarium.

Loco frigido, siccō serva.

203. **Elemi.**

Resina arboris non satis notae in Brasilia indigenae (ut creditur *Icica Icicariba* DC. familiae *Burseracearum*) compacta, intus mollior et tenax, contractata mollescens, subpellucida, pallide citrina, trita fere alba, odoris foeniculacei, saporis balsamici, amariusculi, leni calore

liquefcens, admodum inflammabilis, in spiritu vini rectificato frigido ex parte, ope caloris autem penitus solubilis.

Ab immixtis saepe resinae Pini particulis cantius distinguenda odore istarum terebinthinaceo, colore magis flavo, et solubilitate in spiritu vini rectificato frigido perfecta.

204. **Emplastrum anglicanum.**

Emplastrum glutinosum.

R̄. Ichthyocollae minutim concisae	<i>uncias duas,</i>
solve in	
Aquae destillatae calidae	<i>libris tribus,</i>
adde	
Spiritus vini rectificati	<i>uncias duas,</i>
Mellis despumati	<i>drachmam unam</i>

et cola per linteum.

Solutione leni calore liquefacta penicilli ope tela bombycina laevigata unius ulnae bene expansa sensim et aequabiliter inducatur, post quamlibet inductionem expectando, donec tela penitus sieca fuerit.

Telae pars adversa illinatur

Tincturae Benzoës	<i>partibus quatuor</i>
et	
Balsami peruviani	<i>parte una,</i>

et bene siecata in frusta secetur.

Rigidum esse oportet, et madefactum cuti adhaereat.

† 205. **Emplastrum Cantharidum.**

Emplastrum vesicatorium ordinarium.

R̄. Cerae flavae	<i>uncias octo,</i>
Olei Olivarum	
Terebinthinae communis	<i>iii uncias duas.</i>
Colliquefactis et colatis admiscee	
Cantharidum pulveratarum	<i>uncias sex,</i>

in balneo aquae per horam cum spatula agitando.

E massa refrigerata fiat emplastrum.

206. Emplastrum Cerussae.**Emplastrum album.****R̄. Lithargyri in pulverem subtilis-****simum triti***libram unam,***Olei Olivarum***libras quatuor et dimid.*

Coque sub continua agitatione, inspergendo interdum pauxillum aquae, donec Lithargyrum omnino solutum fuerit, tum adde:

Cerussae in pulverem tritae*libras septem,*

et coque, aquam calidam addendo, donec fiat emplastrum.

Sit album, mox flavescens, durum, calore modico tenax.

† 207. Emplastrum Conii maculati.**Emplastrum Cicutae.****R̄. Axungiae porcinae***libram unam,***Cerae flavae***libras duas,***Terebinthinae communis***uncias tres.*

Colliquefactis et colatis agitando admisce:

Pulveris extracti conii maculati*uncias tres,***„ Herbae conii maculati***libram semis.*

Fiat emplastrum.

208. Emplastrum diachylon compositum.

Emplastrum plumbi compositum. Emplastrum Lithargyri compositum. Emplastrum diachylon gummiresinosum.

R̄. Emplastri diachyli simplicis*libras duas.*

Liquefactis admisce:

Ammoniaci pulverati*uncias tres,*

solutas in

Terebinthinae communis*uncia una,*

adde

Cerae flavae*uncias quatuor,***Resinae Pini***uncias duas.*

Colliquefactis et colatis fiat emplastrum.

209. **Emplastrum diachylon simplex.**

Emplastrum plumbi simplex. Emplastrum Lithargyri simplex.

R̄. Axungiae porcinæ *libras duas,*
Lithargyri subtilissime pulverati *libram unam.*

Coque sub continua agitatione super lenem ignem, subinde aquae paucillum inspergendo, donec Lithargyrum penitus solutum fuerit, ad justam emplastri spissitudinem.

Cave, ne sit Lithargyri non soluti particulis inspersum.

+210. **Emplastrum Euphorbii.**

Emplastrum vesicatorium perpetuum. Emplastrum Cantharidum perpetuum.

R̄. Terebinthinae communis
Mastiches pulveratae *aa unciam semis.*

Leni calore liquefactis agitando admiscee:

Pulveris Cantharidum *drachmas duas,*
 „ **Euphorbii** *drachmam unam.*

Fiat emplastrum.

211. **Emplastrum de Galbano crocatum.**

R̄. Galbani depurati *uncias sex,*
Emplastri diachyli simplicis
 „ **de Meliloto** *aa uncias tres,*
Cerae flavae *uncias quatuor.*

Leni igne liquefactis admiscee:

Terebinthinae communis *unciam unam,*
Croci gallici pulverati *drachmas sex.*

Fiat emplastrum.

+212. **Emplastrum Hydrargyri.**

Emplastrum mercuriale.

R̄. Hydrargyri rectificati *uncias tres,*
 terendo extinetas in

Terebinthinae communis *uncia una et dimidia,*
 misce cum

Emplastri diachyli simplicis *libra una*
 leni igne liquefacta.

In emplastro Hydrargyri globuli haud sint conspicui.

213. **Emplastrum de Meliloto.**

R̄. Cerae flavae *libram unam,*

Olei olivarum

Resinae Pini

Sebi ovilli *ū uncias tres.*

Colliquefactis et colatis adde

Ammoniaci *drachmas decem,*

in

Terebinthinae communis *unciis tribus*

solutas.

Refrigeratis sub continua agitatione admiscee:

Pulveris herbae Meliloti floridae *uncias octo,*

” ” **Absynthii**

” **florum Chamomillae**

” **baccarum Lauri** *ū unciam semis.*

Fiat emplastrum.

214. **Emplastrum Minii adustum.**

Emplastrum noricum. Emplastrum fuscum.

R̄. Olei Olivarum *libram unam et dimidiam,*

Minii subtilissime pulverati *uncias novem.*

Coque sub continua agitatione, donec colorem nigro-fuscum acceperit, tunc adde:

Cerae flavae *unciam unam et dimidiam.*

Colliquefactis et paullulum refrigeratis admiscee:

Camphorae tritae *drachmas sex.*

Fiat emplastrum.

215. **Emplastrum oxycroceum.**

Ry. Cerae flavae	<i>libram unam et dimidiam,</i>
Resinae Pini	<i>libram unam.</i>
Colliquefactis, colatis et semirefrigeratis adde:	
Ammoniaci	
Galbani	<i>aa uncias quatuor,</i>
in	
Terebinthinae communis	<i>unciis quatuor</i>
solutas.	
Sub continua agitatione admisce:	
Pulveris subtilissimi Olibani	
„ „ Mastiches	<i>aa libram dimidiam,</i>
„ Croci gallici, spiritu vini	
irrorati	<i>uncias tres.</i>
Fiat emplastrum.	

216. **Emplastrum ad rupturas.**

Emplastrum ad hernias.

Ry. Resinae Pini	<i>libram unam.</i>
Cerae flavae	
Terebinthinae communis	<i>aa uncias tres,</i>
Olei Olivarum	<i>unciam unam et dimidiam.</i>
Leni calore liquatis et colatis adde:	
Sanguinis Draconis	
Mastiches	
Olibani	<i>aa unciam semis,</i>
in	
Terebinthinae communis	<i>unciis tribus</i>
solutas.	
Subrefrigeratis adde continua agitatione:	
Pulveris radice Consolidae majoris	
„ Boli armenae	
„ Lapidis haematitis	<i>aa unciam unam et dimid.</i>
Fiat emplastrum.	

217. Emplastrum saponatum.**Emplastrum saponato-camphoratum.**

R̄. Emplastri diachyli simplic. *libras tres,*
Cerae albae *libram dimidiam.*

Leni igne liquatis adde:

Saponis veneti pulverati *uncias tres.*

Subrefrigeratis agitando admisce:

Camphorae *unciam dimidiam,*

in

Olei Olivarum *unciis duabus*

solutam. Fiat emplastrum.

218. Emulsio amygdalina.**Emulsio communis.**

R̄. Amygdalarum dulcium decorti-
catarum *unciam unam,*

Sacchari albi *unciam semis.*

Contundendo in mortario cum aqua fontana redige in massam pultaceam, cui continuata trituratione adde:

Aquae fontanae *tantum,*

ut sit colatura *librae viiis.*

Eodem modo emulsionem seminum oleo pinqui scatentium reliquorum (Cannabis, Cucurbitae, Melonum, Papaveris etc.) parentur.

219. Emulsio oleosa.**Emulsio olei Amygdalarum. Mixtura oleosa.**

R̄. Olei Amygdalarum dulcium recent. *unciam semis,*

Pulveris gummi arabici *drachmas duas.*

Bene mixta subigantur terendo cum

Syrupi simplicis *uncia dimidia.*

Sub continua agitatione affunde:

Aquae fontanae *libram unam,*

ut fiat emulsio.

†220. **Euphorbium.**

Succus lacteus, aëre induratus, ex *Euphorbia officinarum* Linn. et *Euph. canariensi* Linn. collectus et ex Africa boreali-occidentali et insulis Canariis ad nos adlatus. Occurrit in granulis difformibus, cavis, saepe plantae, e qua collecta sunt, spinulas includentibus, aut his situ consumtis v. extractis perforatis, duris, fragilibus, odoris fere nullius, sed super prunis grate aromatici, saporis primum perexigui, deinde acerrimi caustici.

In aqua et spiritu vini nonnisi ex parte solubilis. Pulvis vehementissime sternutatorius, caute parandus.

221. **Explementum ad dentes.**

(Zahnkitt.)

R̄. Sandaracae

Mastiches

aa unciās duas,

non pulveratas solve balneo aquae in

Spiritus vini rectificatissimi

unciis sex.

Stent per aliquot tempus.

Liquorem limpidum decanta et in vase bene clauso conserva.

222. **Extractum Absynthii.**

R̄. Herbae Absynthii sicc. conc.

libras duas.

Macera in cucurbita vel vesica cum

Spiritus vini rectificati

libris quatuor

per duodecim horas. Tum affunde:

Aquae communis

libras quatuor,

et digere in balneo aquae per viginti quatuor horas, deinde exprime fortiter, et residuo reaffunde:

Aquae fontanae

Spiritus vini rectificati

aa libras duas.

Post iteratam per viginti quatuor horas digestionem et fortem expressionem, liquores commixtos, subsidendo depuratos et filtratos in balneo aquae destillando a spiritu vini libera.

Tum residuum in balneo aquae ad extracti spissioris consistentiam evapora.

† 223. **Extractum Aconiti.**

Rx. **Herbae Aconiti recentis** *libras duas.*

Contunde in mortario lapideo, dein affunde:

Spiritus vini rectificati *libras duas.*

Digere per viginti quatuor horas, tum exprime.

Liquorem filtra et in balneo aquae destillatione a spiritu vini libera.

Residuum in balneo aquae lenissimo calore et sub continua agitatione ad siccitatem evapora.

Servetur in vitro bene clauso.

224. **Extractum Acori.**

Paretur e radice Acori, ut extractum Absynthii.

† 225. **Extractum Aloës.**

Rx. **Aloës lucidae pulveratae** *libram unam,*

Aquae destillatae *libras quatuor.*

Macera per aliquot dies, saepius agitando, deinde liquorem sub-
dendo depuratum et colatum evapora balneo aquae ad siccitatem.

226. **Extractum amaricans compositum.**

Rx. **Extracti Cichorei**

” **Trifolii fibrini**

” **Cardui benedicti**

” **Centaurii minoris**

” **Rhei**

aa partes aequales.

Misce.

227. **Extractum Angelicae.**

Paretur e radice Angelicae siccata, ut extractum Absynthii.

228. **Extractum Arnicae florum.**

Paretur e floribus Arnicae siccatis, ut extractum Absynthii.

229. Extractum Arnicae radiceis.

Paretur e radice Arnicae siccata, ut extractum Absynthii.

+ 230. Extractum Belladonnae.

Paretur e foliis Belladonnae recentibus et servetur, ut extractum Aconiti.

231. Extractum Calendulae.

Paretur ex herba Calendulae florida siccata, ut extractum Absynthii.

232. Extractum Cardui benedicti.

R. Foliorum Cardui benedicti siccator.

et concisorum

libras duas,

Aquae communis calidae

libras duodecim.

Stent per bihorium in dolio, saepius agitentur et dein optime exprimantur. Liquor obtentus ebulliat et per neetem subsidendo depuratus per pannum coletur, dein balneo aquae ad extracti spissioris consistentiam evaporetur.

233. Extractum Cascarillae.

Paretur e cortice Cascarillae grosse tuso, ut extractum Absynthii.

234. Extractum Centaurii minoris.

Paretur ex herba Centaurii minoris florida, ut extractum Cardui benedicti.

235. Extractum Chamomillae.

Paretur e floribus Chamomillae vulgaris, ut extractum Absynthii.

236. Extractum Chelidonii majoris.

Paretur ex herba Chelidonii majoris recenti et servetur, ut extractum Aconiti.

237. Extractum Chinae fuscae.

R̄. Corticis Chinae fuscae contusi *libram unam,*
Aquae fontanae fervidae *libras duodecim.*

Macera per viginti quatuor horas, tum eoque per horam. Cola et residuum iterum bis terve cum

Aquae fontanae fervidae *libris duodecim*
 eoque.

Liquores commixti ebulliant, colentur per pannum et colati evaporantur ad remanentiam *librarum trium,*
 tum in balneo aquae ad siccitatem.

238. Extractum Cichorei.

R̄. Radicis Cichorei
Foliorum Cichorei *aa partes aequales.*

Coque binis vicibus in

Aquae communis *sufficiente quantitate.*

Decoeta subsidendo depurata clarificentur et
 evaporantur ad *tertiam partem.*

Stent per noctem in loeo frigido, ut sedimentum rursus deponatur, deinde cola, et in balneo vaporis ad extraeti spissioris consistentiam redige.

239. Extractum Cinae.**Extractum Santonici.**

Paretur e seminibus Cinae et servetur, ut extractum Aconiti.

†240. Extractum Conii maculati.

Paretur ex herba Conii maculati recenti et servetur, ut extractum Aconiti.

241. Extractum Colombo.

Paretur e radice Colombo, ut extractum Absynthii.

Evaporetur ad siccum.

242. **Extractum Cubebarum.**

Paretur e Cubebis contusis, ut extractum Aconiti, sed evaporetur ad extracti tenuioris consistentiam.

† 243. **Extractum Digitalis.**

Paretur e foliis Digitalis purpureae recentibus et servetur, ut extractum Aconiti.

244. **Extractum Dulcamarae.**

Paretur e stipitibus Dulcamarae concisis, ut extractum Cardui benedicti.

† 245. **Extractum Elaterii.**

R. Fructuum Elaterii recentium *q. r.*

Succum contusione et expressione obtentum inspissa balneo aquae et deinde solve in:

Spiritus vini *s. q.*

Solutionem alcoholicam evapora balneo aquae ad extracti spissioris consistentiam.

† 246. **Extractum Filicis maris.**

R. Radicis Filicis maris recenter siccatae,

purgatae et contusae *libram,*

Aetheris crudi *libras tres.*

Maccra per aliquot dies in vitro clauso, dein exprime. Liquor expressus et filtratus destilletur ad remanentiam *librae dimidia.*

Residuum balneo aquae ad extracti tenuioris consistentiam redigatur.

247. **Extractum Fumariae.**

Paretur ex herba Fumariae siccata, ut extractum Cardui benedicti. Evaporetur ad siccum.

248. **Extractum Gentianae.**

Paretur e radice Gentianae minutim concisa, ut extractum Cardui benedicti.

249. Extractum Graminis.**Mellago Graminis.**

Paretur e radice Graminis concisa, ut extractum Cichorei.

Sit consistentiae melis.

250. Extractum Guajaci ligni.

Paretur e ligno Guajaci raso, ut extractum Absynthii.

† 251. Extractum Hellebori nigri.

Paretur e radice Hellebori nigri siccata, ut extractum Absynthii.

† 252. Extractum Hyosciami foliorum.

Paretur e foliis Hyosciami recentibus et servetur, ut extractum Aconiti.

† 253. Extractum Hyosciami seminum.

Paretur e seminibus Hyosciami et servetur, ut extractum Aconiti.

254. Extractum Juglandis foliorum.

Paretur e foliis Juglandis recentibus, ut extractum Absynthii.

255. Extractum Juglandis nucum.

Paretur e nucibus Juglandis immaturis, ut extractum Absynthii.

† 256. Extractum Lactucæ virosæ.

Paretur ex herba Lactucæ virosæ recenti et servetur, ut extractum Aconiti.

257. Extractum Liquiritiæ liquidum.

R̄. Radicis Liquiritiæ decorticat. contusæ	<i>libram unam,</i>
Aquæ fontanæ	<i>libras decem.</i>

Macera per duodecim horas, et colaturam infusi expressi in balneo aquae ad extracti spissioris consistentiam evapora.

258. **Extractum Liquiritiae siccum.**

Succus Liquiritiae depuratus.

R̄. Bacillorum succi Liquiritiae crudi
optimae indolis *q. v.*

Stratis alterum alteri impositis, dolio extractorio immissi macerentur cum aqua frigida per viginti quatuor horas, et liquido tubuli ope emisso maceratio eodem modo tandiu, quam opus erit, cum nova aquae quantitate reiteretur.

Liquores perfecte limpidi initio leni igne, tunc in balneo aquae ad siccum evaporentur.

259. **Extractum Lupuli.**

Lupulinum.

Paretur e strobilis Lupuli siccatis et servetur, ut extractum Aconiti.

260. **Extractum Malatis Ferri.**

Extractum Ferri pomati. Extractum Martis cum succo Pomorum.

R̄. Pomorum acidulorum maturorum, decor-
ticatorum et contusorum *libras sex,*

miscue cum

Ferri puri limati *libra una,*

digere saepius agitando in loco tepido, aquam evaporatam restituens, per aliquot hebdomadas, donec in massam nigram transierint, quam sacculis linteis inclusam exprime.

Liquorem subsidendo depuratum filtra, et balneo aquae ad extracti spissioris consistentiam redige.

†261. **Extractum Mezerei.**

E cortice Mezerei siccato contuso paretur, ut extractum Filicis maris. Sit consistentiae spissioris.

262. Extractum Millefolii.

Ex herba Millefolii florida paretur, ut extractum Absynthii.

†263. Extractum Nucis vomicae.

E Nucibus vomieis grosse tuis paretur et servetur, ut extractum Aeoniti.

†264. Extractum Opii.

Ex Opio grosse conciso paretur, ut extractum Aloës.

†265. Extractum Punicae granati.

Paretur e radicis Punicae granati cortice, ut extractum Absynthii.

266. Extractum Quassiae.

E ligno Quassiae conciso paretur, ut extractum Chinae fuseae.

267. Extractum Ratanhiae.

E radice Ratanhiae minutim contusa paretur, ut extractum Chinae fuseae.

268. Extractum Rhei.

E radice Rhei contusa paretur, ut extractum Cardui benedicti.
Evaporetur ad siccum.

269. Extractum Salviae.

Paretur e foliis Salviae siccatis, ut extractum Absynthii.

270. Extractum Saponariae.

E herba Saponariae concisa paretur, ut extractum Cardui benedicti.

271. Extractum Sarsaparillae.

E radice Sarsaparillae coneisa paretur, ut extractum Absynthii.
Evaporetur ad siccum.

† 272. Extractum Scillae.

E bulbo Scillae recenti paretur, ut extractum Cardui benedicti.
Evaporetur ad siccum.

† 273. Extractum Secalis cornuti.

Extractum haemostaticum. Ergotinum.

Paretur e Secale cornuto contuso et servetur, ut extractum Aeoniti.

274. Extractum Taraxaci.

E Foliorum Taraxaci

Radiceis Taraxaci

partibus aequalibus

paretur, ut extractum Cichorei.

Sit consistentiae melis.

275. Extractum Trifolii fibrini.

E foliis Trifolii fibrini paretur, ut extractum Cardui benedicti.

276. Extractum Tormentillae.

Paretur e radice Tormentillae, ut extractum Chinae fuscae.

277. Extractum Valerianae.

E radice Valerianae paretur, ut extractum Absynthii.

† 278. Faba St. Ignatii.

Faba febrifuga.

Ignatiae amarae Linn. fil. fruticis in insulis Philippinis crescentis
ex ordine *Loganiacearum*, semina, avellanae circiter magnitudine,

oblonga, obtusa, tri-tetragona, uno latere convexa, reliquis plana, compressa, obscure et pallide grisea, subcornea, inodora, saporis peculiariter nauseoso-amarissimi.

279. Farina Fabarum.

Phaseoli vulgaris Linn. plantae *Papilionaceae* notissima semina in mortariis contusa vel in mola contrita, et per cribrum trajecta.

280. Farina Foeni graeci.

Trigonellae Foeni graeci Linn. plantae *Papilionaceae* Europae australis semina in molis in pulverem trita, odoris Melilotum aemulantis.

281. Farina Lini placentarum.

Placentae residuae e seminibus *Lini usitatissimi* Linn. ad obtinendum oleum pinque prelo subjectis in mortario in pulverem subtilem contusae.

282. Farina Lini seminum.

Seminum *Lini usitatissimi* Linn. farina in molendinis trituratione parata.

283. Farina secalina.

Secalis cerealis Linn. plantae *Gramineae* notissimae seminum farina trituratione molari obtenta.

284. Farina Sinapis seminum.

Seminum *Sinapis nigrae* Linn. farina in mortariis contusione parata.

285. **Fel Tauri inspissatum.**

Extractum fellis Tauri.

R̄. Fellis Tauri recentis *q. v.*

Ebulliat et per pannum coetur, deinde in vase porellaneo in balneo aquae ad extracti spissioris consistentiam evaporetur.

286. **Ferrum carbonicum saccharatum.**

R̄. Natri carbonici crystallisati *libram unam,*
solve in

Aquae communis *libris tribus.*

Solutioni filtratae et in lebetē ferreo ad ebullitionem calefactae sensim adde:

Ferri sulfurici crystallisati *uncias decem.*

Præcipitatum obtentum, aqua destillata bulliente eduleatum ope preli exprime, placentam eum aequali pondere Sacchari albi optime mixtam leni calore sicca et in vase bene clauso serva.

Sit pulvis virideseens, acidis affusis effervescens.

Ne sit metallis alienis inquinatum.

287. **Ferrum citricum.**

Citras Ferri oxydati.

R̄. Acidi citrici *unciam unam,*
solve in

Aquae destillatae *s. q.*

Solutioni adde:

Ferri oxydati hydrici recenter parati *q. s.*
ut Ferri oxydati hydrici particula insoluta remaneat.

Liquorem filtratum in vase porellaneo leni calore ad siccum evapora et in vase bene clauso serva.

Sit pulvis rubro-fuseus, in aqua solubilis, saporis subdulcis, adstringentis.

† 288. **Ferrum jodatum saccharatum.**

R̄. Ferri limati *drachmam unam.*
Immitte in lebetem ferreum et affunde:

Aquae destillatae *drachmas quinque,*
 tum sensim injice:
Jodi *unciam dimidiam,*
 et digere interdum agitando, donec color initio rubicundus in subviridem
 mutatus fuerit.
 Liquorem filtratum misce cum
Sacchari lactis *unciis duabus et dimidia*
 et citissime ad siceum redige.
 Servetur in lagenis epistomio vitreo clausis.
 Massa salina coloris flaveseentis, ad aërem humeseens, saporis styptici,
 atramentacei.
 Grana sex continent granum fere unum Jodi.

289. **Ferrum lacticum.**

Lactas Ferri. Lactas Oxyduli Ferri cum aqua.

R. Lactis vaccini sponte acidifacti *libras duas,*
Sacchari lactis
Ferri limati *aa unciam unam.*

Mixtas seponere in calore modico per aliquot dies. Saccharo lactis
 fere soluto novam adijce copiam, quamdiu ferrum lacticum nascitur,
 quod pulvere viridulo crystallino deposito dignoscitur. Dein tota mis-
 cela ebulliat et fervida adhuc filtretur in vas bene claudendum.

Post aliquot dies, si crystalli enati jam non creverint, decanta, crustas
 crystallinas parum aqua frigida lava, tum charta bibula involutas lenis-
 simo calore sicea, contere et in vase bene clauso serva.

Sit pulvis flaveseens, saporis styptici, subdulcis. Solvitur in triginta
 partibus aquae frigidae, facilius in aqua fervida.

290. **Ferrum limatum.**

Praeparatum officinarum propriarum.
 Sit a metallis alienis liberum.

291. **Ferrum oxydato-oxydulatum.**

Aethiops martialis.

R. Ferri sulfurici oxydulati crystallis. puri *uncias quatuor,*

solve in

Aquae communis

unciis quatuor,

cui admixtae sunt

Acidi sulfurici concentrati puri

drachmae sex.

Solutioni fervidae instilla

Acidi nitrici crudi

q. s.

donec Ammonia pura liquida praecipitatum rubro-fusceum producat.

Solutionem dilue cum decuplo aquae communis fervidae et misce eum solutione

Ferri sulfurici oxydulati crystallisati puri

unciarum duarum

in

Aquae communis

unciis octo.

Liquorem nunc praecipita cum

Ammoniae purae liquidae

s. q.

donec praecipitatio cesset; ebulliant in vase ferreo, ut praecipitatum gelatinosum in pulverem nigrum mutetur.

Post edulcorationem perfectam filtra, sicca et serva.

Sit pulvis niger, subtilissimus, in acidis e toto solubilis.

Ne sit carbone animali adulteratum.

292. **Ferrum oxydatum aceticum liquidum.**

Liquor Ferri acetici.

Rx. Acidi acetici concentrati

uncias sex,

in quibus solve absque calore

Ferri oxydati hydrici recenter parati,

expressi et adhuc humidi

tantum,

ut particula Ferri oxydati hydrici insoluta remaneat.

Liquorem filtra et in vase bene elauso serva.

Sit coloris rubro-fusci.

293. **Ferrum oxydatum hydricum in aqua.**

Antidotum Arsenici albi.

Rx. Ferri sesquichlorati crystallis.

uncias octo.

solve in

Aquae communis

libris octo,

adde

Ammoniae purae liquidae

q. s.

ad perfectam praecipitationem.

Praecipitatum bene ablue et massae pultiformi admisce:

Aquae destillatae

tantum,

ut pondus totius fluidi sit

librarum quatuor.

Servetur in lagenis vitreis bene clausis.

Sit liquor turbidus, coloris rubro-fusci, aut dispensationem con-
quassandus.

Haec quantitas praeparati semper praesto sit.

Dimidio quove anno denuo paretur.

294. **Ferrum oxydatum nativum rubrum.**

Lapis Haematites.

Minera Ferro oxydato dives, occurrit massis solidis, fibris radiatis,
pulverem rubrum largientibus.

Ne acido hydrochlorico affuso effervesceat, nec eum eodem acido
calefactum Chlorum exhalet.

295. **Ferrum phosphoricum oxydatum.**

Phosphas ferrieus.

R̄. Ferri sesquichlorati soluti

uncias quatuor,

Aquae destillatae

libras octo,

adde:

Natri phosphorici in aqua destillata soluti *q. s.*

ad perfectam praecipitationem.

Praecipitatum bene lotum sicca.

Sit pulvis albidus, in aqua insolubilis, in acido nitrico diluto leni
calore solvendus, calori fortiori expositus fuscescens.

296. **Ferrum phosphoricum oxydulatum.**

Phosphas ferrosus.

R̄. Ferri sulfurici oxydulati crystallis. puri

uncias tres.

solve in

Aquae destillatae

unciis octodecim.

Solutioni instilla :

Natri phosphorici

uncias quatuor,

Aquae destillatae

s. q.

solutas ad perfectam praecipitationem.

Praecipitatum bene lotum et siccatum conserva.

Sit pulvis subtilis, sordide coeruleus, in aqua insolubilis, in acido nitrico et hydrochlorico leni igne solvendus.

297. **Ferrum pulveratum.**

Limatura martis alcoholisata.

Praeparatum officinarum propriarum.

In vase bene clauso servandum.

Sit pulvis subtilissimus, metallice nitens, in acido hydrochlorico absque ullo residuo solubilis, a metallis alienis liber.

298. **Ferrum sesquichloratum crystallisatum.**

R̄. Ferri oxydati nativi rubri laevigati

uncias quatuor.

Immitte cucurbitae vitreae, adde:

Acidi hydrochlorici crudi

uncias sexdecim,

et digere leni calore.

Liquorem limpidum a sedimento decanta et in patina porcellanea balneo vaporis ad syrupi consistentiam evapora, dein vase bene obtecto in locum frigidum ad crystallisationem sepone.

Crystallos a liquore residuo separa et in vase penitus sicco bene clauso conserva.

Sistit massam crystallinam flavam, saporis peradstringentis, aëre deliquescentem, in aqua, alcohole et aethere penitus solubilem.

299. **Ferrum sesquichloratum solutum.**

Oleum Martis.

R̄. Ferri sesquichlorati crystallisati

Aquae destillatae

aa unciam.

Solve et conserva.

300. **Ferrum sulfuricum oxydulatum.****Vitriolum Martis.**

R̄. Acidi sulfurici anglicani *libras duas,*
 dilue in cucurbita vitrea cum
Aquae communis *libris octo,*
 paullatim immitte
Ferri puri *libram unam,*
vel tantum,
 ut post lenem digestionem particula Ferri insoluta maneat.

Addita

Acidi sulfurici anglicani *uncia dimidia,*
 solutionem filtratam evaporatione et refrigeratione in crystallos redige,
 quae siccatae in vitro optime clauso servantur.

Crystalli sint coloris coeruleo-virescentis, saporis aciduli, styptici, atramentacei, in aëre sicco fatiscentes, in aquae frigidae duabus, fer-
 vidae $\frac{3}{4}$ partibus solubiles.

Ne sint Cupro et Zinco inquinatae.

301. **Flores Arnicae.**

Arnicae montanae Linn. plantae *Compositae* indigenae capitula radiata luteo-aurantiaca, involucrio oblongo e squamis lineari-lanceo-
 latis, villosis biseriatis composito, floribus radii ligulatis anantheris,
 disci tubulosis, perfectis, acheniis subcylindricis, asperis, pappo rigido
 piloso barbellato coronatis, receptaculo fimbrillifero subpiloso insisten-
 tibus.

Capitula perfecte explicata et remotis involucriis siccata a muscarum
 larvis cautius defendenda sunt.

Cave, ne confundas cum Inularum, Doronici v. Anthemidis tinctoriae
 capitulis. Inulae involucrio imbricato, receptaculo nudo et corollis
 radii angustioribus citrinis, Doronicum acheniis radii pappo destitutis,
 Anthemis tinctoria receptaculo paleaceo et acheniis nudis distin-
 guuntur.

Odor debilis, haud gratus, agitati sternutationem excitant.

302. Flores Aurantii.

Flores Naphae.

Citri Aurantii Linn. arboris familiae *Aurantiacearum*, notissimae, in Europa australi sub dio, apud nos in frigidariis cultae, flores candidi suaveolentes, e calyce subtubuloso, quinquedentato, e petalis quinque lineari lanceolatis, carnosulis, calyce multoties longioribus, e staminibus numerosis et e germine monostylo compositi.

Odor fragrantissimus, grate aromaticus.

303. Flores Boraginis.

Boraginis officinalis Linn. herbae sui ordinis in Europae mediae et australis hortis et pomariis inter olera frequenter occurrentis flores, calyce quinquepartito, laciniis linearibus acutis hispidis, corolla rotata, lacte coerulca, basi villosa, appendicibus erectis latis emarginatis inter stamina donatis.

Flores caute siccentur.

† 304. Flores Brayerae.

Flores Kousso.

Brayerae anthelminticae Kth., arboris e *Rosacearum* ordine in Abyssiniae montibus indigenae flores, nunc paniculis magnis, villosissimis, in cylindri pedalis et $1\frac{1}{2}$ — 3 pollices crassi formam convolutis, nunc solum ramulis carptis insidentes delapsisque plurimis mixti, viridi-purpureo-variegati; calycis tubo turbinato, brevi, villosa, limbo octo-vel decempartito, laciniis biseriatis oblongis, obtusis, venulosis, exterioribus quatuor vel quinque majoribus patentibus, cum totidem interioribus corrugatis minoribus alternantibus; petalis quinque squamuliformibus deciduis; fructu utriculati monospermo, calycis tubo indurato incluso.

305. Flores Calendulae.

Calendulae officinalis Linn. plantae *Compositae* in Europa australi sponte crescentis, apud nos in hortis passim satae, capitula sub plenaria anthesi collecta et siccata, radiata, aurantiaco-flava, involuero biseriali,

receptaculo nudo, acheniis heteromorphis, incurvis, dentato-aculeatis, epapposis.

Odor peculiaris, balsameus, sapor salso-amariusculus, adstringens.

306. **Flores Chamomillae vulgaris.**

Matricariae Chamomillae Linn. plantae *Compositae* inter segetes et in ruderalis passim nascentis, florum capitula, floribus radii ligulatis albis, disci minimis, tubulosis, flavis, involucri imbricati squamis subaequalibus, margine subscariosis, receptaculo conico, nudo, cavo, pappo nullo.

Odor vehemens, peculiaris, sapor aromatico-amarus.

307. **Flores Chamomillae romanae.**

Anthemidis nobilis Linn. plantae *Compositae* in Europa meridionali indigenae, apud nos passim in hortis cultae, florum capitula plerumque plena, floribus plerisque ligulatis albis, tubulosis in centro paucissimis flavis, involucri pauciserialis squamis imbricatis lanuginosis, receptaculo conico, paleis cymbiformibus duplicato-serratis obsito.

Odor peculiaris, sapor aromaticus, peramarus.

308. **Flores Cyani.**

Centaureae Cyani Linn. plantae *Compositae* inter segetes vulgaris, capitula florum corollis pulchre cyaneis decora, caute siccata in loco obscuro servantur.

309. **Flores Lavandulae.**

Lavandulae verae DC. (*Lavandulae spicae* Linn.) plantae *Labiatae*, in Europa australiore spontaneae, passim in hortis satae, flores ante plenariam anthesim e pedicellis decerpti, calyce cinereo subtomentoso, superne coeruleo, corolla bilabiata violacea, pubescente, odoris etiam in sicco suave fragrantis.

Nimis annosos et longo situ odoris expertes rejice.

310. Flores Lili albi.

Lilii candidi Linn. herbae sui ordinis in Oriente indigenae, apud nos in hortis cultae folia perigonii oblonga, basi attenuata, ibique fovea nectarifera intus instructa, nivea, recentia suaveolentia, siccata inodora, fuscescencia.

311. Flores Malvae.

Malvae sylvestris Linn. plantae *Malvaceae*, in Europa ubique crescentis, flores sub plenaria anthesi decerpti, calyce involucrato, corolla pentapetala, rosea staminibus monadelphis.

312. Flores Papaveris Rhoeados.

Papaveris Rhoeados Linn. herbae *Papaveraceae*, inter segetes vulgaris, petala subrotunda, miniata, basi interdum macula purpureo-nigricante notata, odoris debilis narcotici; siccata tenuissima, fere diaphana, sordide purpurea, fere inodora.

313. Flores Rosarum.

Rosae gallicae Linn. et *Rosae centifoliae* Linn. fruticum aculeatarum inter hortenses notissimarum corolla polypetala sub anthesi resecta et celeriter siccata, saporis adstringentis, odoris in statu sicco exigui, grati.

Seligantur flores Rosae gallicae semipleni pro siccatione, flores Rosae centifoliae pro aqua.

314. Flores Sambuci.

Sambuci nigrae Linn. arboris notissimae, ex ordine *Caprifoliacearum*, corollae minutae, rotato-quinquefidae, resectis sereno coelo cymis et celeriter siccatis. A pedunculis separatae servantur. Siccatae corollae color pallide sulfureus, odor aromaticus, mitis, qui in recentibus ingratus, vehemens.

Ne sint quisquiliis et pedunculis admixtis contaminati. Nigrescentes rejice.

315. Flores Tiliae.

Tiliae grandifoliae Ehrh. et *Tiliae parvifoliae* Ehrh. aliarumque specierum, arborum indigenarum ex ordine *Tiliacearum*, cymae floridae, pedunculo tri-sexfloro, basi partim cum bractea herbaeeo-membranacea, albida, lineari oblonga, integerrima, reticulato-venosa connato, florum calyce pentaphyllo, deciduo, corolla pentapetala albide lutescente, staminibus plurimis albidis, corollam superantibus. Odor recentium suavis, siccatorum fere nullus, sapor dulciuseulus.

316. Flores Verbasci.

Verbasci phlomoidis Linn. et aliarum specierum proxime affinium plantarum indigenarum vulgaris notitiae ex ordine *Scrofularinearum*, corollae rotatae, quinque-partitae, luteae, cum staminibus quinque albido villosis, eoclo sereno decerptae, et celeriter siccatae. Odor recentium ingratus, siccorum suavis, melleus, sapor dulcis, mucilaginosus.

Pluvio coelo collctas, siccatione nigricantes rejiec.

317. Flores Violarum.

Violae odoratae Linn. plantae indigenae, ordinis *Violacearum*, ob suavissimum florum odorem cuvis notae, corollae irregulariter pentapetae calcaratae saturate violaeae, odoris fragrantis notissimi, saporis subdulcis, acriuseuli, recentes colligantur.

318. Folia Althaeae.

Althaeae officinalis Linn. plantae indigenae e familia *Malvaccarum*, saepissime in usus pharmaceuticos cultae folia, subcordato-ovato-angulosa, vel subovata, inaequaliter dentata, quinque-nervia, tomentoso-mollia, ex albo viridia, odoris nullius, saporis mucilaginosi.

Colligantur aestate ante florum evolutionem.

319. Folia Arnicae.

Arnicae montanae Linn. plantae *Compositae* indigenae folia unum tresve pollices longa, quinque-nervia, integerrima, superne lacte viridia,

sparse pilosa, subtus pallidiora, subvillosa, radicalia 2 — 6 verticillatim congesta, ovata, basi angustata, caulina opposita, oblongo-lanceolata.

320. **Folia Aurantii.**

Citri Aurantii Linn. arboris passim in frigidariis etiam cultae folia, semper virentia coriacea, eum petiolo late obovato alato articulata, ovato-oblonga, glabra, saturate viridia, siccatione pallida, subserrata, glandulis oleiferis circa marginem majoribus punctata, odoris grate aromatici, saporis aromatico-amari.

+ 321. **Folia Belladonnae.**

Atropae Belladonnae Linn. plantae *Solanaceae*, in sylvis Europae creescentis folia brevi petiolata, ovata, acuta, integerrima, tactu mollia, superne saturate viridia, glabra, subtus pilis brevissimis glandulosis conspersa, hinc subviscida. Odor nullus, sapor fatuus, amariuscule-subaeris.

Folia e planta florifera decerpenda, cito siccanda et in vase bene clauso servanda. Fusca vel nimis annosa, in pulverem dilabentia rejiciantur.

322. **Folia Cardui benedicti.**

Cnici benedicti Gärtn. (*Centaureae benedictae* Linn.) plantae *Compositae* in Europa meridionali indigenae, ad usus medicos in hortis quoque satae, folia spithamam longa, sessilia v. semiamplexicaulia subdecurrentia, integra, sinuata vel pinnatifida, hispidulo scabra, subtus imprimis reticulato-venosa, margine denticulato-aculeata, ciliata. Recentis odor inamoenus, in siccato evanescit, sapor subsalsus, admodum amarus.

Colligantur ante anthesim capitulorum, et sola folia remotis caulibus servantur.

323. **Folia Cichorei.**

Cichorei Intybus Linn. plantae *Compositae* notissimae lactescentis folia radicalia petiolata, oblongo-lanceolata pinnatifida, caulina alterna

amplexieaulia, sinuato-dentata, summa cordato-lanceolata integerrima, omnia subpilosa.

Colligantur ante perfectam capitulorum coeruleorum anthesim.

324. **Folia Cochleariae.**

Cochleariae officinalis Linn. plantae *Cruciferae*, in Europae imprimis borealis uliginosis sponte erescens, et etiam in hortis eultae folia radiealia petiolata cordato-rotundata subintegerrima et eaulina ovato-oblonga, dentata, omnia glabra, subsucculenta, nitida viridia, e planta florente decerpta, nonnisi recentia adhibeantur.

† 325. **Folia Digitalis.**

Digitalis purpureae Linn. herbae biennis in montibus aprieis Europae mediae passim erescens, in hortis quoque eultae, ex ordine *Scrofularinearum*, folia ovata v. ovato-lanceolata acutiuscula, margine crenata, rugosa, retieulato-venosa, taetu mollia utrinque pubescentia, subtus pallidiora et densius pilosa, infima longe petiolata, caulina inferiora in petiolum decurrentia, suprema sessilia.

Odor nullus, sapor peramarus, subacris.

Primo efflorescentiae tempore colligantur et resectis petiolis rejee-tisque foliis radicalibus nervo medio nimis valido donatis siecentur.

326. **Folia Farfarae.**

Tussilaginis Farfarae Linn. plantae *Compositae* in solo argillaceo humido ubique vulgaris, folia mere radiealia, aestate post scapos floriferos naseentia, petiolata, cordato-subrotunda, sinuato-angulata, denticulata, superne laete viridia glabra, subtus albo-tomentosa, in-odora, saporis mucilaginosi, subamaro-austeri, sicea servantur.

327. **Folia Hepaticae.**

Herba Hepaticae nobilis.

Hepaticae trilobae Chaix (*Anemones Hepaticae* Linn.) herbae vernae in montosis sylvatieis degentis e *Ranunculacearum* ordine, folia

radicalia longe petiolata, cordato-triloba, lobis integerrimis, adulta supra glabrata, nitida, viridia, subtus cum petiolis villosa, tandem purpurascentia, subcoriacea.

Odor nullus, sapor cum acritate paululum acerbus.

† 328. **Folia Hyoscyami.**

Hyoscyami nigri Linn. plantae *Solanaceae* biennis, in ruderalis obviae, folia inferiora subpetiolata, superiora amplexicauli sessilia, omnia oblongo-ovata, acuta, profunde sinuato-dentata, tactu mollia, viscido-villosa, odoris peculiaris narcotici, saporis fatui, amariuscule-subaeris.

Nonnisi e planta bienni caulescente ante florum anthesin decerpantur.

329. **Folia Juglandis.**

Juglandis regiae Linn. arboris sui ordinis, inter cultas notissimae folia impari pinnata, quinque-novemjuga, foliolis ovato-oblongis acutis, subtus in venarum axillis pubescentibus. Foliola a petiolo communi soluta et cito siccata servantur. Recentia si teruntur, odorem peculiariter aromaticum exhalant.

† 330. **Folia Laurocerasi.**

Pruni Laurocerasi Linn. arboris in Oriente sponte crescentis ex ordine *Amygdalacearum*, apud nos passim in frigidariis ad usus pharmaceuticos cultae, folia coriacea sempervirentia, petiolo brevi tereti, superne canaliculato suffulta, quatuor sexve pollices longa, oblongo-obovata, acuta, argute serrata, utrinque glabra, supra lucida, subtus pallidiora, opaca, venosa, nervo medio prominulo, ad venarum inferiorum axillas foveolato. — Odor tritorum amygdalinus, sapor aromaticus, styptico-amarus.

Folia collecta statim in usum convertantur, nec siccata servantur.

331. **Folia Malvae.**

Malvae rotundifoliae Linn. et *Malvae sylvestris* Linn. plantarum sui ordinis, apud nos vulgarium folia longe petiolata, cordato-orbieu-

laria, angulata vel sublobata, lobis obtusis, subduplicate-erenato-dentatis, pilosula, supra saturate viridia, subtus pallidiora, inodora, saporis herbaeeo-mueilaginosi.

Folia e plantis florentibus colligenda sunt.

332. **Folia Melissae.**

Melissae officinalis Linn. plantae *Labiatae*, in Europa australi indigenae, passim in hortis satae folia eaulina, longe petiolata, eordato-ovata obtusa, grosse erenato-serrata, supra saturate viridia, sparsim pilosa, subtus pallidiora, glabriuseula, rugoso-venosa, grate citri odora, saporis aromatici, amariuseuli, subadstringentis.

Paulo ante florum anthesim colleeta et cito siecata in vase bene clauso ne ultra annum serventur.

333. **Folia Menthae crispae.**

Menthae crispae Linn. plantae *Labiatae*, in Europa australi indigenae, apud nos in hortis satae, folia breviter petiolata, eordata vel ovata, bulloso-rugosa, dentata, dentibus productis, saporis et odoris aromatici peculiaris, sub tempore florescentiae colleeta.

334. **Folia Menthae piperitae.**

Menthae piperitae Linn. plantae *Labiatae*, passim in hortis eultae, folia longius petiolata, ovalia et oblonga, acuta, argute serrata, supra glabra, subtus subhirsuta, fragrantia, saporis peculiariter aromatici, frigoris sensum in ore exeitantis, e stirpe florenti deerpta.

† 335. **Folia Nicotianae.**

Nicotianae Tabacum Linn. plantae *Solanaceae* in America meridionali indigenae, apud nos eultae, folia magna oblonga v. ovato-lanceolata, integerrima, acuta, sessilia vel in caule decurrentia, saturate viridia, subtus pallidiora ad nervos pubescentia, tactu pingua, subcarnosa. Odor peculiaris, gravis, sapor aeris, amaro-nauseosus.

Folia siccata venalia tantummodo habeantur.

336. **Folia Persicae.**

Amygdali Persicae Linn. arboris *Amygdaleae* in Persia indigenae, apud nos cultae folia breve petiolata, lanceolata, acuminata, argute serrata, glabra, nitida.

337. **Folia Pulmonariae.**

Folia Pulmonariae maculatae.

Pulmonariae officinalis Linn. herbae *Asperifoliae* in sylvaticis udis vulgaris folia integerrima aenta vel acuminata, obscure viridia, subtus pallidiora, mollia, quandoque pallide maculata, fasciculorum lateralium sterilium cordata v. ovata longe petiolata, caulina inferiora spatulato-ovata, petiolo late alato, superiora ovato-oblonga, sessilia subdecurrentia, inodora, sapore mucilaginoso-subadstringente.

338. **Folia Rosmarini.**

Folia Rosmarini hortensis. Folia Anthos.

Rosmarini officinalis Linn. fruticis ex ordine *Labiatarum*, in Europa australi indigeni, passim in hortis culti, folia anguste lineari-lanceolata, obtusa, margine integerrimo revoluta, supra profunde viridia rugosa, medio sulcata, subtus albo-tomentosa, nervo prominente, odore aromatico gravi, sapore in recentibus acri, terebinthaceo, in siccio multo minore.

339. **Folia Salviae.**

Salviae officinalis Linn. plantae *Labiatae*, in Europa australi indigenae, inter hortenses notissimae, folia petiolata, oblonga, crenulata, rugosa, villosa, crassiuscula. Odor fragrans, aromaticus, sapor similis amariuseculus et adstringens.

Folia sub florum anthesi, siccata tempestate, legenda.

340. **Folia Scabiosae.**

Knantiae arvensis Coult. var. *diversifoliae* Neill. (*Scabiosae arvensis* Linn.) herbae *Dipsacearum* ordini accensendae, in pratis et

agris arenosis trivialis folia ovata, elliptica v. oblonga, hirsuta, omnia v. superiora lyrato-pinnatifida, laciniis lanceolatis v. linearibus, acutis plerumque integerrimis, inferiora in petiolum decurrentia, superiora sessilia, inodora, saporis amaricantis subadstringentis.

341. **Folia Scolopendrii.**

Herba Scolopendrii seu Linquae cervinae.

Scolopendrium officinarum W. e classe *Filicum*, in regionibus montanis Europae meridionalis et Germaniae subalpinis obvium, frondibus (foliis) indivisis, (raro apice incisis) breviter petiolatis, basi subeordatis, oblongis, integerrimis, fere pedalis, laevibus, lacte virentibus, soris oblongis, obliquis, parallelis, indusio spurie bivalvi.

Herbae recentis odor peculiaris, filicinus, sapor subdulcis adstringens.

342. **Folia Sennae alexandrinae.**

Cassiae lenitivae Biseh. plantae sui ordinis folia, maximam partem Sennae alexandrinae, quae prostat, effieientia, lanceolata, acuta, mucronata, basi inaequalia, breviter petiolata, superne ex ochroleuco viridia, subtus glauca, nervosa, pubescentia; et

Cassiae obovatae Collad. plantae sui ordinis folia obovata vel ovalia, retusa cum mucrone exiguo, vix pubescentia.

343. **Folia Sennae sine resina.**

R. Foliorum Sennae alexandrinae

q. v.

Macera per viginti quatuor horas in:

Spiritus vini rectificatissimi

s. q.

deinde exprime et sieca.

† 344. **Folia Stramonii.**

Daturae Stramonii Linn. herbae *Solanaceae*, inter plantas ruderales obviae folia longe petiolata, late ovato-acuminata, sinuato-dentata, supra saturate viridia, subtus pallidiora, siccata servantur.

Sapor amarus nauseosus, odor recentium admodum nauseosus, siccatorum fere nullus.

345. **Folia Taraxaci.**

Taraxaci officinalis Wigg. (*Leontodontis Taraxaci* Linn.) plantae *Compositae* ubique obviae folia radicalia caespitosa, oblonga vel linearilanceolata, polymorpha, runciuato-pinnatifida, dentata vel integerrima, glabra vel juxta nervum medium pubescenti-sabra vel lanuginosa. Legantur vere ante scapi floriferi perfectam evolutionem, in solo pingui nascentia.

346. **Folia Theae.**

Theae viridis Linn. fruticis e *Ternstroemiacearum* ordine in Chinae et Indiae orientalis regno Assam indigeni, ibidem nec non in Japonia sedulo culti folia diversimode siccata nec raro particulis plantarum variarum fragrantibus admixtis, iisdem ae radix Rhei viis ad emporia nostra advehuntur. Secundum eolorem aut nigricantem aut viridescentem, e siccandi ratione, uti tradunt, pendentem, duo maxime mereis genera distinguuntur, quae pro vario adspectu et odore in numerosas rursus varietates discedunt.

Varietatum nigricantium, vulgo „Thea russica“ dietarum, optima celebratur Pekko (Pekoe, Pak-ho), referens folia 1 — 3 pollicees longa, elliptico-oblonga, margine serrulata, interdum bina-quaterna ramulo adhuc adhaerentia, subcoriacea, olivaceo-pulla, juniora subtus argenteo-tomentosa, supra glabra, involuta, adultiora subtus praecipue ad nervum medium pilosa, supra glabra, pleraque margine revoluta. Inter varietates colore viridi insignes notissima illa, quam Perl-Thee (*Thea viridis* imperialis) vocant. Constat foliis tenerioribus supra laevibus, subtus tenuissime puberulis manu contortis et insuper in globulos eireinatim involutis, glaucescenti-prasinis, subpruinosis. Odor utriusque generis peculiariter aromaticus, sapor herbaeus, subamarus.

† 347. **Folia Toxicodendri.**

Rhois Toxicodendri Linn. fruticis ex ordine *Terebinthacearum*. in America boreali indigeni, apud nos in hortis culti folia ternata,

foliolis oblique ovatis, acuminatis, integerrimis, angulato- vel sinuato-dentatis, subtus sublanuginosis, terminali longius petiolato.

Vere manibus tectis caute lecta siccataque servantur.

348. **Folia Trifolii fibrini.**

Menyanthis trifoliatae Linn. plantae e familia *Gentianeae* indigenae scapigerae, in aquis stagnantibus et pratis paludosis vere florentis folia radicalia petiolata, ternata, subsucculenta, petiolis vaginantibus, foliolis obovatis, obtusis, suberenatis, laete viridibus, glabris, inodoris, admodum amaris collecta siccata servantur.

349. **Folia uvae ursi.**

Aretostaphyli officinalis Wimm. et Grab. (*Arbuti uvae ursi* Linn.) fruticuli ex ordine *Eriocarum*, sempervirentis, in montibus calcariis Europae crescentis folia uncialia obovato-cuneiformia, apice subrecurva, integerrima, glabra, rigide coriacea, supra saturate viridia, subtus pallidiora, reticulato-venosa, inodora, saporis amariuseculi, adstringentis.

Siccata servantur. Cave confundas cum foliis *Vaccinii* *Vitis* *ideae*, majoribus, margine revolutis, subtus fusco-punctatis.

350. **Folia Vineae pervinae.**

Vinae minoris Linn. plantae *Apoeynae* in umbrosis et sylvaticis Europae crescentis folia ovata, ovalia et lanceolata, acuta vel obtusa, integerrima, glabra, marginibus scabra.

351. **Formica rufa.**

Formicae rufae Linn. insecti *Hymenopteri*, in sylvis acerosis Europae gregatim degentis individua neutra, aptera, rufa, capite, postice et abdomine nigricante, odorem acidum peculiarem spargentia.

Nonnisi viva et bene a quisquiliis purgata adhibeantur.

352. **Fraga.**

Fragariae vescae Linn. plantae *Rosaceae* cuius notae fructiferae, receptacula carnea, a calycibus mundata, recentia.

Fraga bene matura et in montibus nata elige. Varietates hortenses rejice.

† 353. **Frondes Sabinae.**

Juniperi Sabinae Linn. fruticis ex ordine *Cupressinearum*, in subalpinis Europae crescentis summitates ramulorum, foliis decussatim oppositis, squamiformibus, rhombeis, obtusiusculis, erecto-adpressis, dorso glandula oblonga impressa notatis, ecarinatis tectae. Sapor nauseosus, amarus, resinoso-balsamicus, odor gravis. Collectae et siccatae caute servantur.

† 354. **Frondes Taxi.**

Taxus.

Taxi baccatae Linn. arboris *Coniferae*, in Europa indigenae, in hortis plerumque frutescentis, ramuli novelli, foliis alternis, subdistichis, breve petiolatis, lineari-falcatis, acuminatis.

† 355. **Frondes Thujae occidentalis.**

Thujae occidentalis Linn. arboris sempervirentis, ex ordine *Cupressinearum*, in America spontaneae, apud nos in hortis passim fruticosae ramuli aecipites, foliis squamiformibus quadrifariam imbricatis, late ovatis, obtusis, in utraque ramuli facie lucidis, marginalibus navicularibus, facialibus planis, ecarinatis, dorso glandula tuberculiformi ovali. Nonnisi recentes adhibeantur.

Cave confundas cum frondibus *Biotae orientalis* Endl. (*Thujae orientalis* Linn.) in hortis simul cultae, foliorum facialium glandula lineari distinguendis.

356. **Fructus Anisi stellati.**

Semina Anisi stellati seu Badiani.

Carpidia Illicii anisati Linn. arboris sinensis e *Magnoliacearum* familia, sena usque octona, singuli floris proles, circa columellam

centralem verticillatim contigua, libera, plerumque inaequalia, subovata, a latere compressa, basi subventricosa, apice juxta suturam ventralem bivalvia, coriaceo-sublignosa, e griseo ferruginea, extus rugulosa, intus laevigata, semine solitario, compresso, testa castanea nitida vestito foeta, Anisi odore sed multum gratiore, sapore cum aliqua dulcedine aromatico, subacri.

357. **Fructus Aurantii.**

Citri Aurantii Linn. arboris *Aurantiaceae*, fructus pomiformes notissimi venales, cortice coriaceo spongioso, oleo aethereo gravi.

358. **Fructus Capsici annui.**

Capsicum.

Capsici annui Linn. herbae *Solanaceae*, in America meridionali indigenae, nunc autem in regionibus calidioribus totius orbis cultae baccae (sub nomine Piperis hispanici, indici v. turcici venales) siccae, subcarnosae, multifformes, oblongae, ovatae v. conicae, basi saepe subcordatae, laeves, nitidae, flavae v. rubrae, tenaces, intus biloculares, seminibus plurimis, albis lentiformibus. Odor nullus, sapor fervidus, mordax. Pulvis nares vehementer lacessit, quare sub triturando summa cautione opus est.

Fructus a plantis in regionibus meridionalibus cultis collecti in officinis servantur.

359. **Fructus Cerasorum nigrorum.**

Pruni avium Linn. arboris, ex *Amygdalearum* ordine, apud nos sylvaticae drupae maturae, subglobosae, epidermide atro-purpurascente, parenchymate carnosio, succo sanguineo dulci turgesciente, putamine rotundato-ovato acuto, semine albo, striato, odore et sapore Amygdalas amaras aemulante. Exsiccatæ servantur.

360. **Fructus Citri.**

Citri medicae Linn. arboris e familia *Aurantiacearum*, in Europa australi passim cultae fructus (mala citrea dicti) notissimi, ova-

utrinque mammillato-acuminati, sub cortice, pallide-flavo coriaceo suberoso, glandulis oleiferis rugoso, concalescentes parenchyma diaphanum, succo acidissimo foetum.

† 361. **Fructus Colocynthis.**

Cucumeris Colocynthis Linn. plantae *Cucurbitaceae*, in Oriente cultae, pepo subglobosus, mali magnitudine, siccatus et decorticatus adfertur, sistens substantiam spongiosam et levissimam, albam, sexlo-
eularem, amarissimam, inodoram, includentem semina plurima, ovata, utrinque compressa, albida. Seminibus remotis adhibeatur.

Colocynthises octoloeulares, minus amarae, ex ignota adhuc specie collectae, rejiciantur.

† 362. **Fructus Elaterii.**

Ecbalii agrestis Reichenb. (*Momordicae Elaterii* Linn.) plantae *Cucurbitaceae*, in Europa australi indigenae, nobis in hortis cultae pepones sesquiunciales vel biunciales, cylindrici, luteo-virides, muricati et setis rigidis undique teeti, triloeulares, in succo mucilaginoso amarissimo semina plurima, ovalia, fusca vel nigra includentia.

Fructus ante perfectam maturitatem caute decerpendi, ne succum cum seminibus explodant, et statim ad parandum extractum Elaterii adhibendi.

363. **Fructus Pruni siccati.**

Drupae exsiccae *Pruni domesticae* Linn. arboris ex Oriente probabiliter olim advenae, apud nos cultae, ex *Amygdalearum* familia notissimae.

364. **Fructus Tamarindi.**

Pulpa leguminum *Tamarindi indicae* Linn. arboris spectabilis, e familia *Caesalpinearum* in India orientali, nec non in Africae borealis tropicis subtropicisque sponte nascentis, in insulas Antillanas translata, substantiam sistens carnosam, intra pericarpium crustaceum fragile et

endocarpium corneum sitam. A peregrinis cortice rejeeto malaxata et venumdata refert massam irregularem fuseo-nigram, tenacem, e pulpa ipsa, adhaerente endocarpio et seminibus duris splendentibus, fuscis, compressis, interpositis, nec non fibrillis lignosis quandoque intextis conflata, odoris vinosi, saporis grate aciduli, subadstringentis. Caveto a merce fusea, sapore nimis acerbo praedita, aut Cupro inquinata.

365. **Galbanum.**

Gummiresina e *Ferula erubescens* Boiss., planta *Umbellifera* Persiae, collecta, prostat in granis pisi magnitudine, oblongis, discretis vel in massam e viridi et rubro flavescentem compactis, plus minus diaphanis v. opacis, resinoso-nitentibus. Cerae in modum tenax, nonnisi frigore et difficulter in pulverem redigitur. Odor gravis, nauseoso-balsamicus, sapor eum acredine amarus. Solvitur nonnisi pro minore parte in spiritu vini, trita eum aqua emulsionem praebet.

Eligatur merces purior, e granis vel e massis constans, quibus grana plurima lactea insunt.

366. **Gallae Quercus turcicae.**

Exerescunt e gemmis foliiferis *Quercus infectoriae* Linn. arboris *Cupuliferae* sempervirentis in Oriente indigenae, ietu *Cynipis Gallae tinctoriae* Oliv. (*Cynipis tinctoriae* Hartig) laesis nascentes, globosae, durae, ponderosae, extus plus minus verruculosae, viridi-caesia, nigrescentes v. fuscae, intus densae, griseo-fuscae, flavieantes, centro cavae, insecti nympha includentes, odoris nullius, saporis admodum adstringentis. Eligantur Gallae ponderosae, densae, extus verrucosae, rejiciantur leves, spongiosae, verrucis carentes, perforatae, ejusdem v. affinium insectorum ietu in Quercubus variis Europae australis et etiam nostratibus natae.

367. **Gelatina Carragheen.**

R. Carragheen	<i>drachmas tres,</i>
eoque eum	
Aquae fontanae	<i>libra una</i>
ad colaturam	<i>unciarum trium,</i>

in qua per linteum fortiter expressa solve:

Sacchari albi

unciam unam.

Refrigerando fiat gelatina ponderis

unciarum quatuor.

Ex tempore paranda.

368. **Gelatina Lichenis islandici.**

R. Lichenis islandici aqua frigida bene loti *unciam unam.*

Coque in

Aquae fontanae

libra una

ad colaturam

unciarum sex.

deinde solve

Sacchari albi

unciam unam,

leni calore inspissa et iterum cola ad pondus

unciarum quatuor.

Frige facta in gelatinam coëat.

Ex tempore paranda.

369. **Gelatina Lichenis islandici pulverata.**

R. Gelatinae Lichenis islandici ex tempore
paratae

q. v.

In patina porcellanea sub continua agitatione inspissatam et deinde in
furno siccata redige in pulverem.

Serva in vase vitreo, optime clauso.

370. **Gelatina Liquiritiae pellucida.**

R. Radicis Liquiritiae decorticat. et siccae *unciam unam,*
contusa infundatur eum:

Aquae fontanae

libris sex.

In colatura solve:

Gummi arabici electissimi

libras duas,

Sacchari albi

uncias viginti.

Solutio iterum colata leni igne evaporetur

ad medietatem.

Deinde spuma et pellicula supernatante accurate detractis adde:

Aquae Aurantiorum florum

unciam unam.

Massam infunde in capsulas chartaceas et siccam in frustula minora scinde.

Sit diaphana, fusco-flava.

371. **Gemmae Populi.**

Populi nigrae Linn. arboris e familia *Salicinearum* indigenae, gemmae e perulis resinoso-viscidis, suaveolentibus compositae, vere antequam dehiscant collectae et recentes adhibitae, vel siccatae in usum repositae.

372. **Glandes Quercus.**

Nuces (achenia) *Quercuum* indigenarum, imprimis *Quercus pedunculatae* Ehrh. et *Quercus sessiliflorae* Sm. e *Cupuliferarum* ordine, ovali-oblongae, obtusae, intra pericarpium coriaceo-lignosum, flavo-fuscum, laeve, nitidum, basi fere derasum includentes semen solitarium, e cotyledonibus 2, plano-convexis, crassis, cartilagineo-carnosis, pallide viridescens, ope radiculae immersae leviter cohaerentibus ideoque facile dilabentibus, testa membranacea spadicea vestitis constans. Sapor austerus.

In officinis semina pericarpio exuta servantur.

Sint perfecte matura, nec vetustate insectisve corrupta.

373. **Glandes Quercus tostae.**

Semina *Quercuum* e pericarpis exempta, et leni igne siccata, in vase ferreo sub continua agitatione tamdiu torreantur, donec colorem fuscum induerint, et facile frangantur. Refrigerata in pulverem grossiusculum contunde.

374. **Graphites seu Plumbago.**

Fossile, structurae lamellosae vel densae, griseo-nigrescens, metallico-nitens.

375. **Graphites elutriatus.**

R̄. Graphitis subtilissime pulverati q. v.

optime cum

Aquae fontanae

s. q.

clutria.

Sit pulvis subtilissimus, griseo-niger.

376. **Gummi arabicum.**

Gummi Mimosae.

Succus aëre induratus e variis *Acaciae* et *Mimosae* speciebus, arboribus *Leguminosis* in Africae borealis desertis crescentibus sponte manans. Occurrit substantia notissima in frustulis plus minus globosis, albicantibus vel flavis, vitreo-nitentibus, magis aut minus pellucidis, fractura conchoidea dissilientibus, inodoris, saporis fatui. In spiritu vini insolubile, in aqua frigida et calida facile solvitur. Calore minime liquatur, et intumescendo difficulter comburitur.

Pro usu pharmaceutico nonnisi album, electum adhibeatur.

377. **Gummi Guajaci.**

Guajacum nativum.

Succus resinosus inspissatus *Guajaci officinalis* Linn. arboris insularum Antillanarum ex ordine *Zygophyllearum*, nigro-viridis, fragilis, in frustis majoribus opacus, minoribus pellucidus, saporis sub-amari, aeris, super pruna injectus odoris specificae grati.

Pulvis luci expositus virescit.

Guajacum nativum ab artefacto cognoscitur minori in spiritu vini solubilitate.

Solutio alcoholica cum aqua destillata mixta, continuo lactea, post aliquot horas sit coerulea.

378. **Gutta Percha.**

Isanandrae Guttae Hook. arboris *Sapoteae* in insulis Indiae orientalis majoribus occurrentis succus lacteus induratus. Venundatur in massis ponderosis, quisquiliis variis inquinatis, coriaceis, fulvis vel flavescentibus, rarius albidis, opacis, duris. Temperatura 50° C. superante fit elastica, ad 65 — 70° C. aucta demum plasticè emollitur.

Aqua fervida diutius contrectata a quisquiliis adhaerentibus depurgetur.

† 379. **Gutti.**

Gummi Guttae.

Gummiresina ex Asia tropica, imprimis e China advecta, ex arboribus *Hebradendro cambogioides* et *Xanthochymo ovalifolio* Roxb. ordinis *Clusiacearum* manans. Occurrit in frustis majoribus, compactis, fractura conchoidea facile dissilientibus, luteo-rubris. Trita praebet pulverem citrinum, madefacta colorem laete flavum. Sapor cum aliqua dulcedine acris.

380. **Helminthochorton.**

Sphaerococci Helminthochortos Agh., *Sphaerococci confervoidis* Agh. et *Ceramii fruticulosi* Roth., *Algarum* ad litora insulae Corsicae nec non Dalmatiae submarine crescentium thallus ramosissimus, filiformis, purpureus vel fuscescens, ramulis tenuissimis teretibus, uni-bipollicaribus, extus transversim striatis, articulatis, sporangiis oblongis vel globosis, lateralibus, sessilibus.

Cave, ne nimia aliarum Algarum et Zoophyitarum vel arenae adhaerentis copia sit inquinatum.

381. **Herba Absinthii.**

Artemisiae Absinthii Linn. plantae indigenae *Compositae* herba, ante florum anthesim collecta et siccata. Sistit folia tomento tenui, imprimis subtus incana, alia radicalia triplicato-pinnatifida, alia caulina bipinnatifida pinnatifidave.

Odor gravis aromaticus, sapor acri-aromaticus, amarissimus.

† 382. **Herba Aconiti.**

Aconiti Napelli Linn. et varietat. plantarum indigenarum monticolarum e familia *Ranunculacearum*, herba recens, brevi ante florum

evolutionem collecta. Exhibet folia alterna palmatisecta, nitida, utrinque glaberrima, supra saturate viridia, subtus pallidiora, lobis cuneiformibus, plerumque quinque, trifidis, segmentis tripartitis vel dentato-incisis.

Odor tritae nauseosus, sapor primum vix manifestus, deinde accerimus.

Herbam in hortis cultam rejice, et nonnisi recentem adhibe.

383. **Herba Adianti.**

Capilli Veneris.

Adianti Capilli Veneris Linn. *Filicis* in Europae australioris rupibus humidiusculis nascentis frondes tenellae decompositae, stipite atro-fusco nitido, ramulis filiformibus, laciniis stipitatis obovato-cuneiformibus, laete viridibus, nervosis, superne inciso-lobatis, lobis crenatis, margine sorum linearem, indusio squamaeformi velatum gerentibus.

Trita vel aqua fervente infusa odorem spargit grate aromaticum. Sapor dulciusculus, modice adstringens, cum aliqua amaritudine subacri.

384. **Herba Asteri montani.**

Inulae squarrosae Linn. plantae *Compositae* in sylvaticis ac montanis Istriae, Dalmatiae et Italiae superioris occurrentis herba florida caule erecto, anguloso, valde folioso, cubitali, foliis coriaceis, sessilibus, oblongis, acutis, cum marginibus remote minuteque serrulatis, ad nervos subtusque scabris, capitulis campanulatis, corymbose confertis, involucri squamis imbricatis coriaceis, late ovatis, apice patulo-reflexis, margine scabris, receptaculo epaleato.

† 385. **Herba Belladonnae florida.**

Atropa Belladonna Linn. planta *Solanacea* in sylvaticis totius Europae obvia, radice crassa, fusiformi, ramosa, caulibus 4 — 6 pedali-
bus, rubro-fuscis, ramosis, foliis alternis, vel binis approximatis, ovatis, acutis, brevi-petiolatis, integerrimis, mollibus, glabris, subtus ad venas glanduloso-puberulis, floribus axillaribus solitariis, nutantibus, campanulatis, sordide purpurascens.

386. **Herba Calendulae.**

Calendulae officinalis Linn. plantae *Compositae* inter hortenses admodum vulgaris herba cum capitulis nascentibus collecta et siccata, tota breviter glanduloso-pilosa, foliis spathulato-lanceolatis, inferioribus sessilibus, superioribus amplexicaulibus, capitulis in apice ramorum solitariis. Odor recentis nauseoso-balsamicus, sapor amarus, subsalsus.

† 387. **Herba Cannabis.**

Cannabis sativae Linn. herbae dioicae proprii ordinis, in Asia indigenae, longe lateque cultae, summitates plantarum pistilligerarum in officinis obviae sistunt ramulos foliis scabris, infra pallidioribus, inferioribus oppositis, superioribus alternis, palmatisectis, segmentis lanceolatis, serratis, foliis floralibus interdum indivisis, linearibus subintegerrimis, floribus viridescentibus, inconspicuis, axillaribus, spicas foliatis formantibus. Herba recens trita gravem, narcoticum spargit odorem.

388. **Herba Centaurii minoris florida.**

Erythraeae Centaurii Pers. (*Gentiana Centaurium* Linn.) plantae biennis indigenae ex ordine *Gentianeae* in sylvaticis montanis vulgaris herba cum summitatibus floridis, exhibet caules simplices, folia opposita, sessilia, ovalia et ovato-lanceolata, obtusa, integerrima, trinervia, glabra et cymas terminales fasciculatas, e floribus compositis pentameris, calyce tubuloso, corolla infundibuliformi rubella praeditis. Odor nullus, sapor admodum amarus. Colligatur herba cum floribus perfecte apertis, antheris pulvere emisso in spiram contortis et remotis caulibus aut ramis crassioribus siccetur.

† 389. **Herba Chelidonii majoris.**

Chelidonii majoris Linn. plantae perennis *Papaveraceae*, in humidis umbrosis et ruderalis pinguibus Europae totius crescentis, succo croceo amaro-aeri turgidae, divaricato-ramosae, foliis pinnatipartitis, lobis

ovatis, sinuato-lobulatis, flavo-viridibus, floribus umbellatis luteis, herba reeens ante florum anthesim collecta.

390. **Herba Chenopodii ambrosioidis.**

Chenopodii ambrosioidis Linn. plantae *Chenopodeae* annuae in America calidiore, imprimis in Mexico sponte crescentis, apud nos in hortis cultae, herba florida, exhibet caules erectos, folia alterna, petiolata, lanceolata, acuta, serrato-dentata, dilute viridia et flores minutos, globosos, virides, in racemos axillares et terminales simplices dispositos. — Herbae recentis odor fragrans, siccae si teritur camphorato-terebinthaeus, sapor camphorato-aromaticus, subrefrigerans, amari-useulus

+391. **Herba Conii maculati.**

Conii maculati Linn. plantae nostratis *Umbelliferae*, in hortis et ruderalis vulgaris, odoris peculiariter nauseosi, caule maculis viscidis rubris consperso insignis, folia tripinnati-partita, laciniis oppositis, laciniulis pinnatifidis, summis confluentibus inciso serratis, ante florum anthesim collecta et rejectis petiolis crassioribus tum recentia adhibenda, tum siccata in vase bene elauso servanda.

392. **Herba Equiseti.**

Equiseti arvensis Linn. herbae sui ordinis, in pratis et agris humidis Europae sat frequentis, caules steriles sulcati, fistulosi, articulati, scabri-useuli, virides, juxta articulos vagina scariosa 5 — 15 dentata cincti, ibidemque verticillatim ramosi, ramis cauli conformibus.

393. **Herba Fumariae.**

Fumariae officinalis Linn. et *Fumariae Vaillantii* Rich. plantarum *Papaveracearum* in agris et cultis passim crescentium herba recens et sicca, foliis in caule flaccido, succoso alternis, duplicato-pinnatifartitis, laciniis linearibus, glaucescenti-viridibus, glabris.

Odor nullus, sapor amarus, siccatae magis salsus.

394. **Herba Galeopsidis grandiflorae.**

Galeopsidis grandiflorae Ehrh. (*Galeopsis ochroleuca* Linn.) plantae *Labiatae* annuae, in agris et arvis arenosis Germaniae mediae et occidentalis vulgaris, herba florida, absque radice, minutim coneisa et sub nomine Theae Blankenheimensis v. Herbae Liberianae nota. Caulem habet pedalem, erectum, pilis adpressis mollibus pubescentem, ad geniculos haud tumidum, ramosum. Folia opposita, petiolata, basi integerrima, eaulina ovata, ramorum ovato-lanceolata, utrinque subsericeo-pilosa, flavescenti-viridia, subtus pallidiora, tactu mollia. Florum verticilli inferiores remoti, superiores approximati. Calyces campanulati viscoso-pilosi, aristato-quinquedentati, corollae bilabatae, ochroleucae, calyce multo longiores.

Herbae tritae odor subbalsameus, sapor subsalso-amaricans, mucosofatuus.

† 395. **Herba Gratiolae.**

Gratiolae officinalis Linn. plantae indigenae ex ordine *Scrophularinearum*, in pratis paludosis crescentis herba florida recens et siccata, sistit caules pedales tetragonos, geniculatos, glabros, folia opposita, sessilia, lanceolata, basi integerrima, versus apicem serrata, laete viridia, glabra, flores axillares solitarios, pedunculatos, albidos aut pallide rubros.

Odor fere nullus, sapor amarissimus, nauseosus.

396. **Herba Hyssopi.**

Hyssopi officinalis Linn. plantae *Labiatae*, in Europa australi indigenae et inter hortenses passim cultae herba foliis oppositis, lineari-lanceolatis, integerrimis, cum floribus terminalibus verticillato-spicatis, secundis, coeruleis, rubellis v. albidis legenda et siccanda.

397. **Herba Jaceae.**

Herba Violae tricoloris.

Violae tricoloris Linn. plantae *Violaceae*, in arvis ubique obviae herba florida, foliis ovatis vel ovato-oblongis, petiolatis, dentatis, stipulis

lyrato-pinnatifidis, floribus tricoloribus e violaceo aut caeruleo, albo et flave variegatis.

Herba florida absque radice caute siccetur.

† 398. **Herba Lactueae virosae.**

Lactueae virosae Linn. plantae *Compositae* in ruderalis pinguibus et hortis rarius obviae, herba recens, ante capitulorum anthesin collecta, distinguitur foliis horizontalibus, carina aculeatis, ovato-oblongis, obtusis, spinuloso-denticulatis, basi cordatis v. sagittatis, integris vel sinuatis.

399. **Herba Linariae.**

Linariae vulgaris Mill. (*Antirrhini Linariae* Linn.) plantae ex ordine *Scrofularinearum*, ubique in arvis et campis obviae, herba florida, foetidiuscula, caule pedali, foliis sparsis, sessilibus, anguste lineari-lanceolatis acutis, integerrimis, trinerviis, glabris, floribus personatis, calcaratis, flavis, in racemos terminales densos dispositis.

Nonnisi recens adhibeatur.

† 400. **Herba Lobeliae inflatae.**

Lobeliae inflatae Linn. plantae biennis sui ordinis in America boreali spontaneae, apud nos in hortis cultae, herba florida, caule pedali, inferne simplicis, superne ramuloso, glabro, foliis alternis, sessilibus, oblongo-lanceolatis, acutis, serratis, floribus racemosis, parvis, calyce inflato, corolla subbilabiata, coerulea. — Sapor initio debilis, deinde peracris.

401. **Herba Majoranae.**

Origani Majoranae Linn. plantae *Labiatae*, in Europa australi indigenae, passim in hortis cultae herba cum summitatibus florentibus, foliis oppositis, parvis, ellipticis, integerrimis, utrinque cano-tomentosis, floribus in spicas terminales ternas digestis, bracteis imbricatis, sulcatis, suffultis.

Odor et sapor peculiariter aromaticus.

402. **Herba Marrubii albi.**

Marrubii vulgaris Linn. plantae *Labiatae*, in arenosis siccis obviae summitates, foliis oppositis, petiolatis, subrotundo-ovatis, obtusis, crenatis, rugosis, cinereo-viridibus, utrinque villosis, subtus imprimis reticulatis, cum floribus terminalibus, nondum explicatis colligendae.

Odor peculiaris, balsamicus. Sapor aromatico-amarus.

403. **Herba Meliloti florida.**

Meliloti officinalis Desrouss. (*Trifolii Meliloti* Linn.) plantae *Papilionaceae*, in pratis et pascuis passim crescentis, herba cum floribus. Folia alterna, pinnatim trifoliata, foliolis oblongo-lanceolatis, obtusis, argute serratis. Flores parvi, flavi, in spicas elongatas dispositi. Odor recentis fere nullus, siccatae gravis, aromaticus, sapor amariuseculus, subsalsus.

404. **Herba Millefolii florida.**

Achilleae Millefolii Linn. plantae *Compositae* in agris arvisque vulgaris, herba florida, foliis alternis bipinnatifidis, laciniis brevissimis, filiformibus, setula terminatis, hirtis, capitulis parvis, albis, in corymbum terminalem, densum, fastigiatum dispositis. — Odor aromaticus, sapor subsalsus, amariuseculus, aliquantum adstringens.

Planta nonnisi capitulis bene explicatis, in collibus apricis colligenda.

405. **Herba Origani.**

Origani vulgaris Linn. plantae *Labiatae*, ad vias et sepes vulgaris, herba cum summitatibus florentibus, foliis oppositis, petiolatis, ovatis, acutis vel obtusiusculis, subintegerrimis, utrinque pubescenti-scabriusculis, florum spicis densis, bracteatis, in corymbum terminalem dispositis.

Odor fragrans, sapor aromaticus, subamaricans.

406. **Herba Polygalae amarae.**

Polygalae amarae Linn. plantae nostratis, ordinis *Polygalearum*, herba florida cum radice tenui, filiformi, foliis radicalibus caespitosis,

subrotundis vel obovatis, eaulinis minoribus oblongis vel lanceolatis, floribus racemosis, coeruleis.

Odor nullus, sapor admodum amarus.

† 407. **Herba Pulegii.**

Menthae Pulegii Linn. plantae *Labiatae* perennis, in humidis Europae mediae occurrentis herba florida, caule ramoso prostrato radiante, demum adscendente, foliis ovatis ovalibusve obtusis, integerrimis vel supra medium remote serrulatis, pellucide punctatis, glabriusculis, florum verticillis numerosis remotis, subsessilibus, calycibus hispidis bilabiatis, fauce villosis, corollis rubro-violaceis pubescentibus parvulis.

Herba trita odorem peculiarem aromaticum spirat, masticata cum amaritie acriter sapit.

† 408. **Herba Pulsatillae.**

Anemones pratensis Linn. (*Pulsatillae pratensis* Mill.) plantae *Ranunculaceae* in collibus aridis pratisque siccissimis Europae mediae ereseantis herba florida, caule erecto, unifloro, foliis radicealibus bi-tripinnatipartitis, vilosis, cum laciniis linearibus integerrimis acuminatis, involuero a flore remoto palmati-multipartito, flore sub anthesi eernuo campanulato, atro-violaceo, infra apicem subeonstrieto, foliolis calycinis adpressis, apice recurvis.

409. **Herba Rutae.**

Ruta graveolens Linn. planta sui ordinis in Europa australi indigena, frequenter in hortis sata, caule superne herbaeae, foliis petiolatis bipinnatis vel decompositis, glauco-viridibus, foliolis integris vel ineisis oblongis vel ovalibus obtusis, basi angustatis, terminali latiore obovato, omnibus erassiusculis, subtus glanduloso-punctatis, floribus corymbosis, luteis tetrapetalis. Odor peculiaris gravis, aromaticus, sapor aromatico-aeris.

410. **Herba Saponariae.**

Saponariae officinalis Linn. plantae campestris, ex ordine *Caryophyllacearum* herba caule erecto, tereti, superne ramoso, pubescenti-

scabriusculo, foliis ad genicula oppositis, breviter petiolatis, ovato-lanceolatis, acutis, glabris trinerviis, parce venosis, margine scabriusculis.

Ante florum anthesim carpenda et sicca servanda.

411. **Herba Satureiae.**

Satureia hortensis Lin n. herba e familia *Labiatarum*, Europae australis cives, in hortis nostris crebro culta, odore ac sapore gravi, aromatico, a basi ramosa, foliis oppositis, lineari-lanceolatis, acutis, integerrimis, crassiusculis, glabris v. basi ciliatis, aveniis, utrinque glanduloso-punctatis; floribus in cymis paucifloris axillaribus, pallide roseis vel albis.

Herba, tum floret, legenda.

412. **Herba Scordii.**

Teucrium Scordium Lin n. herba *Labiata* in pratis et fossis humidis totius paene Europae nec tamen ubique vulgaris; caule herbaceo erecto vel ascendente, ramoso villosa; foliis oppositis, sessilibus, oblongo-lanceolatis, obtusis, grosse serratis, pubescentibus, triste viridibus, inferioribus basi rotundatis, quandoque purpurascens, superioribus minoribus, basi angustatis et versus apicem tantum serratis, floribus pedicellatis, 1 — 4 axillaribus, pallide purpureis. Herbae recentis odor aromaticus alliaceus, sapor primum subacerbo-aromaticus, tum intensive amarus.

Legantur summitates, caute siccandae et loco sicco servandae.

413. **Herba Serpylli florida.**

Thymi Serpylli Lin n. plantae *Labiatae*, in locis siccis apricis vulgaris, herba cum summatibus florentibus, foliis oppositis, sessilibus, ovatis, integerrimis, supra laete virentibus, subtus pallidioribus, punctatis, floribus terminalibus verticillato-capitatis, rubellis. Odor fragrans, sapor aromaticus, subamaricans.

414. **Herba Spilanthi.**

Spilanthi oleracei Linn. plantae *Compositae* in America australi et India orientali sponte crescentis, apud nos in hortis cultae herba florida, foliis cordato-ovatis, crenato-serratis, scabriusculis, viridibus ac luride purpurascens, capitulis axillaribus solitariis, longe pedunculatis, subglobosis, multifloris, primum flavis, demum purpureo-fuscis.

Herba masticata acerrima, urens, syallagoga.

415. **Herba Tanaceti florida.**

Tanaceti vulgaris Linn. plantae *Compositae* vulgaris, herba florida, foliis bipinnato-partitis, pinnis oblongo-lanceolatis, inciso-serratis vel pinnatifidis, saturate viridibus, glabris vel parce pilosis, punctatis, capitulis terminalibus, corymbosis, discoidis, aureis. Odor gravis, aromaticus, sapor aromatico-amarus.

416. **Herba Valerianae celticae.**

Valeriana celtica Linn. herbula ex ordine proprio, summas Germaniae et Helvetiae alpes inhabitans, una cum rhizomate aestate effossa in officinas adfertur. Rhizoma obliquum, fibris numerosis, foliorumque emortuorum residuis squamaeformibus ferrugineis obsitum, caulis 1—4 pollices adscendens, glaber; folia radicalia $\frac{1}{2}$ —1 poll. longa cuneato-oblonga, integerrima, nervosa, supra saturate viridia, nitida, subtus pallidiora; caulina opposita, pauca, lineari-oblonga; flores spicato-racemosi, sordide lutescentes, extus purpura suffusi.

Rhizoma gaudet odore admodum penetrabili, aromatico, sapore aromatico-amaro.

417. **Hirudines.**

Animalis *Annulati Apodi* ad sanguinem sugendum apti duplex species, quarum alterutra in officinis prostet.

Sanguisuga medicinalis Savign. supra olivacea, lineis longitudinalibus sex ferrugineis, lateralibus nigro punctatis; subtus cinerea maculis margineque nigris.

Sanguisuga officinalis Savign. supra medio olivacea, linea utrinque lateribusque nigro variegatis seriatim maculatis ferrugineis; subtus cinerea, immaculata, vitta utrinque laterali nigra.

Haemopsis sanguisorba Savign. (*Hirudo sanguisuga* Linn.) ad sugendum inepta distinguitur dorso irregulariter punctato, haud lineato.

418. **Hordeum erudum.**

Hordei vulgaris Linn. aliarumque varietatum, *Graminearum*, cultarum fructus notissimi.

419. **Hordeum perlatum.**

Hordeum ope molae excorticatum, notissimi inter cibaria usus, ad decoctum Hordei solum adhibeatur.

† 420. **Hydrargyrum bichloratum ammoniatum.**

Mercurius praecipitatus albus. Hydrargyrum ammoniato-muriaticum. Hydrargyrum amidato-bichloratum.

R̄. Hydrargyri bichlorati corrosivi *uncias quatuor*,
solve in

Aquae destillatae *libris septem.*

Solutioni filtratae instilla

Ammoniae purae liquidae *s. q.*

quamdiu praecipitatum gignitur.

Praecipitatum cito in linteum collectum fac eguttare et lava cum aquae destillatae frigidae parva quantitate, exprime et loco obscuro in temperatura ordinaria exsicca.

Sit pulvis albissimus, in acido hydrochlorico penitus solubilis, cum Kali caustico soluto flavescens et Ammonium exhalans, in igne penitus avolans.

† 421. **Hydrargyrum bichloratum corrosivum.**

Mercurius sublimatus corrosivus. Hydrargyrum muriaticum corrosivum. Hydrargyrum perchloratum. Murias Hydrargyri corrosivus.

Praeparatum officinarum chemicarum. Massam exhibet albam, ponderosam, ex parte pellucidam, textura fibrosa, crystallina, inodoram, saporis admodum metalliei, aeris, in octodecim partibus aquae frigidae, et in duabus ad tribus bullientis, in spiritus vini reetificatissimi partibus tribus, et in aetheris quatuor solubilem, calore omnino volatilem.

† 422. **Hydrargyrum bijodatum rubrum.**

Mercurius jodatus ruber. Hydrargyrum perjodatum. Deutojoduretum Hydrargyri.

Ry. Hydrargyri bichlorati corrosivi *unciam unam.*

Solve in

Aquae destillatae calidae *unciis sedecim.*

Seorsim solve

Kalii jodati *drachmas decem*

in

Aquae destillatae *unciis quatuor.*

Utramque solutionem confunde et agitando misce.

Praceipitatum aqua destillata bene ablutum in temperatura ordinaria sieca et in pulverem tritum serva.

Sit pulvis laete scarlatinus, in aqua non solubilis, in spiritu vini fervido, in Kalio jodato et Hydrargyro bichlorato et acido hydrochlorico solubilis, facile liquescens, igne avolans et in crystallos coiens flavas, quae postea rubrum colorem iterum induunt.

† 423. **Hydrargyrum chloratum mite.**

Calomel. Hydrargyrum muriaticum mite. Chloretum Hydrargyri. Protochloretum Hydrargyri. Mercurius dulcis. Murias Hydrargyri mitis. Panacaea mercurialis. Aquila alba. Manna metallorum. Draco mitigatus.

Praeparatum officinarum chemicarum.

In mortario vitreo in pulverem subtilissimum redaetum optime elue aqua destillata fervida, deinde siccatum in loco obscuro serva.

Sit pulvis subtilissimus, impalpabilis, flavide albus, ponderosus, in aqua, spiritu vini et aethere insolubilis, in igne penitus volatilis, eum

Ammonia pura liquida nigrescat. Sit ab Hydrargyro bichlorato corrosivo plane liber.

† 424. **Hydrargyrum jodatum flavum.**

Hydrargyrum subjodatum. Mercurius jodatus flavus. Protojoduretum Hydrargyri.

R. Hydrargyri rectificati *unciam unam,*
Jodi *drachmas quinque.*

Spiritu vini humectata tere in mortario vitreo, donec globuli metallici penitus disparuerint, curans ut massa triturando semper sit humida. Exsicca loco tepido, et serva in vase clauso luci impervio.

Sit pulvis e virescenti flavus, lucis aditu decomponendus, in aqua et spiritu vini non solubilis, in igne penitus avolans.

† 425. **Hydrargyrum oxydatum rubrum.**

Mercurius praecipitatus ruber. Oxydum Hydrargyri.

Praeparatum officinarum chemicarum. In pulverem subtilissimum redactum aqua destillata fervida ablue, et siccatum loco obscuro caute serva.

Sit pulvis luteo-ruber, subtilissimus, in tubo vitreo calefactus absque vaporibus nitrosis volatilis, in acido nitrico solubilis.

Ne sit pulveribus alienis rubris inquinatus.

† 426. **Hydrargyrum oxydulatum nigrum Hahnemanni.**

Mercurius solubilis Hahnemanni. Mercurius praecipitatus niger Hahnemanni. Oxydulum Hydrargyri nitrico-ammoniacale.

R. Hydrargyri rectificati *uncias duas,*
affunde in vase vitreo:

Acidi nitrici diluti puri *uncias quatuor,*
sepone in locum frigidum, quamdiu crystalli nascuntur, et donec vapores gas nitrosi evolvi desierint.

Crystallorum pulveratarum *uncias duas,*
 solve in
Aquae destillatae *unciis quinquaginta,*
Acidi nitrici diluti puri *granis centum.*
 Solutio filtrata praecepitur eum
Ammoniae purae liquidae *scrupulis tredecim,*
 ope tubuli vitrei ad fundum solutionis conductis. Liquido statim a sedi-
 mento nigro defuso, illud cum aqua destillata calida 30° C. ablue, in
 filtro collige, egutta, per chartam bibulam in temperatura ordinaria
 exsiccata, et in vas clausum loco obscure seponere.
 Sit pulvis ater, velutinus, inodorus, in igne volatilis, in acido acetico
 concentrato fervido praeter pauculum pulveris grisei solubilis, et cum
 Kali caustico soluto commixtus, leni imprimis calore, Ammonium exhalet.

427. **Hydrargyrum rectificatum.**

Mercurius vivus rectificatus.

Metallum venale in temperatura ordinaria fluidum, mobilissimum,
 chartae non adhaerens, coloris argentei, splendidissimum, aucto calore
 penitus avolans.

Omne Hydrargyrum empticum ante usum pharmaceuticum inqui-
 ratur; tenax vel alienis metallis inquinatum jam in mereando rejiciatur.

† 428. **Hydrargyrum stibiato-sulfuratum.**

Aethiops antimonialis. Sulfuretum Hydrargyri stibiatum.

R̄. Stibii sulfurati nigri

Hydrargyri sulfurati nigri *aa uncias duas.*

Commisce et per linteum trajice.

Sit pulvis subtilissimus, e griseo niger, inodorus, in quo etiam per
 lentem globuli Hydrargyri non appareant, igne ex parte volatilis.

† 429. **Hydrargyrum sulfuratum nigrum.**

Aethiops mineralis. Sulfuretum Hydrargyri nigrum.

R̄. Hydrargyri rectificati

Sulfuris sublimati loti *aa uncias duas.*

Tere in mortario vitreo, aqua interdum conspergendo, donec globuli metalliei omnes evanuerint.

Sit pulvis subtilis, ater, insipidus, igne penitus volatilis, in Kali caustico soluto solubilis.

430. **Hydrargyrum sulfuratum rubrum factitium.**

Cinnabaris factitia.

Praeparatum officinarum chemiearum.

Sit pulvis subtilissimus, laete ruber, inodorus, insipidus, igne volatilis, in acido nitrico insolubilis.

431. **Hydromel infantum.**

R̄. Infusi laxativi
Syrupi mannati

uncias tres,
unciam unam.

Misce.

432. **Ichthyocolla.**

Colla piscium.

Tunica interior vesieae natatoriae *Accipenserum* piseium *Ganoideorum*, maceratione a tunica exteriori separata, et preli ope compressa, exhibet annulos lyriformes vel lamellas tenues, albidas, diaphanas, tenacissimas, inodoras et insipidas, in aqua fervida et spiritu vini ex toto solubilis, solutione admodum glutinante, concentrata et refrigerata in gelatinam spissam abeunte.

433. **Indicum.**

Pigmentum e *Indigofera tinctoria* Linn. aliisve speciebus hujus generis, plantarum *Papilionacearum* paratum, occurrit, in frustulis irregularibus, diversae magnitudinis, aqua levioribus, compactis, friabilibus, obscure caeruleis, ungue si fricantur nitorem eupreum exhibentibus.

Indicum in acido sulfurico concentrato solvatur solutione nigro-azurea, igne aperto combustum majorem copiam substantiarum incombustibilium ne relinquat.

434. **Infusum laxativum.**

Aqua laxativa Viennensis. Infusum Sennae compositum. Potio laxans Viennensis.

R̄. Foliorum Sennae alexandrinae *drachmas sex,*
Aquae fontanae fervidae *uncias sex,*

infunde per quadrantem horae.

In colatura expressa solve

Mannae electae *unciam unam,*
 et clarificatam exhibe.

† 435. **Jodum.**

Sistit lamellas squamosas, crystallinas, splendentes, nigro-griseas, molles, Graphiti admodum similis, odoris peculiari, gravis, fere Chlori, saporis acerbi, irritantis.

Cutem colore fuseo, mox evanescente inficit, calore vapores violaceos spargit, in aqua frigida vix, in spiritu vini facile, liquorem saturate rubro-fuscum reddens, solvitur. Amylum minima quantitate colore coeruleo tingit.

Ne sit inquinatum Stibio, Graphite, Schisto, carbonibus, et his similibus. In mereando cave, ne Jodum ad augendum pondus aqua irroratum emas.

436. **Kali aceticum solutum.**

Liquor terrae foliatae Tartari. Acetas Lixivae solutus.

R̄. Kali carbonici puri *libram unam,*
Acidi acetici concentrati *q. s.*

ad perfectam neutralisationem.

Liquor leni igne evaporetur ad pond. speif. 1,200.

Sit liquor limpidus, decolor, perfecte neuter, saporis salsi, dulciusculi, pungentis, ab inquinamentis alienis liber.

† 437. **Kali bichromicum crudum.**

Kali chromicum rubrum. Bichromas kalicus.

Sal in officinis chemicis paratus, occurrit in crystallis magnis quadrangularibus, flavo-rubris, in aquae frigidae partibus decem solubilibus, solutione aurantiaea, acida, corrosiva.

438. Kali carbonicum crudum.

Potassa. Cineres clavellati calcinati. Carbonas Lixivae crudus.

In propriis officinis paratum, sistit substantiam salinam amorpham, albidam, in aëre facile deliquescentem, cum acidis effervescentem, in aqua maxima ex parte et facile, minime autem in spiritu vini solubilem.

Substantiis heterogeneis nimis inquinatum rejice.

439. Kali carbonicum purum.

Kali carbonicum e Tartaro. Carbonas Lixivae purus. Alkali vegetabile mite depuratum. Sal Tartari.

R̄. Kali tartarici acidi depurati *q. v.*

uratur in crucibulo ferreo, donec sine flamma et fumo candeat. Massa residua saepius

Aqua destillata

elixivetur, et liquor filtratus decolor in vase ferreo, optime mundato, vel argenteo sub continua agitatione ad siccum evaporetur, dein massa residua adhuc calens in pulverem redigatur, atque in vase bene clauso servetur.

Sit pulvis grossus, albus, siccus, inodorus, saporis fortis alcalini, in aqua facillime ex toto solubilis.

Ne sit acido sulfurico, silicico, alumina aut metallis inquinatum, nec contineat nisi minimam Chlori et Calcariae quantitatem.

440. Kali carbonicum purum solutum.

Liquor salis Tartari. Oleum Tartari per deliquium.

R̄. Kali carbonici puri *libram unam,*

Aquae destillatae *libras duas,*

solve, filtra et serva.

Sit gravitatis specificae 1,330.

† 441. Kali causticum fusum.

Lapis causticus Chirurgorum. Kali hydricum fusum. Lixiva fusa.

R̄. Kali carbonici crudi *libram unam,*

solve in lebetes ferreo in

Aquae fontanae fervidae

libris decem,

sub continua agitatione successive adde:

Calcariae causticae

eum aqua in pultem conversae

libram unam.

Ebulliat spathula ferrea agitata per quadrantem horae, vel donec portio liquoris filtrati eum acido hydrochlorico jam non effervesceat.

Misce lam tunc caute infunde in lagenam vitream, antea calefactam, quae bene obturata seponatur, donec liquor limpidus sedimentum dimiserit, quem deinde ope siphonis vitrei, tubo aspiratorio instructi, in sartaginem ferream perductum ad justam spissitudinem evapora, et iterum in lagena subsistendo depura, deinde in sartagine argentea evapora, donec olei instar leniter fluat, et gutta in metallum frigidum demissa perfecte indurescat.

Tum effunde in modulum ferreum calefactum, et bacillos refrigeratione obtentos statim in vas bene obturandum repone.

Sit album, albo-cinereum v. parum flavescens, in aquae frigidae parte dimidia facile solubile, ab acido carbonico fere liberum, nec ferro oxydato, nec terris v. salibus heterogeneis nimis inquinatum, a nitro plane liberum.

442. **Kali chloricum.**

Kali muriaticum oxygenatum. Kali oxymuriaticum. Chloras kalicus seu Lixivae.

Sal in officinis chemicis paratum, prostat in lamellis crystallinis albis, splendentibus.

Solvatur in aquae frigidae partibus sedecim, in fervidae duabus. Cum combustilibus tritum, calefactum vel percussum detonat.

443. **Kali ferrato-tartaricum.**

Globuli martiales. Tartarus martiatus. Tartras Lixivae et Ferri.

R. Ferri limati

unciam unam,

Kali tartarici acidi depurati pulverati

uncias quinque.

Misce in sartagine ferrea eum

Aquae fontanae

s. q.

nt fiat massa pultiformis.

Digere saepius agitando et aquam evaporatam rursus affundendo, donec ferrum, quantum fieri potest, solutum fuerit, et massa pulvem praebat aequabilem, tenacem, e viridi nigrescentem, et in aqua fervida pro maxima sui parte solubilem.

Formentur globuli ponderis *unciae unius*,
qui leni calore exsiccant in vase clauso servantur.

Sint nigri, nitentes, fractura cereo-nitente, saporis ferrosi.

Cum aquae bullientis partibus octo mixturam viridi-nigrescentem praebant, residuo parvo relicto.

444. **Kali natronato-tartaricum.**

Tartarus natronatus. Tartras Lixivae et Sodae. Sal polychrestum Seignetti. Sal Seignetti.

R̄. Natri carbonici crystallisati *libram unam*,

solve in:

Aquae fontanae fervidae *libris octo*.

Solutioni calefactae adde successive inter continuam agitationem:

Kali tartarici acidi depur. pulv. *quantum sufficit*.

ad saturationem, ut liquor tamen aliquid sit alcalinus.

Liquor per noctem ad sedimentum deponendum seponatur, deinde filtratus in crystallos redigatur.

Crystalli collectae iterata solutione in

Aquae destillatae frigidae *partibus tribus*,

filtratione et crystallisatione depurentur, deinde ablutae et siccae servantur.

Crystalli prismaticae sint decolores, pellucidae, in aquae duplo pondere solubiles, saporis amaricantis, salsi, ab inquinamentis metallicis et caleariae tartariae immunes.

445. **Kali nitricum depuratum.**

Nitrum depuratum. Nitrus Lixivae depuratus.

Kali nitricum in officinis nitrariis paratum semper plus minus vario modo, imprimis Natrio chlorato, Kalio chlorato vel Kali sulfurico inquinatum ante usum pharmaceuticum nova crystallisatione depurgetur.

Sistat crystallos prismaticas, albidas, saporis salsi, subamari, frigoris sensum in ore excitantis. Solvatur in aquae frigidae partibus quatuor, in aquae fervidae parte dimidia, et prunis candentibus injectum deflagret.

Nil aliud nisi Chlori vestigia contineat.

446. **Kali nitricum fusum.**

Nitrum tabulatum. Nitras Lixivae fusus. Sal Prunellae.

R̄. Kali nitrici depurati *q. v.*

Liquefac in sartagine ferrea, et massam liquidam guttatim effunde in laminam ferream v. marmoream, ut fiant rotulae.

† 447. **Kali stibiato-tartaricum.**

Tartarus emeticus. Tartarus stibiatus. Tartras Lixivae stibiatus. Tartras Lixivae et Antimonii.

R̄. Stibii oxydati	<i>uncias quatuor,</i>
Kali tartarici acidi depurati	<i>uncias quinque,</i>
Aquae destillatae	<i>libram unam.</i>

Digere in vase porcellaneo per quatuor horas, aquam si necesse fuerit restituendo, deinde affunde

Aquae destillatae	<i>libras duas cum dimidia.</i>
--------------------------	---------------------------------

Ebulliant, donec supersint eireiter	<i>librae tres.</i>
-------------------------------------	---------------------

Solutionem fervidam filtra et ad crystallisationem sepone.

Crystallis separatis residuum tamdiu evaporetur, quamdiu crystalli nascuntur, lixivium ultimum rejice. Crystallos collectas pauxillo aquae lava, dein in aqua destillata solve et denuo in crystallos redige. Crystallos siccatas et in pulverem redactas serva.

Sit pulvis albissimus, saporis primum dulcis, deinde irritantis metallici, in aquae destillatae frigidae partibus quindecim, in fervidae autem tribus absque sedimento solubilis.

Ne sit Calcaria, Kali tartarico acido, Arsenico vel metallis inquinatum.

448. **Kali sulfuricum.**

Arcanum duplicatum. Tartarus vitriolatus. Sulfas Lixivae. Sal polychrestum Glaseri.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sistit crystallos rhombicas, decolores, saporis salsi amariuseculi, in aëre immutabiles, ignis vim sustinentes. In aquae frigidae partibus decem, in quatuor partibus bullientis, minime autem in spiritu vini solubiles, perfecte neutri et ab inquinamentis metallicis penitus immunes.

449. **Kali tartaricum acidum depuratum.**

Tartarus depuratus. Cremor Tartari. Tartras Lixivae acidulus. Crystalli Tartari.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Exhibet crustas compaetas e crystalis rhombicis, duris, fragilibus, aëri resistantibus, albis, diaphanis, saporis acido-acerbi. Solvuntur in aquae frigidae partibus 184 et in fervidae quatuordecim, in spiritu vini non solubiles.

Ne sit cupro et plumbo inquinatum, calcariae nonnisi vestigia contineat.

450. **Kali tartaricum boraxatum.**

Tartarus boraxatus. Borax tartarisata. Cremor Tartari boraxatus. Cremor Tartari solubilis.

R̄. Boracis depuratae *uncias quatuor,*

Kali tartarici acidi depurati pulverati *libram unam,*

solve in

Aquae destillatae fervidae *libris quatuor.*

Stent in vase vitreo, loco frigido per 12 horas.

Liquorem filtratum in vase porcellaneo leni calore evapora, et massam ita ortam, penitus siccata in pulverem, quem statim in vas optime clausum reponas.

Sit pulvis albus, in aëre humeseens, saporis aciduli, salsi, in aquae pondere aequali penitus solubilis, ab inquinamentis metallicis omnino liber.

451. **Kali Tartaricum neutrum.**

Tartarus tartarisatus. Tartras kalicus. Tartras Lixivae neuter.

R. **Kali carbonici puri** *libram unam,*
Aquae destillatae *libras octo.*

Solutioni in lebetæ stanneo calefactæ adde sensim sub continua agitatione:

Kali tartarici acidi depurati pulver. *libras duas et dimidiam,*
 vel quantum sufficit ad perfectam neutralisationem.

Liquorem seponere per quadraginta octo horas, deinde filtra, et blando igne ad siccum evaporare.

Massam in loco calido plane exsiccantem, deinde in pulverem tritam et per eribrum setaceum trajectam, in vitro bene clauso servare.

Sit pulvis albus, omnino neuter, saporis amariuscule salsi, in aquae frigidae pari pondere penitus solubilis, ab inquinamentis metallicis penitus et a salibus alienis in quantum fieri potest liber.

452. **Kalium ferro-cyanatum flavum.**

Kali ferroso-hydrocyanicum. Kali borussicum.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sistit crystallos plerumque in massas cohaerentes, flavas, in aquae frigidae partibus quatuor, minime autem in spiritu vini solubiles, inodoras, saporis dulciusculi amari et salsi.

+453. **Kalium jodatum.**

Kali hydrojodicum s. hydrojodinum. Hydrojodas Lixivae.

Exstat in officinis chemieis.

Sint crystalli cubicae, decolores, inodora, saporis salsi, aeris, calore rubro funduntur, majore calore avolant.

In aëre immutabiles, in aquae frigidae $\frac{3}{4}$ partibus et in sex part. Alcoholis solubiles.

Ne sint carbonate et jodate Lixivae inquinatae, nec contineant nisi Chlori et Sulfatis Lixivae vestigia.

454. **Kalium sulfuratum.****Hepar Sulfuris kalinum. Sulfuretum Lixivae.**

R̄. Sulfuris sublimati erudi *unciam unam,*
Kali carbonici puri *unciam unam et dimidiam.*

Mixtas in erueibulo porcellaneo tecto leni igne liquēfae, tum effunde in lapidem calefactum.

Massam refrigeratam in pulverem grossiuseulum contere, et statim in vas bene claudendum reeonde.

Sit coloris e fusco citrini, in aquae frigidae partibus duabus penitus solubile.

455. **Kalium sulfuratum pro balneo.****Hepar Sulfuris vulgare.**

R̄. Sulfuris citrini pulverati *libram unam,*
Kali carbonici erudi *libras duas.*

Mixtas et in sartagine opereulo tecta liquefactas in mortarium ferreum effunde, dein massam refrigeratam in pulverem grossiuseulum contunde, et per eribrum ferreum trajectam reeonde.

456. **Kino.****Gummi Gambiense.**

Succus aëre induratus *Echinotisci erinacei* Benth. (*Pterocarpi erinacei* Lam.) arboris *Papilionaceae* in Africa tropica erecentis, occurrit in fragmentis irregularibus, acutangulis, atro-rubicundis, nitidis, margine subdiaphanis, fragilibus, in pulverem fusco-rubrum redigendis. Odor nullus, sapor cum aliqua dulcedine valde adstringens. In aqua frigida non ultra dimidium, in fervida fere totum solvitur, cum spiritu vini solutionem sanguinei coloris praebet. Masticata salivam violaceo colore tingit.

Kino nomine circumferuntur gummata americana et australica diversis natalibus, a Kino vero africano cautius distinguenda.

Spuria merees jam amaro sapore dignoscitur.

†457. **Kreosotum.**

Liquor decolor, limpidus, oleo aethereo similis, e Pissa liquida Fagi sylvaticae destillatione paratus, odoris vehementissimi, saporis caustici,

in aquae partibus octoginta, in spiritus vini rectificatissimi qualibet quantitate solubilis.

In liquore Kali caustici solutus, aqua admixta ne turbetur.

† 458. **Lactucarium.**

Succus lacteus aëre induratus *Lactucæ sativæ* Lin n. plantae *Compositæ* inter cultas notissimæ. Colligitur e planta nondum deflorata, fructum maturescente, mane caulis ac foliorum epidermide transversim incisa, atque lacrymis spissescentibus horis pomeridianis collectis, leni deinde calore penitus exsiccat.

Prostat in frustis irregularibus, pisi vel nucis avellanae magnitudine, colore e flavo fusco et sordide virescenti mixto, opacis, friabilibus, fractura albedo-flavescente. Odor peculiaris aliquomodo Opio similis, sapor subacri-amarus.

Cum aqua solutionem turbidam præbet, in æthere et spiritu vini ex parte tantum solubile.

Servetur in vasis bene clausis.

Ex integra planta pressione obtentum et mucidum rejiciatur.

459. **Lapides Cancerorum.**

Oculi Cancerorum.

Concrementa osseo-lapidea, concavo-convexa, pisi circiter magnitudine, e lamellis sibi incumbentibus composita, alba, *Astaci fluvialilis* Fabric. (*Cancris Astaci* Lin n.) animalis *Decapodi* notissimi ventriculo geminatim inhaerentia, mense Augusto, quo tempore cancer crustam mutat, reperiunda, præter membranam cellulosa pro maxima parte e Calcaria carbonica et phosphorica constantia.

Solvantur in acido hydrochlorico, lamellas diaphanas gelatinosas, lapidum formam relinquentes.

460. **Lapides Cancerorum præparati.**

Rx. Lapidum Cancerorum

q. v.

Superfunde

Aquae fontanae fervidae

s. q.

ablue, sicca et redige in pulverem subtilissimum.

461. Lapis Pumex.

Scoriae semivitreatae lapidum in regionibus vulcanicis obviae, plus minus porosae, leves, friabiles.

462. Lichen islandicus.

Cetraria islandica Achar. planta *Lichenosa* in Europa boreali, in montibus celsioribus Europae mediae et australis gregarie ad terram nascens, constans e thallo cartilagineo, olivaceo-castaneo, basi albido, sanguinolento, subtus pallidiore, laciniato, laciniis sublinearibus, multifidis, dentato-ciliatis, in sicco aspero, strepente, fragili, humectato cartilagineo-subcoriaceo, saporis peramari.

Cave ne sit ligni aut muscorum fragmentis admixtis nimis inquinatus.

463. Lignum Guajaci.**Lignum sanctum.**

Guajaci officinalis Linn. arboris e familia *Zygophyllearum*, in America tropica, imprimis in insulis Antillanis crescentis lignum, e trunco vel ramis validioribus desumptum, occurrit in frustis longitudinaliter v. transversim sectis, ponderosis, in aqua subsidentibus, compagem densam, subtilem monstrantibus, decorticatis, ex alborno pallide luteo et nucleo lignoso-fusco virente, versus centrum glauco-subirrorato compositis.

Vehementius fricatum v. accensum odorem spargit aromaticum, diutius masticati sapor est leniter amaricans, deinde subacris.

Rasura venalis (*Scobs Guajaci*) maximam partem e solo alborno constans v. saepissime admixtis lignis alienis inquinata, non adhibeatur.

464. Lignum Juniperi.

Juniperi communis Linn. arbuseulae v. fruticis e *Cupressinarum* familia notissimi lignum e trunco, ramis et radice desumptum, in frustis

venditur longitudinaliter fissis, cortice indutis extus griseo, intus ferrugineo, substantia lignosa albida, v. radice ochroleuca aut subrubella, compacta, resinosa.

Odor accensi ligni balsameus cuius notus.

Lignum radice ligno ramorum et imprimis trunci praestantius habetur.

465. **Lignum Quassiae surinamense.**

Quassiae amarae Linn. arboris Americae tropicae e *Simarubacearum* familia, lignum trunci et ramorum. Exhibet frusta cylindrica, saepe curvata et nodosa, pollicis v. brachii crassitie, cortice griseo aut lutescente passim maculato, glabro v. subrugoso, fragili, ligno albido v. subflavo tenaci, levi, inodoro, saporis amarissimi.

Non adhibeatur lignum Quassiae jamaicense e *Pterodendro* Sloanci Endl. (*Rhoe Metopio* Linn.) petatum, quod in frustis occurrit brachii crassitiem saepe excedentibus, cortice crasso, arete adhaerente, rugoso, tuberculato, obscurius cinereo, maculis nigrescentibus consperso, ligno pallide flavo-fuscescente, multo duriore.

466. **Lignum Santali rubrum.**

Pterocarpus Santalini Linn. fil. arboris *Papilionaceae*, in Asia tropica crescentis ut creditur lignum, prostat in segmentis diversae magnitudinis, fusco-rubris, intus laete saturato-sanguineis, compactis, radiatim fibrosis.

Odor triti vel fricati subaromaticus, sapor modice adstringens. Pigmentum rubrum spiritu vini extractum, addito ferro sesquichlorato colorem violaceum induit.

467. **Lignum Sassafras.**

Sassafras officinalis Nees. arboris e *Laurinearum* ordine in America borealis provinciis australioribus crescentis lignum leve, subspongiosum, pallide griseo-fuscescens v. rubellum, tectum cortice crasso,

rimoso, molli, friabili, extus cinereo-fusco, saepe nigro-maculato, intus ferrugineo. Prostat in frustis cylindricis, flexuosis, nodosis, variae magnitudinis.

Odor fragrans, foeniculaceus, sapor aromaticus.

468. Linimentum ammoniatum.

Linimentum volatile.

Rx. Olei olivarum *uncias quatuor,*

Ammoniae purae liquidae *unciam unam.*

Misce, in lagena vitrea conquassando.

469. Linimentum saponato-camphoratum.

Balsamum Opodeldoc.

Rx. Saponis Veneti *unciam unam,*

Saponis communis albi *uncias duas,*

Spiritus vini rectificati *libram nam.*

Digere ad solutionem, cui filtratae adde:

Olei Lavandulae

„ Rosmarini *aa drachmam unam,*

Ammoniae purae liquidae *unciam semis,*

Camphorae in spiritu vini solutae *drachmas duas.*

Misce et in vasis bene obturatis serva.

† 470. Liquor acidus Halleri.

Elixir acidum Halleri.

Rx. Spiritus vini rectificatissimi

Acidi sulfurici concentrati depurati *aa partes aequales.*

Infundatur acidum in spiritum, ut mixtura calefiat, et servetur in vase epistomio vitreo elauso.

Sit liquor limpidus, flavescens, saporis acidissimi corrosivi, odoris spirituosus-aetherei.

471. Macis.

Arillus semen (nucem improprie dictum) *Myristicae moschatae* Linn. arboris e *Myristiceaceae* ordine, in insulis Moluccis crescentis, obvolvens,

recens carnosus, sanguineus, siccus exhibet lamellas tactu pingues, sub-carnosas, luteo-coecineas, fragiles, multifidas, laciniis linearibus apice reflexis, denticulato-incisis, oleo unguinoso et aethereo graves, odore aromatico et sapore fervido insignes.

472. **Magnesia carbonica.**

Magnesia alba. Magnesia Muriae. Carbonas Magnesiae.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sit massa nivea, inodora, levissima, in aqua insolubilis, in acidis cum effervescencia facile solubilis, a salibus sulfuricis et calcaria plane libera.

473. **Magnesia sulfurica.**

Sal amarus. Sulfas Magnesiae. Sal anglicus, Sedlicensis, Epsomensis.

Sal in officinis chemicis paratus, exhibet crystallulos prismaticos, albos, splendentes, inodoros, saporis salsi amari, in aquae frigidae partibus duabus, minime autem in spiritu vini solubiles, in aëre parum, quin humescant, fatiscentes.

Rejiciatur sal metallis v. Natro sulfurico inquinatus.

474. **Magnesia usta.**

Magnesia pura. Magnesia calcinata.

R̄. Magnesiae carbonicae in frustis *q. v.*

imprime in crucibulum vel in vas fictile non vitreatum, donec repletum fuerit, et imposito opereulo figulino leviter igniatur tandiu, donec aliqua pars massae calcinatae exempta, cum aqua commixta, affuso acido sulfurico jam non effervesceat.

Solvatur facile in acido sulfurico et hydrochlorico.

Ne sit calcaria inquinata.

475. **Magnesia usta in aqua.**

Magnesia hydrica. Antidotum Arseniei albi.

R̄. Magnesiae recenter ustae *unciis duos,*

Aquae destillatae*libram unam.*

Mixtas serva in lagena vitrea bene clausa.

Haec quantitas praeparati in pharmacopoliis semper praesto sit.

476. Maltum Hordei.

Semina Hordei incipiente germinatione ope caloris auctioris necata et celeriter siccata, saporis dulcis amariuseculi, farinacei.

477. Manganum hyperoxydatum nativum.**Magnesia vitrariorum. Manganum nativum.**

Fossile venale in massis crystallinis, fibrosis, griseo-nigris, metallico-nitentibus, ponderosis, duritiei exiguae, pulverem praebens griseo-nigrum.

478. Manna calabrina electa.

Succus saccharinus e truncis et ramis sauciatis *Fraxini Orni* Linn. arboris e familia *Oleinarum*, in Calabria et Sicilia cultae, effluens, et aëre induratus, occurrit in massis grumosis e frustulis variae magnitudinis, flavis v. albidis conglobatis, saporis dulcis, submellei cum quadam acretine subnauseosa.

479. Manna calabrina cannellata.

Mannae calabrinae varietas purissima, sistens fragmina subcylindrica, canaliculata, sicca, levia, friabilia, parum glutinosa, saporis mellei purioris absque acretine.

480. Mannitum.**Saccharum Mannae.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sistit crystallos prismaticas vel aciculares, albissimas, nitentes, saporis grati dulcis, in aqua et spiritu vini fervido facile, in spiritu vini frigido parum solubiles.

† 481. **Massa pilularum Ruffi.**

℞. Pulveris Aloës

uncias tres,

„ Myrrhae

unciam unam c. dimidia,

„ Croci gallici

unciam dimidiam.

Misce cum

Spiritus vini rectific. dilut.

s. q.

ut fiat massa pilularum.

482. **Mastix.****Mastiche.**

Succus resinosus, aëre inspissatus, e trunco *Pistaciae Lentisci* Linn. arboris e *Terebinthacearum* ordine, imprimis in insulis Archipelagi graeci crescentis, sistit grana globosa, piperis v. pisi magnitudine, alba, mixta cum granis majoribus, irregularibus, flavidis, pellucidis, extus subpulverulentis, duris, friabilibus, odoris debilis, aromatici, saporis aromatici, irritantis. Mastix leni calore fluit et comburendo spargit odorem balsameum, in aqua non solubilis, in spiritu vini pro maxima parte, in oleis omnino solvitur. Ori immissa mollescit et dentibus adhaeret.

483. **Medulla ossium praeparata.****Medulla bovis praeparata.**

℞. Medullam ossium recentem,

lenissimo calore liquefactam trajice per linteum et leniter exprime.

484. **Mel.**

Ab *Apibus mellificis* Linn. insectis *Hymenopteris* notissimis e succis saccharatis florum paratum, favis diffractis lenissimo calore effluit, syrupi spissi diaphani consistentia, tractu temporis in massam granulosam, opacam mutandum.

Ne sit acidum vel farina adulteratum.

485. **Mel depuratum.****Mel despumatum.****R̄. Mellis crudi***libras decem,***Aquae fontanae***libras quinque.*

Mixta coquantur leni igne in lebetes stanno inducto, spumam ope cochlearis despumatorii saepius removendo, ad consistentiam syrupi spissioris. Liquor per manicam panneam colatus, post refrigerationem in loco frigido servetur.

486. **Mel rosatum.****Mel Rosarum.****R̄. Florum Rosarum rubrarum sic-
catarum***uncias tres,***Aquae fontanae fervidae***libras duas.*

Sepone per tres horas, tum cola et exprime, atque liquori filtrato adde:

Mellis depurati*libras sex.*

Mixta evaporentur igne minuto, ad mellis spissitudinem.

Serva loco frigido.

† 487. **Morphium.****Morphina. Morphiū purum.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sint crystalli prismaticae, aciculares, tenues, nitentes, decolores, inodorae, saporis amari, in aëre persistentes, in aqua frigida vix, in fervida parum, in spiritu vini rectificatissimo fervido facile, in aethere minime solubiles. Solutio aquosa chartam exploratoriam rubram caeruleo tingat. Salia Morphii admixto Ferro sesquichlorato soluto colorem coeruleum induant.

Ne sit Narcotino inquinatum.

† 488. **Morphium aceticum.****Acetas Morphii.****R̄. Morphii puri in pulverem triti***unciam dimidiam,***Acidi acetici concentratissimi***drachmam unam et dimid.*

Misce in mortario vitreo, in quo stet per aliquot horas in loco frigido, ut massam siceam praebeat, quae in pulverem trita in vase vitreo optime munito servetur.

Sit pulvis albidus, saporis peramari, in aqua destillata solubilis.

† 489. **Morphium hydrochloricum.**

Morphium muriaticum. Murias Morphii.

R. Morphii puri

q. v.

Misce cum

Aquae destillatae fervidae

partibus quinque.

addendo guttatim

Acidi hydrochlorici diluti

q. s.

ad perfectam solutionem. Liquorem filtratum in crystallos redige.

Sint crystalli aciculares, tenues, sericeo-nitentes, levissimae, saporis amari, ad aërem immutabiles, solvantur in aquae frigidae partibus sedecim, in fervidae pari fere pondere, facillime autem in spiritu vini.

490. **Moschus Tunquinensis.**

Substantia unctuosa, in folliculo contenta, qui in marium *Moschi moschiferi* LINN. animalis *Ruminantis*, in Asiae mediae alpibus gregatim vagantis, ventre pone praeputium haeret.

Folliculi exsiccati, e regno Tübetano et ex imperio Chinensi adlati sunt suborbiculares, ovi gallinacci minoris plerumque mole, in facie superiori, qua ventri animalis adhaeserant, plani, nudi, tegmen subcoriaceo-membranaceum monstrantes, in facie inferiori plus minus convexi, pilis tecti subfusciscentibus, rigidis, fistulosis, in ambitu rarioribus, adpressis, versus centrum copiosioribus, longioribus, rigide erectis, et versus duo foramina subcentralia, e ducto excretorio abscisso residua, convergentibus. Sub tegmine exteriori intra pelliculam tenuem, rigidiusculam et facile a tegmine exteriori solubilem, continetur substantia officinalis grumosa, e glebulis variae magnitudinis compacta, fusco-nigra, plus minus mollis, pingue-nitens, cum membranae interioris particulis subtilioribus et pilis tenerrimis mixta, odoris penetrantissimi, in majori copia e folliculo sumta subammoniacalis, saporis amaricantis.

Rejiciatur Mosehus eabardinus, in folliculis majoribus, foraminibus excretoriis non prope centrum, sed plerumque pone ambitum sitis, glebam plerumque homogineam, odoris multo debilioris, urinosi includens. Cave a folliculis genuinis quidem, sed substantia officinali exenta, artefacta gleba faretis, foramine vel fissura varie consuta aut conglutinata.

491. **Mucilago Cydoniorum seminum.**

R̄. Seminum Cydoniorum	<i>drachmas duas,</i>
Aquae fontanae	<i>uncias sex.</i>
Conquassa in lagena vitrea et cola.	

492. **Mucilago Gummi arabici.**

R̄. Gummi arabici albissimi in pulverem triti	<i>unciam dimidiam,</i>
solve sensim affundendo :	
Aquae fontanae	<i>unciam unam,</i>
et triturando in mucilaginem redige.	

493. **Mucilago Tragacanthae.**

R̄. Tragacanthae pulveratae	<i>grana quatuor.</i>
Misce et tere usque ad perfectam solutionem eum	
Aquae fontanae fervidae	<i>uncia una.</i>
Paretur ex tempore.	

494. **Myrrha.**

Sueus resinosus, aëre induratus *Balsamodendri Myrrhae* Ehrenb. arboris in Arabia feliei ereseentis ex ordine *Burseracearum*. Sistit frusta globosa v. subirregularia, pisi vel nucis juglandis mole, ochroleuca v. rubro-fusea, saepe albo-maculata, subpellueida, pingui-nitentia, friabilia, odoris et saporis peculiariter aromatiei et subamari. Solvitur pro parte minori in aqua, solutione flavo-fusea turbida. In spiritu vini

pro majore parte solubilis, solutione limpida. Calefacta quin liquetur intumescit, odorem aromaticum spargens, flammae admota statim deflagrat.

495. Natrium chloratum.

Sal culinaris. Murias Sodae.

Sal purus solvitur in 2,7 partibus aquae frigidae vel fervidae.

496. Natrum aceticum crystallisatum.

Terra foliata Tartari crystallisata. Acetas Sodae.

Praeparatum officinarum chemiearum.

Sistit crystallos prismaticas, in aëre fatiseentes, in aquae tribus, in aleoholis quinque partibus solubiles, saporis salsi, amariuseculi, ab inquinamentis metallicis prorsus, et a salibus alienis quantum fieri potest puras.

497. Natrum bicarbonicum.

Carbonas Sodae acidulus. Bicarbonas Sodae.

Praeparatum officinarum chemiearum.

Sit pulvis albus, saporis mitis, non alealini, nisi sub finem degustationis modiei, in aëre non fatiseens, solubilis in aquae frigidae partibus tredecim. Solutio Curcumam non tingat, nec solutionem Magnesiae sulfuricae turbet.

498. Natrum boracicum purum.

Natrum boricum. Boras Sodae. Borax depurata. Borax veneta.

Praeparatum officinarum chemiearum.

Crystalli prismaticae, decolores, subpellueidae, saporis subduleis, subalcalini, in aëre fatiseentes, calore liquescentes, et in massam levem spongiosam (Boracem ustam), demum in compactam pellueidam (Boracem vitrificateam) rediguntur. Solvuntur in aquae frigidae duodecim, in fervidae duabus partibus.

Sint liberae ab omni inquinamento metallico.

499. Natrum carbonicum crystallisatum.**Alcali minerale. Carbonas Sodae alcalescens.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sistit crystallos amplas, prismaticas, rhomboidales, decolores, fatiscientes, saporis alcalini, in duabus partibus aquae frigidae solubiles.

Sit ab inquinamentis metallicis plane et a Natrio chlorato et Natro sulfurico fere liberum.

500. Natrum carbonicum siccum.**Carbonas Sodae siccus.****R. Natri carbonici crystallisati** *q. v.*

Ruditer contusum expone aëri in loco tepido, ut in pulverem dilabatur, quem in vasis bene obturatis loco sicco serva.

501. Natrum nitricum depuratum.**Nitrum cubicum depuratum. Nitrus Sodae depuratus.**

Natrium nitricum venale (Nitrum Chilense), sal ex America australi advectus, massam exhibens crystallinam, sordide albam, pro usu pharmaceutico iterata crystallisatione depuretur.

Crystalli sint rhomboidales, in aquae frigidae duabus partibus, et in fervidae aequali minore quantitate solubiles.

Sit ab inquinamento metallico penitus et a Chloro fere liberum.

502. Natrum phosphoricum.**Sal mirabilis perlatus. Phosphas Sodae.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sistit prismata tetragona, recentia pellucida, cito fatiscentia, saporis subamari, subsalsi, mitis, refrigerantis, in aquae frigidae partibus quatuor, in fervidae partibus duabus solubilia.

Sit ab inquinamentis metallicis prorsus, ab acido sulfurico et a Chloro fere liberum.

503. Natrum sulfuricum crystallisatum.**Sal mirabilis Glauberi. Sulfas Sodae.**

In officinis chemicis paratum, frusta exhibet crystallina, alba, in aëre fatiscentia, saporis salsi amari, refrigerantis.

Natrum sulfuricum crudum semper plus minus vario modo, imprimis Natrio chlorato inquinatum, ante usum pharmaceuticum nova crystallisatione repurgetur. Metallis, Zinco vel Hydrargyro sulfurico inquinatum, horum metallorum reactiones exhibens, plane rejiciatur.

Crystallos loco frigido serva.

Sint crystalli prismaticae, in aëre fatiscentes, in duabus aut tribus aquae frigidae partibus solubiles.

504. Natrum sulfuricum siccum.**Sal mirabilis siccus seu dilapsus.**

R. Natri sulfurici crystallisati *q. v.*

Expone aëri sicco, calore lenissimo, donec penitus in pulverem album dilapsus fuerit, quem per cribrum trajectum in vase tecto serva.

505. Nuces Juglandis immaturae.

Juglandis regia Lin n. arboris notissimae proprii ordinis in Persia indigenae, nunc per omnem Europam cultae fructus immaturi, colligendi antequam endocarpium lignescere incipit.

506. Nuclei Cerasorum.

Druparum *Pruni avium* Linn. imprimis varietatis *sylvestris*, arboris ex *Amygdalearum* grege, per omnem fere Europam spontaneae, quas Cerasa vocant, putamina ossea.

507. Nux moschata.

Myristicae moschatæ Linn. arboris in insulis Moluccis indigenae et etiam cultae, sui ordinis, semen rejecto epicarpio et soluto arillo carnoso (vid. Macis) siccatum, subglobosum, ponderosum, constans ex

integumento exteriori tenui, arete adhaerente, griseo-fusco, reticulatim venoso, et ex albumine denso, oleoso-adiposo, integumenti processibus ruminato, et pallide rubro v. fusco-rubro variegato.

Odor grate aromaticus, peculiaris, sapor fervidus. Nuecs moschatas leves, mueidas v. ab insectis arrosas rejice.

† 508. **Nux vomica.**

Strychni Nucis vomicae Lin n. arboris indieae ex ordine *Loganiacearum* semem diseoideum, pollicis dimidii circiter diametro, lineae crassitie saepe subareuatum, ambitu tumidum, line centro umbonatum, pilis minutissimis, sericeis, cinereo-ochroleucis adpressis vestitum, constat ex integumento tenui arete adhaerente, et ex albumine corneo, albido, bipartibili, basi embryonem minimum concealante, inodoro, saporis amarissimi, nauseosi. Pulvis Nucis vomicae venalis, variis substantiis fraudulenter admixtis inquinatus, nequaquam adhibeatur.

509. **Oleum Amygdalarum dulcium.**

R̄. Amygdalarum dulcium *q. v.*

in pulverem grossum redaetas et saeculis linteis v. chartaceis inclusas primum leniter, deinde fortissime in prelo toreulari exprime.

Oleum per chartam bibulam filtratum serva.

510. **Oleum animale aethereum.**

Oleum animale Dippelii.

R̄. Olei animalis foetidi *q. v.*

Destilletur e retorta vitrea tubulata, ut oleum tenue eliciatur.

Hujus Destillati *pars una*

cum

Aquae destillatae *partibus quatuor*

iterum destilletur blando calore, quamdiu oleum decolor prodierit.

Servetur in langenuis vitreis optime clausis, arena submersis, loco obscuro.

Sit limpidum, decolor vel pallide flavescens, odoris gravissimi, in spiritu vini et aethere solubile.

511. Oleum animale foetidum.**Oleum Cornu Cervi.**

Liquor oleosus, destillatione sieca ex ossibus, sanguine, aliisque partibus animalium in officinis chemieis paratus, spissiusculus, fuseo-niger, opaeus, odoris foetidissimi, saporis empyreumatici, aeris.

Sit consistentia olei Amygdalarum spissius, in aqua supernatet, et pro minima parte solvatur; in spiritu vini autem ex integro fere solubile.

512. Oleum Anisi.

R̄. Seminum Anisi vulgaris *libras duas.*

Maccera in

Aquae fontanae *libris sedecim*

per duodecim horas.

Fiat destillatio ex vesica cum alembico stanneo, appposito exeipulo florentino, donec aquae dimidium vel duae trientes transierint.

Aqua destillata, demto oleo supernatante, iterum seminibus affundatur, aqua recenti super addita, ut sit octuplum seminum, et toties cohobetur, donec sufficiens olei aetherei quantitas obtenta fuerit, quod ab aqua separatum servetur.

513. Oleum anthelminticum Chaberti.**Oleum contra Taeniam.**

R̄. Olei Terebinthinae *uncias duodecim,*

Olei animalis foetidi *uncias quatuor.*

Mitte in retortam vitream ope infundibuli curvati, adjuncto exeipulo, blanda destillatione eliciantur *unciae duodecim.*

Statim in lagenulas vitreas optime clausas immitte.

514. Oleum Aurantii florum.**Oleum Neroli.**

Oleum venale, e floribus Aurantii destillatione paratum.

Sit limpidum, fere decolor, odoris fragrantissimi, suaveolentis.

515. Oleum Aurantiorum corticum.

Oleum venale, e cortice fructuum *Aurantiorum* partim expressione, partim destillatione paratum. Sit limpidum, subflavescens, tenuissimum, odoris et saporis grate aromatici cum amaritudine.

516. Oleum Bergamottae.

Oleum venale, e cortice fructuum varietatis peculiaris Citri medicae, laceratione epidermidis et expressione paratum. Sit sublimpidum, flavescens, odoris gratissime aromatici, saporis cum aliqua acredine amaro-aromatici.

517. Oleum Cajeputi depuratum.

Oleum venale, e ramis et foliis *Melaleucæ Cajeputi* Roxb. aliarumque specierum, arborum ex ordine *Myrtacearum*, in India orientali ope destillationis paratum, tenue, viride aut rarius flavescens, pellucidum, odoris penetrantis aromatici, camphorini, saporis aromatico-areis.

Cupri vestigiis inquinatum nova destillatione cum aqua purgetur.

518. Oleum camphoratum.

R̄. Camphoræ in pulverem contritæ *unciam unam.*

Solve in:

Olei Olivarum *unciis duabus.*

519. Oleum Carvi.

E seminibus Carvi paretur, ut oleum Anisi.

520. Oleum Caryophyllorum.

Oleum venale, e Caryophyllis destillatione paratum.

Sit limpidum, tenne, coloris flavescens, odoris fragrantissimi.

521. Oleum Cerae.

R̄. Cerae flavae rasae

Calcariae causticae pulveratae

aa libram unam.

Mixta destillentur in balneo arenae e retorta vitrea, ignem sensim augendo.

Oleum obtentum iterata destillatione cum

Calcariae causticae *parte aequali*
rectificetur et decolor reddatur.

522. **Oleum Chamomillae.**

R. Florum Chamomillae *libras decem,*
Aquae fontanae *libras centum.*

Macera per duodecim horas, deinde fiat destillatio, donec aquae pars dimidia transierit.

Aqua destillata, oleo saturata cum aquae fontanae sufficiente quantitate novis floribus affundatur ad novam destillationem, et hanc operationem toties repete, donec olei aetherei sufficientem copiam habueris.

523. **Oleum Cinnamomi.**

Oleum venale, e cortice Cassiae cinnamomeae destillatione paratum.
Sit limpidum, flavesceens.

524. **Oleum Citri.**

Oleum de Cedro.

Oleum venale, e cortice fructuum Citri expressione paratum.
Sit limpidum, decolor v. subflavesceens, odoris Citri vehementis.

+ 525. **Oleum Crotonis Tiglii.**

E seminibus Crotonis Tiglii decorticatis paretur, ut oleum Amygdalarum dulcium.

Facile rancescit.

526. **Oleum Foeniculi.**

E seminibus Foeniculi paretur, ut oleum Anisi.

527. Oleum Hyosciami foliorum coctum.

R. Foliorum Hyosciami recentium *libram unam,*
 Olei Olivarum *libras quatuor.*
 Coque ad humidi consumptionem; expressum et filtratum conserva.

† 528. Oleum Hyosciami seminum pressum.

E seminibus Hyosciami contusis et aquae bullientis vaporibus im-
 praegnatis paretur, ut oleum Amygdalarum dulcium.

529. Oleum Jecoris Aselli flavum.

Ex hepate recenti *Gadi Morrhuae* Linn., *Gadi Callariae* Linn. et
 aliarum specierum affinium, piscium *Gadoideorum* maris septentrionalis,
 sponte effluens, pingue, spissiusculum, pellucidum, coloris flavescentis
 v. aurei, odoris et saporis debilis piscini.

530. Oleum Jecoris Aselli fuscum.**Oleum Jecoris Aselli empyreumaticum.**

Ex hepate assato v. putrido specierum *Gadi* maris septentrionalis
 paratum, opacum, coloris badii, adversus lucem caeruleo-viridis, odoris
 et saporis nauseosi, subputridi, empyreumatico-acris.

531. Oleum Juglandis nucum.

Paretur e nucibus Juglandis, e putaminibus exemptis non nimis
 vetustis, ut oleum Amygdalarum dulcium.

532. Oleum Juniperi baccarum.

Paretur e baccis maturis Juniperi contusis, ut oleum Anisi.

533. Oleum Lauri.

Oleum venale, e baccis recentibus Lauri ope coctionis cum aqua et
 expressione paratum. Sit flavo-viride, unguenti mollioris consistentia,
 granulatum, odoris laurini peculiaris, saporis amari.

534. Oleum Lavandulae.

Oleum venale, ex herba Lavandulae florida recenti paratum.

Sit subflavescens, limpidum, tenue, odoris et saporis aromatici proprii, vehementis.

535. Oleum Liliorum.

E floribus Lilii albi paretur, ut oleum Hyoseiami coctum.

536. Oleum Lini seminum.

E seminibus Lini contusis paretur, ut oleum Amygdalarum duleium.

Sit limpidum, tenue, a mucilagine purum.

537. Oleum Macidis.

Oleum venale, Macidis destillatione in India orientali paratum, ochroleucum vel subfuseum, odorem et saporem Macidis prae se ferat.

538. Oleum Majoranae.

Oleum venale, ex herba florida Majoranae destillatione paratum, coloris fusco-flavescens, odoris minus grati, quam herba.

539. Oleum Menthae crispae.

E foliis Menthae crispae siccatis paretur, ut oleum Chamomillae.

540. Oleum Menthae piperitae.

E foliis Menthae piperitae siccatis paretur, ut oleum Chamomillae.

541. Oleum Nucis moschatae.**Balsamum Nucistae.**

E nucibus moschatis expressione in India orientali paratum, adfertur in massis sebi spissitudine et albo variegatis, intus-aurantiaco v. rubro-venosis, odoris et saporis Myristicae moschatae.

542. Oleum Olivarum.

Oleum venale, e fructibus Oleae europaeae in Europa meridionali expressione frigida paratum, notissimum, ad usum internum non nisi purissimum (Oleum Olivarum provinciale s. virgineum) coloris pallide flavi, rancoris plane expers, adhibeatur.

543. Oleum Ovorum.

R. Ovorum gallinaceorum vitellos numero *quot vis,*
calefac in sartagine stannea ope balnei vaporis sub continua agitatione, donec digitis attriectata massa guttulas olei dimittat. Tum in sacculis lineis inclusam inter preli laminas ferreas calefactas fortiter exprime. Oleum obtentum filtra et in lagenulis vitreis optime clausis conserva.

544. Oleum Papaveris albi.

Oleum venale, e seminibus Papaveris albi contusis pressum.

545. Oleum Ricini.**Oleum Palmae Christi. Oleum Castoris.**

E seminibus Ricini decorticatis paretur, ut oleum Amygdalarum dulcium. Sit pingue, limpidum, paulum spissum, decolor, odoris expers, saporis blandi, parum acris, in alcohole solubile.

546. Oleum Rosarum.

Oleum venale, e petalis Rosarum destillatione in Oriente paratum. Sit fere decolor, subspissum, frigore solidescens, odoris fragrantissimi.

547. Oleum Rosmarini.**Oleum Anthos.**

Oleum venale, ex herba Rosmarini florida in Europa meridionali paratum, tenuissimum, limpidum, decolor, odoris proprii, penetrantis, saporis camphorati.

548. Oleum Rutae.

Oleum venale, ex herba Rutae graveolentis florida recente destillationis ope paratum, coloris lucide flavi, graveolentis, saporis ingrati, acriusculi.

549. Oleum Succini rectificatum.

Oleum venale, ex oleo Succini communi ope rectificationis paratum. Sit coloris expers, tempore flavescens.

550. Oleum Terebinthinae commune.

E Terebinthina destillatione in officinis chemicis paratum, sit tenuissimum, limpidum, odoris balsamici ingrati, saporis pungenti-acris.

551. Oleum Terebinthinae rectificatum.**Spiritus Terebinthinae.**

Oleum venale, sit limpidum, decolor, absque residuo volatile, in spiritu vini rectificatissimo et aethere penitus solvatur.

552. Oleum Valerianae.

E radice Valerianae sicca concisa paretur, ut oleum Chamomillae.

553. Olibanum.**Thus.**

Resina e trunco *Boswelliae serratae* Colcbr. arboris Indiae orientalis, ordinis *Burseracearum*, effluens et in aëre durescens, occurrit in granis subglobosis v. oblongis, pisi v. nucis juglandis magnitudine, albo-flavescentibus v. flavo-rubellis, opacis sive subdiaphanis, extus pulverulentis, fragilibus, fractura opaca, aequali, fissili. Odor debilis, super prunis balsameus, notissimus, sapor acriusculus, cum aliqua amaritudine.

† 554. **Opium purum.****Opium Smyrnaeum. Meconium.**

Succus lacteus e vulneratis capsulis immaturis *Papaveris somniferi* Linn. effluens, aëre induratus, in Asia minori collectus. Occurrit notissimum in placentis plerumque semilibrae pondere, Papaveris folio obvolutis, et extus fructibus Runicis cujusdam conspersis. Opium Smyrnaeum bonae notae fracturam exhibeat quasi cereo-nitentem et structuram prodatur e lacrymulis minutis dense compactam.

Sit in aqua et in spiritu vini pro maxima parte solubile, et solutio aquosa concentrata alealium ope valde turbetur.

555. **Os Sepiae.**

Testa interna in dorso *Sepiae officinalis* Linn. animalis *Cephalopodi* in mari mediterraneo viventis posita, oblonga, convexo-plana, albida, friabilis.

556. **Ossa usta.****Ossa usta alba. Cornu Cervi ustum album. Ossa calcinata.**

Ustione ossium igne aperto usque ad albedinem parata, sistunt frusta ossium adhibitorum alba, dura, sonantia, fragilia, insipida.

557. **Ova gallinacea.**

Sint incorrupta et quorum vitellus ab albumine facile separetur.

† 558. **Oxymel Colehici.**

R̄. Aceti Colehici

libram unam.

Mellis depurati

libras duas.

Evapora in lebeti stanneo leni calore absque ebullitione ad syrupi consistentiam, tum per manicam e panno confectam colatum, frigidum in vase obturato in locum frigidum seponere.

† 559. **Oxymel Scillae.**

Para cum aceto Scillae, ut oxymel Colehici.

560. **Oxymel simplex.**

R̄. Aceti crudi

libram unam,

Mellis depurati

libris duas.

In lebetæ stanneo leni calore evapora in syrupi spissitudinem, tum cola per manicam lanceam.

561. **Passulae minores.**

Vitis viniferae Linn. var. *apyrenae*, ex ordine *Ampelidearum*, baccæ sole siccatae, subrotundae, duleissimæ, nigricantes, seminibus earentes.

† 562. **Pasta caustica Viennensis.**

R̄. Kali caustici sicci

drachmas quinque,

Calcariae causticæ

drachmas sex.

Misce et in lagena vitrea, epistomio vitreo bene obturata dispende, ex tempore paratum.

563. **Pasta gummosa albuminata.**

Pasta Althæac.

R̄. Pulveris Gummi arabici electi

„ **Sacchari albissimi**

— libras duas.

Solve in

Aquæ fervidae

libris duobus.

Evapora ad pastæ consistentiam, sub finem addendo :

Albuminis ovorum

numero viginti

in spumam conquassati.

Sub continua agitatione misce et tandiu evapora, donec massæ aliquantulum exentum e spathula lignea non defluat, et manibus non adhaereat, tunc adde :

Aquæ Aurantii florum

uncius duas.

Massa per breve tempus adhuc super ignem detenta, tandem effundatur super tabulam ligneam amylo conspersam, et in locum siccum seponatur.

Sit alba, non nimium siccæ, in ore facile liquecens.

564. Pasta Liquiritiae flava.

R. Succi Liquiritiae venalis depurati	<i>uncias tres,</i>
Gummi arabici	
Sacchari albi	<i>aa libras duas.</i>
Cum	
Aquae fontanae	<i>suffic. quantitate,</i>
Albumine ovorum	<i>numero viginti,</i>
fiat pasta, addendo sub finem	
Elaeosacchari Vanillae	<i>drachmas tres.</i>
In taleolas scissa servetur.	

565. Pastilli Bilinenses.

Pastilli venales, rotuliformes, albi, saporis alcalini non ingrati, in aqua solubiles.

566. Petroleum.**Oleum Petrae rubrum.**

Oleum aethereum bituminosum e terra et saxorum rimis scaturiens, tenue, limpidum, flavescens v. rubrum, odoris et saporis bituminosi, aëris aditu spissescit et nigrum evadit. Solvitur in oleis, difficilius autem in spiritu vini rectificatissimo.

567. Petroleum rectificatum.**Oleum Petrae album.**

Oleum venale, sit limpidissimum, decolor.

†568. Phosphorus.

In officinis chemicis paratus, sistit bacillos compactos, lentos, extus opacos, intus pellucidos.

In aëre oxygenium attrahens, fumos alliaceos spargit, calore liquatur, in aëre inflammatur. In spiritu vini et aethere parum, in oleis omnino, non in aqua solvitur.

Phosphorum, qui ad usum medicum adhibetur, ab omni Arseniei vestigio plane immunem esse oportet.

† 569. **Pilulae Augustini.**

R̄. Pulveris Aloës lucidae	<i>uncias tres,</i>
„ radicis Rhei	<i>drachmas tres,</i>
„ Scammonii	
„ Colocynthis	
„ radicis Jalapae	
„ Myrrhae	<i>āā drachmam.</i>

Misce eum

Spiritus vini rectificati *s. q.*

et fiant pilulae granorum duorum.

Irrorentur eum Aethere, neve conspergantur.

570. **Piper nigrum.**

Baccae *Piperis nigri* Linn. fruticis scandentis Asiam tropicam incolentis sui ordinis, immaturae, siccatae, durae, pisi minoris forma et magnitudine, nigro-fuscae, rugosae, semen involventes unicum album (sub nomine *Piperis albi* cognitum), odoris aromatici, saporis acerrimi, aromatici.

571. **Piperinum.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sint crystalluli prismatici, flavi, odoris et saporis expertes, reactionis neutrius, in aqua insolubiles, facile solubiles in Aleohole et in 100 p. Aetheris.

572. **Pix liquida.**

Praeparatum venale, e Fago sylvatica destillatione sicca paratum. Sit liquor spissus, aqua gravior, coloris nigro-fusci, odoris empyreumatici, Kreosotum redolens.

573. **Pix navalis.****Pix nigra solida.**

Evaporatione sicca Picis liquidæ obîenta massa atra, opaca, vitrei splendoris, in frigore fragilis, calore inter digitos ductilis, odoris peculiaris resinosi.

† 574. **Plumbum aceticum crudum.****Saccharum Saturni crudum.**

In officinis chemicis paratum, sistit massam crystallinam, decolorem, saporis cum notabili dulcedine acerbi. Aëre acidum aceticum sensim exhalat et inde in aqua plus minus insolubile.

Servetur in vase vitreo bene clauso.

† 575. **Plumbum aceticum depuratum.****Saccharum Saturni depuratum. Acetas Plumbi acidulus depuratus.**

R̄. Plumbi acetici crudi *uncias duodecim,*
solve in

Aquæ destillatæ calidæ *unciis octodecim,*
addendo :

Acidi acetici concentrati puri *drachmam.*

Liquor filtratus ad crystallos formandas seponatur, quibus exemptis fluidum remanens cum

Acidi acetici concentrati puri *s. q.*

evaporetur, ut denuo crystallos formet, quæ operatio tamdiu repetatur, quamdiu crystallos decolores formantur.

In vasis bene clausis, loco obscuro serva.

Crystalli sint prismaticeæ, decolores, in aëre sicco fatiscentes, in aqua facile et ex integro solubiles, saporis dulcis acerbi. Solutio laccam musicam parum rubefacit.

† 576. **Plumbum aceticum solutum.****Saccharum Saturni solutum. Acetas Plumbi acidulus solutus.**

R̄. Plumbi acetici depurati *uncias duas,*

Aquae destillatae
Solve et serva.

libram unam.

†577. **Plumbum aceticum basicum solutum.**

Acetum Lithargyri. Acetum Plumbi. Acetum Saturni.
Extractum Saturni. Acetum plumbicum.

R. Plumbi acetici depurati *uncias sex,*
solve in

Aquae destillatae *libris duabus.*
adde:

Plumbi oxydati pulverati *uncias tres.*

Stent in vase vitreo clauso, saepius agitando, donec color sedimenti ruber in album mutatus fuerit.

Liquor filtratus servetur in vase vitreo bene clauso.

Sit limpidus, decolor, chartam exploratoriam eurenma tinctam rubro-fuseam reddat.

Ne sit Cupro inquinatus.

578. **Plumbum carbonicum.**

Cerussa. Cerussa veneta.

In officinis chemicis paratum, massam refert albissimam, ponderosam, amorpham v. lamellosam, in tabulas v. conos formatam, odoris et saporis expertem.

Ad usus medicos nonnisi Plumbum carbonicum purum adhibe. Rejice Cerussam ad usus technicos destinatam, Baryta sulfurica, Plumbo sulfurico, Gypso aut Creta inquinatam.

579. **Plumbum hyperoxydatum rubrum.**

Minium.

In officinis chemicis paratum, sistit pulverem ponderosum, lacte rubrum, inodorum et insipidum, in aqua insolubilem, in acidis pro parte solubilem.

580. Plumbum oxydatum.**Lithargyrum.**

In officinis metallicis obtentum, sistit massas rubro-flavescentes, ponderosas, squamosas, nitidas, inodoras et sapore destitutas; in aqua insolubiles, in acido nitrico et acetico solubiles.

† 581. Plumbum tannicum.**Cataplasma ad decubitus. Unguentum ad decubitus.**

Rx. Corticis Quercus concisi *uncias duas.*

Coque cum

Aquae fontanae *suffic. quant.*

ad colaturam *unciarum octo,*

et decocto filtrato affunde inter agitationem

Plumbi acetici basici soluti *uncias duas.*

Praecipitatum ope filtri separatum ponderis

unciarum circiter trium,

humidum adhuc sub forma linimenti spissioris in ollam immitte et adde

Spiritus vini rectificatissimi *drachmas duas.*

Non nisi ad dispensationem paretur.

582. Poma acidula.

Fructus *Pyri Mali* Linn. notissimi. Elige illas varietates, quae majorem acidi malici copiam continent.

583. Potio Riveri.**Potio antiemetica.**

Rx. Kali carbonici puri *drachmam unam,*

Succi Citri recentis *unciam unam et dimidiam,*

admisce :

Aquae destillatae frigidae *unciam unam et dimidiam,*

Syrupi simplicis *unciam dimidiam,*

cola per linteum.

Ex tempore parandum.

584. Pulpa Cassiae.**R̄. Cassiae Fistulae***q. v.*

exime pulpam cum dissepimentis transversis et seminibus ope spatulae, elue cum

Aquae fontanae calidae*q. s.*

trajice per cribrum setaceum, et inspissa cauta evaporatione in lebetestanneo ad extracti liquidi consistentiam, deinde adde pro singulis libris:

Sacchari albi*uncias quatuor.*

Leni igne ulterius inspissando fiat pulpa.

Sit odoris melliti, saporis grate dulcis et nulla inquinacionis metallicaevestigia prodaf.

585. Pulpa Prunorum.**R̄. Fructuum Pruni siccatorum***q. v.*

coque in

Aquae fontanae*s. q.*

continuo agitando, usque ad mollitiem.

Pulpam per cribrum setaceum transmissam leni igne evapora ad extracti spissioris consistentiam, deinde adde pro singulis libris:

Sacchari albi*uncias quatuor.*

et cauta evaporatione inspissa ad pulpae legitimae consistentiam.

586. Pulpa Tamarindorum.

E fructibus Tamarindi paretur, ut pulpa Prunorum.

587. Pulvis aërophorus.**R̄. Natri bicarbonici subtiliter triti***scrupulum unum.*

Detur ad chartam caeruleam.

R̄. Acidi tartarici subtiliter triti*grana quindecim.*

Detur ad chartam albam.

388. **Pulvis aërophorus Seidlitzensis.****Seidlitz Powder Anglorum.**℞. Kali natronato-tartarici subtiliter triti *drachmas duas,*Natri bicarbonici subtiliter triti *scrupulos duos.*

Mixta dentur ad chartam coeruleam.

℞. Acidi tartarici subtiliter triti *scrupulos duos.*

Detur ad chartam albam.

† 389. **Pulvis alterans Plummeri.****Pulvis Plummeri.**

℞. Hydrargyri chlorati mitis

Stibii sulfurati aurantiaci *aa partes aequales.*

Triturando misce.

Paretur ex tempore.

390. **Pulvis antihectico-scrophulosus.****Pulvis Nucum Moschatarum compositus.**

℞. Pulveris Baccarum Lauri tostorum

„ Nucis Moschatae *aa unciam unam,*„ Cornu Cervi usti *uncias duas.*

Misce.

† 391. **Pulvis Cosmi.****Pulvis arsenicalis Hellmundi.**℞. Pulveris Cinnabaris factitiae *drachmam dimidiam,*

„ Ossium ustorum

„ Sanguinis Draconis *aa grana quatuor,*„ Arsenici albi *grana decem.*

Misce ex tempore.

392. **Pulvis dentifricius albus.**℞. Pulveris Lapidum Cancrorum *uncias duas,*„ Ossis Sepiae *unciam unam,*

Pulveris Tartari depurati	
„ Radicis Ireos florentinae	<i>aa unciam semis,</i>
Olei Caryophyllorum	<i>guttas octo.</i>
Misce.	

593. **Pulvis dentifricius niger.**

Rx. Pulveris corticis Chinae regiae	
„ foliorum Salviae	
„ Carbonis ligni depurati	<i>aa unciam semis.</i>
Misce.	

594. **Pulvis dentifricius ruber.**

Rx. Coccionellae	<i>unciam semis,</i>
Tartari depurati pulverati	<i>uncias sex,</i>
Aluminis usti	
Ossium Sepiae	<i>aa unciam unam.</i>
Misce cum	
Aquae fontanae	<i>s. q.</i>
ut fiat pasta, quae exsiccata in pulverem redigatur, deinde adde:	
Olei Olivarum optimi	
„ Caryophyllorum	<i>aa guttas triginta.</i>
Misce exactissime.	

† 595. **Pulvis Doweri.**

Pulvis Ipecacuanhae cum Opio.

Rx. Pulveris radicis Ipecacuanhae	
„ Opii puri	<i>aa drachmam unam,</i>
„ Sacchari albi	<i>unciam.</i>
Misce diutius terendo.	

596. **Pulvis fumalis Dr^{is}. Engel.**

Rx. Myrrhae	<i>drachmas duas,</i>
--------------------	-----------------------

Olibani	
Mastiches	\overline{aa} unciam unam et dimidiam,
Sacchari albi	
Succini	\overline{aa} unciam dimidiam,
Boli armenae	uncias sex.
Misce, fiat pulvis.	

597. **Pulvis fumalis nobilis.**

Rγ. Radicis Ireos florentinae	
Corticis Cassiae Cinnamomeae	
Styracis in granis	\overline{aa} uncias sex,
Benzoës	uncias tres,
Corticis Cascarillae	
Caryophyllorum	
Florum Lavandulae	
„ Calendulae	\overline{aa} uncias duas,
„ Rosarum rubrarum	uncias quatuor.

Conseinde in pulverem grossum, et per cribrum trajectum irrorare cum:

Spiritus Coloniensis	uncia dimidia.
Optime commixtum serva in vasis vitreis bene clausis.	

598. **Pulvis fumalis ordinarius.**

Rγ. Olibani	uncias octo,
Succini rubri	uncias quatuor,
Mastiches	
Sandaracae	\overline{aa} uncias duas,
Styracis Calamitae	
Benzoës	\overline{aa} unciam unam et semis,
Florum Rosarum rubrarum	unciam unam,
„ Lavandulae	
„ Cyani	
„ Calendulae	\overline{aa} drachmas duas.

Ruditer concisa et contusa misce in pulverem grossum.

599. **Pulvis gummosus.**

R̄. Pulveris Amyli

„ Radicis Liquiritiae āā unciam unam.

„ Gummi arabici

„ Sacchari albi āā uncias duas.

Misce.

600. **Putamen nucum Juglandis.****Cortex nucum Juglandis interior.**

Endocarpium lignoso-osseum Nucum Juglandis exemptis seminibus, et a cortice viridi exteriori mundatum.

601. **Radix Alcanthae.**

Alcanthae tinctoriae Tausch. (*Lithospermi tinctorii* Linn.) plantae ex ordine *Boraginacearum*, in Europa imprimis australi crescentis radix, calami scriptorii usque digiti crassitie, rugosissima, varie flexa et torta, cortice atro-purpureo, decolorante, ligno albo. Odor nullus. Sapor modice adstringens, mucosus. Masticata salivam rubro tingit.

602. **Radix Althaeae.**

Althaeae officinalis Linn. plantae nostratis, ad usus pharmaceuticos etiam cultae, e *Malvacearum* ordine, radiculae rhizomatis teretes, a calamo scriptorio ultra digitum crassae, epidermide flaviusculo-grisea, transversim rugosa, parenchymate carnosio, e cellulis amylo saturatis composito, medulla annulo carneo cineta. Odor peculiaris debilis, sapor fatuus, mucilaginosus.

Fodiatur vere, antequam stirpium annosarum folia radicalia penitus explicata fuerint, et rejecto rhizomate, partibus lignosis et cariosis, radiculae concisae siccatae servantur.

603. **Radix Angelicae.**

Archangelicae officinalis Hoffm. (*Angelicae Archangelicae* Linn.) herbae *Umbelliferae* biennis in subalpinis et paludosis Europae imprimis

borealis crescentis rhizoma, subspongiosum, pollicare vel bipollicare, radiculis praelongis, simplicibus, fere calami scriptorii crassitie onustum. Epidermis in siccio cinereo-lutescens, parenchyma albidum punctis resinosis, splendentibus, e recentis succo flavo indurato residuis conspersum. Odor penetrans, peculiariter aromaticus, sapor primum dulci-
usculus, deinde aromatico-acris.

Primo vere effossa et caute siccata in vitris clausis servetur. Rhizoma a vermibus corrosus rejice.

604. **Radix Arnicae.**

Arnicae montanae Linn. plantae *Compositae* in Europae mediae et borealis pratis montanis sylvaticis crescentis rhizoma, fere cylindricum, fragile, bi-tripollicare, vix calamo scriptorio crassius, fuscum, rugosum, annulatum, passim squamis badiis, mollibus et caulium rudimentis obsessum, ex uno latere emittens fibras radicales copiosas, calami secalini crassitie, pallide flavas. Odor proprius, aromaticus, nec vehemens, nec amoenus; sapor aromaticus, mordax, subamarus, diu durans.

Autumno e plantis fructiferis collecta et cito siccata, caute servetur, quia et mucedine facile corrumpitur et ab insectis exeditur.

605. **Radix Bardanae.**

Lappae vulgaris Neilr. (*Arctii Lappae* Linn.) plantae biennis, *Compositae*, vulgaris notitiae, radix fusiformis, digiti circiter crassitie, pedem interdum longa, fibris radicalibus vestita, extus fuseo-cinerea, intus carnosio-spongiosa, alba. Recentis odor gravis subnarcoticus, siccatae debilior, sapor dulciuseculus, mucilaginoso-amarus.

Colligatur sero autumnio, e planta nondum caulescente, partibus lignosis, cavis et mucidis rejectis.

† 606. **Radix Belladonnae.**

Atropae Belladonnae Linn. plantae perennis, e *Solanacearum* ordine, in Europae fere totius nemoribus, imprimis montanis crescentis, radix fusiformi-cylindrica, ramosa, pollicis crassitie et ultra, ramis calamo scriptorio paulo crassioribus, extus siccatione sordide grisea, longi-

tudinaliter rugosa, intus albida vel subcinerea, punctis flavescens nitidulis conspersa. Odor nullus, sapor fatuus, nauseoso-amarisculus, irritans.

Sub finem aestatis e stirpibus fructiferis collecta, et rejectis partibus quoquo modo vitatis, caute siccata, servetur in loco bene clauso.

Lignosa tenax, nec facile frangenda, vel a vermibus corrosa rejiciatur.

607. **Radix Caineae.**

Chiococcae anguifugae Mart. *Chiococcae densifoliae* Mart. et *Chiococcae racemosae* Jacq. suffrutescens Brasiliensium ex ordine *Rubiacearum* rhizoma ramosum, ramis pennae anserinae v. digiti minimi crassitie, plus minus tortis, epidermide griseo-fusca, aspera, annulato-nodosa, substantia interiore sordide alba v. ochroleuca, lignosa, tenaci, odoris debilis, nauseosi, saporis cum acerbitate amaricantis, sialagogum.

608. **Radix Calami aromatici.**

Radix Acori.

Acori Calami Linn. plantae perennis ex *Aroidearum* familia, in Asia indigenae, nunc in paludosis Europae mediae ubique jam sponte provenientis rhizoma horizontale, ramosum, subcylindricum, digiti minimi crassitie, annulato-geniculatum, ad geniculos squama fusca vaginatum, hinc fibrillis radicalibus copiosis, filiformibus, albidis obsitum, recentis epidermide olivacea, in sicco brunescens, parenchymate spongioso-carnoso, minutim poroso, exsiccatione fere arancoso-fibroso, fragili. Odor aromaticus, fragrans, sapor cum amaritudine acriusculus.

Radix autumnis sero effossa, et cortice nequaquam detracto longitudinaliter in taleolas dissecta, leni calore siccatur. Decorticata fere iners est.

609. **Radix Caricis arenariae.**

Caricis arenariae Linn. plantae *Cyperaceae* in arena mobili Europae mediae borealis crescentis rhizoma horizontale, elongatum, dichotome-

ramosum, culmi triticei crassitie, articulatum, squamis vaginantibus, elongatis, badiis, laceris obsessum, tenacissimum, longitudinaliter fissile. Odor recentis balsamicus, siccatae fere nullus, sapor dulciuseculus irritans.

Ne confundas cum radice Caricis hirtae, quae penitus inodora et insipida est.

610. **Radix Caryophyllatae.**

Gei urbani Linn. plantae perennis indigenae, e *Rosacearum* ordine, in subsylvaticis, imprimis montanis crescentis rhizoma oblongum, subpraemorsum, calami scriptorii crassitie, undique imprimis autem ex apice emittens fibras radicales tenues, praelongas, flexuoso-intricatas, rigidas, fragiles, extus cinereo-bruncas, intus rubellas seu violaceas. Odor caryophyllinus in sicca debilior, sapor subamaricans, adstringens.

Verno tempore fodiatur in montibus, et leni calore siccata servetur in vasis bene clausis non ultra biennium.

611. **Radix Chinae nodosae orientalis.**

Smilacis Chinae Linn. et aliarum specierum affinium, fruticum in Asia tropica crescentium e *Smilacearum* ordine, radix tuberiformis, quatuor sexve pollices longa, pollicem unum v. duos crassa, dura, ponderosa, cortice luteo brunescente, parenchymate pallide flavo-rubente, punctis bruncis, versus centrum confertioribus notato, minutim poroso. Odor submucidus, sapor modice dulcis, mucilaginosus, diutius masticatae subausterus.

Rejiciatur radix Chinae nodosae occidentalis, e *Smilace Pseudo-China* Linn. in Mexico et Antillis collecta, pallide fusca, levis, spongiosa.

612. **Radix Cichorei.**

Cichorei Intybus Linn. plantae *Compositae* nostratis notissimae radix lactescens, cylindrico-fusiformis, subramosa, digiti crassitie, spithamam ad pedem longa, extus cinereo-flavescens, intus carnosa albida, annulo lignoso ochroleuco. Sicca rugosa, fragilis, inodora, amara.

Aestate incunte, ante caulium evolutionem, qua tempestate abundantissime lactescit, fodienda et cito siccanda.

613. **Radix Colombo.**

Cocculi palmati DC (*Menispermis palmati* Linn.) fruticis *Menispermacei*, in Africae occidentalis littore intertropico crescentis radix, advehitur in segmentis suborbicularibus, unius v. duorum pollicum diametro, duas quatuorve lineas crassis, compactis, fragilibus, subporosis, trititando in pulverem flavescenti-cinereum redigendis, odoris debilis, ingrati, saporis peramari, diu haerentis. In segmentis radicis Colombo tria imprimis v. quatuor strata distinguenda sunt, extimum flavo-virens, intermedium subfuscum, et intimum pallidius cinereo-flavescens, quae omnia radiis medullaribus fuscis, punctatis interrumpuntur. Cum tinctura Jodi colorem atro-caeruleum induit.

614. **Radix Curcumae.**

Curcumae longae Linn. et *Curcumae viridiflorae* Roxb. plantarum Indicarum e *Zingiberacearum* ordine rhizoma siccatum venale, occurrit in frustis oblongis vel rotundatis, ponderosis, epidermide pallide lutea, rugosa, parenchymate solido, duro, croceo-brunco, resinoso splendente.

Odor debilis, zingiberaceus, sapor amariuscule-resinosus.

Pigmentum continet in aqua pro maxima parte solubile, solutione lacte flava, turbida, ab alcalinis rubro-brunescens.

615. **Radix Enulae.**

Radix Helenii. Radix Inulae.

Inulae Helenii Linn. plantae *Compositae* in Europae mediae et australis montibus crescentis, in usus pharmaceuticos hinc inde in hortis cultae, radix valida, ramosa, cortice tenui, albescens, in sicco lutescente-brunco, longitudinaliter sulcato-rugoso, parenchymate carnoso, tandem lignescens, strato extimo fuscescens, centro flavo, radiis

medullaribus rufescentibus percurso. Odor recentis gravis, subcamphoratus, siccae debilior. Sapor aromatico-mucilaginosus, deinde cum acredine amariuseculus.

Radix vere effossa et in frusta tenuia discissa siccatur. Aetate odorem fere penitus amittit, unde saepius removenda.

616. **Radix Filicis maris.**

Nephrodii Filicis maris Rich. (*Polypodii Filicis maris* Linn.) filicis in Europa monticolae caudex subterraneus horizontalis, pedem circiter longus, 2—3 pollices crassus, undique emittens fibras atrofuscas descendentes, tectus ramentis paleaceis, ferrugineis, et stipitum reliquiis bulbiformibus imbricatis. Remotis ramentis et fibris caudex extus atro-fuscus, siccitate sordide rubellus apparet, intus ochroleucovirescens, fasciculis vasorum pallidioribus. Odor peculiaris, ingratus, sapor dulciusculus, adstringens.

Fodiatur primo autumno, pulvere e sporangiis in frondium parte aversa defluente, et remotis fibrillis et ramentis caute siccata, ne ultra annum servetur.

617. **Radix Galangae.**

Alpiniae Galangae Swartz (*Marantae Galangae* Linn.) plantae perennis e *Zingiberacearum* ordine, in Asiae insulis intertropicis crescentis, ut creditur, rhizoma tuberoso-cylindricum, ramosum, incurvum, geniculatum. Prostat in frustulis duos v. tres pollices longis, digiti minimi crassitie, fuscis, striatis, albido-annulatis, intus pallide rufescentibus, compactis, fibroso-tenacibus. Odor grate aromaticus, sapor similis, cum acredine urens, diu durans.

In universum e merce multis modis inquinata eligantur frusta minoris crassitie et odoris aromatici, satis manifesti.

618. **Radix Gentianae.**

Gentianae luteae Linn. et *Gentianae pannonicae* Scop. plantarum sui ordinis, in pratis alpinis et subalpinis Europae crescentium radix siccata, duplici varietate prostat.

Radix Gentianae luteae seu majoris, e *Gentiana lutea* Linn. imprimis in Helvetia collecta, sistit segmenta diversae magnitudinis, plerumque longitudinaliter secta, rugosa, rugis annularibus approximatis, cortice fuscescente crasso, annulo saturatius tineto, a parenchymate flavescente, centro spongioso medullosa distincto.

Radix Gentianae rubrae, e *Gentiana pannonica* Scop. in Alpihus et in Carpathis collecta, occurrit in segmentis integris, annulis transversis, superne obsolete vel nullis, longitudinaliter rugosis, profundius fusco-coloratis.

Odor utriusque varietatis debilis, sapor primum subdulcis, deinde amarissimus, faucibus diu haerens.

619. **Radix Graminis.**

Tritici repentis Linn. *Graminis* notissimi ad vias, sepes et in agris passim luxuriantis stolones subterranei, praelongi, tennes, teretes, fistulosi, tenaces, nodosi, ad nodos radiculis obsiti, coloris straminei, inodori, saporis dulcis subirritantis.

Fodiatur vere, antequam culmi prodierint, et resectis radiculis siccata servetur.

† 620. **Radix Gratiolae.**

Gratiolae officinalis Linn. herbae *Scrophularinae* in humidis Europae degentis rhizoma cylindricum, pennae corvinae circiter crassitie, flavescenti-griseum, articulatum, ad articulos squamulis ovatis nigricantibus tectum, ibidemque fibras radicales numerosas, longas emittens. Odor nullus, sapor nauseosus, amaro-aeris.

† 621. **Radix Hellebori nigri.**

Hellebori nigri Linn. plantae *Ranunculaceae*, in sylvis Europae subalpinis crescentis rhizoma multiceps, variae longitudinis, dimidium fere pollicem crassum, subanguloso-cylindricum, undique fibrilliferum, fibrillis culmi secalini crassitie, rigidis, nigris, vario modo contortis, longitudinaliter rugosis. Odor debilis, subnauseosus, sapor aeris simul et peramarus.

† 622. **Radix Jalappae.**

Ipomoeae Purgae Wender. plantae *Convolvulaceae* in montibus Mexici crescentis radix, siccata advehitur in tuberibus subglobosis v. pyriformibus, nucis juglandis vel pugni mole, longitudinaliter rugoso-tuberculatis, obscure griseo-fuscis et inter rugas fumoso-sordidis, immixtis segmentis orbicularibus, plano-convexis, densis, duris, ponderosis, intus strata concentrica, puncta et lineas fuscas monstrantibus, fractura resinoso-nitente. Odor debilis nauseosus, sapor inamoene dulciuseculus, deinde aeris, irritans.

623. **Radix Imperatoriae.**

Peucedani Imperatoriae Endl. (*Imperatoria Ostruthium* Linn.) plantae *Umbelliferae* in subalpinis Europae mediae et borealis crescentis rhizoma, aliquot pollices longum, dimidium pollicem crassum, annulatum, geniculatum, e tuberculis radículas copiosas agens, cortice bruneo longitudinaliter rugoso, parenchymate albido, centro compactiore, flavente, punctis resinosis, nigricantibus nitente. Odor recentis fere Angelicae, sapor subamarus, modice pungens.

† 624. **Radix Ipecacuanhae.**

Cephaelidis Ipecacuanhae Willd. herbae *Rubiaceae*, in sylvis primaevis Brasiliae crescentis, radix horizontalis, simplex v. in ramos paucos divergentes divisa, flexuosa et torta, culmi triticei vel pennae anserinae crassitie, tota obsita rugis annularibus valde prominentibus, latis, approximatis, epidermide laevigata, glabra, dilute fusca, siccitate umbrina, tandem umbrino-nigricante v. griseo-fusca, parenchymate siccitate pallide rubro, testaceo, resinoso-splendente, a filo centrali lignoso dilute flavido facile secedente. Odor debilis, mucidus, inter tritrandum fortior, ingratus, sapor nauseosus, amarus, subaeris.

625. **Radix Ileos florentinae.**

Iridis florentinae Linn. plantae *Irideae* in Europa australi indigenae et in Italia superiore cultae rhizoma tuberiforme, siccatum et decorti-

catum, venditur in frustis oblongis, nodoso-ramosis, incurvis, subrugoso-suleatis, fibrarum rudimentis cicatrisatis v. laevigatis, duris, compactis, flavescentibus v. albidis. Odor grate aromaticus Violarum, sapor amaricans, deinde acris.

626. **Radix Lapathi acuti.**

Rumicis obtusifolii Linn. plantae ex ordine *Polygonearum* radix fusiformis v. cylindrica, spithamam longa, digiti crassitie, subramosa, parce fibrillosa, extus badia, parenchymate compacto, ochroleuco v. luteo subrubente, radiatim striato. Odor in sicca nullus, sapor cum acerbitate subacris et amaricans. Masticando salivam flavo tingit.

Fodiatur autumnno, e planta fructifera, foliis emarcidis, et cito siccetur.

627. **Radix Levistici.**

Levistici officinalis Koch, herbae *Umbelliferae* in montanis Europae mediae australioris spontaneae, in hortulis rusticorum apud nos frequentissime cultae rhizoma crassum, multiceps, recens subtus in fibras radicales longas carnosas desinens, extus brunco-flavesceens, intus albidum, laesum succum lacteum flavescentem plorans, exsiccatum spongiosum, valde corrugatum, extus bruneum, intus albido-flavesceens, punctulis resinosis rutilo-flavis scatens. Odor peculiaris gravis aromaticus. Sapor primum subdulcis, demum acriter aromaticus subamarus.

628. **Radix Liquiritiae.**

Glycyrrhizae glabrae Linn. plantae *Papilionaceae* in Europa australiore spontaneae, in media etiam cultae, radix longissime repens, ramosa, pollicem crassa, extus glabra, griseo-fusca, striato-suleata, intus lutescens, radiata. Odor peculiaris, sapor perquam dulcis cum aliqua acredine.

629. **Radix Ononidis.**

Ononidis spinosae Linn. suffruticis *Papilionacci* in arvis et campis obvii, aestate adulta florentis radix multiceps, cylindrica, calami scrip-

torii circiter crassitie, pluripedalis, ramosa, tenacissima sub epidermide griseo-fusca et cortice tenui fusco, lignum exhibens album, radiis medullaribus crebris percursum. Odor nullus, sapor ingrate acerbus cum aliqua dulcedine.

Fodiatur autumnno e fructifera planta.

630. **Radix Petroselini.**

Petroselini sativi Hoffm. (*Apii Petroselini* Linn.) herbae *Umbelliferae* in hortis passim satae radix fusiformis cuivis notissima, alba, obiter et irregulariter annulata, carnosa, odoris aromatici, saporis dulcis, subacris.

Vere fodienda.

631. **Radix Polypodii.**

Polypodii vulgaris Linn. *Filicis* in Europae sylvaticis ad rupes crescentis rhizoma, crassitie pennae corvinae vel parum crassius, teretiusculum, ramosum, nodosum, quasi articulatum, squamis scariosis bruncis obsessum, extus fuscum, intus viridi-flavescens, odoris rancidi, saporis subdulcis, demum cum acredine amaricantis.

632. **Radix Pyrethri.**

Anacycli Pyrethri DC. (*Anthemidis Pyrethri* Desfont.) plantae *Compositae* mediterraneae in Algeria imprimis collectae radix, circumfertur in segmentis cylindricis calami scriptorii aut digiti crassitie, quadri-pluripollicaribus, rugosis, griseo-fuscis, inodora, saporis acris, fere caustici, salivam copiose cientis.

633. **Radix Batanhiae.**

Krameriae triandrae Ruiz et Pav. plantae suffruticosae *Polygaleae* in Peruvia crescentis radiculae e rhizomate ortae, concisae in frusta digitum et ultro crassa, cylindrica, simplicia v. ramosa, saepe flexuosa, rugosa tuberculato-aspera, epidermide fusco-rubra, cortice crasso facile separabili, parte lignosa compacta, ochroleuca vel cinnamomea, nunc ampla, nunc partem corticalem vix superante.

Odor nullus, sapor, imprimis partis corticalis, admodum adstringens, amaricans.

Radicem ligno flavescente praeditam ut spuriam rejice.

634. **Radix Rhei.**

Radix Rhabarbari.

Rhei palmati Linn., plantae *Polygoneae*, in alpinis Chinae boreali-occidentalis crescentis radix decorticata et in frusta concisa, partim per Rossiam terrestri itinere (*Rheum moscoviticum*) ad nos adlata, prostat in segmentis irregularibus, variae magnitudinis, saepe hinc planis, inde convexis, non raro foratis, extus luteis, pulvere deter-sili conspersis, intus rubro et albo variegatis. Odor peculiaris aromaticus, sapor nauseoso-amaricans. Salivam manducantis flavo tingit, sub dentibus stridet.

Radix vetusta, cariosa, levis et spongiosa, vel lignosa et tenax, mucida vel nigricans omnino rejiciatur.

635. **Radix Salep.**

Tubera radicalia *Orchidearum* quarundam Asiaticarum oblonga aut ovata, integra vel basi palmatim partita, perforata et trajecto filo conjuncta, albida, grisea aut flavescentia, diaphana, durissime subcornea ponderosa, inodora, mucilaginosa, in aqua sensim intumescencia, et tandem in mucilaginem lubricam conversa.

Colligantur aestivis mensibus e plantis fructiferis, et aqua fervida necata ac cito siccata servantur.

636. **Radix Saponariae.**

Saponariae officinalis Linn. plantae indigenae *Caryophyllaceae* radix fusiformis, emittens ramos repentes, teretes articulatos, bi-tripedales, calamus scriptorium crassos, extus fusco-rubellos, parenchymate albido-grisco, parum compacto, a ligno centrali saepe cavo facile separabili. Odor nullus, sapor primum dulciuseculus, dein acris, irritans.

Radix vere effodienda, quo tempore folia ovato-lanceolata, trinervia prodeunt.

637. **Radix Sarsaparillae.**

Smilacis diversarum specierum, in America tropica crescentium fibrae radicales praelongae, singulae, teretes, calami scriptorii crassitiam vix aequantes, bi-quadripedales, flexiles, striato-sulcatae.

Distinguuntur duae praecipue varietates:

- a) *Sarsaparilla acris* (Honduras). Transversa sectio exhibet corticem crassum album, amylo scatentem, annulo fuscescente a parte centrali lignosa tenaci separatum. Sapor acris, parum amarus.
- b) *Sarsaparilla amaricans* (Veracruz). Transversa sectio exhibet corticem tenuem rufescentem, densum et minime farinosum, strato annulari fusco separatum a parte centrali crassa, alba, saepe porosa, rubella.

638. **Radix Senegae.**

Polygalae Senegae Linn. plantae perennis, ordinis *Polygalearum*, in Americae borealis temperatis crescentis rhizoma venale, caulium rudimenta ferens, calami scriptorii crassitie, subnodoso-rugosum, annulatum, radículas gerens bi-tripollicares tortas, annulatas, rugosas, rugis per annulos decurrentibus, epidermide cinereo-flavida, cortice flavescente, resinoso-nitente, fragili, parenchymate ochroleuco, lignoso, fissili. Odor fere nullus, sapor ligni modicus, corticis primum submucosus, deinde ingrate acidulus, admodum acris, peculiari rancore fauces vellicans.

639. **Radix Serpentariae Virginianae.**

Aristolochiae Serpentariae Linn. et *Aristolochiae officinalis* Nees. plantarum sui ordinis in Americae borealis calidioris montibus crescentium rhizoma tuberosum, caulium et turionum reliquiis onustum, tenue, pollicare v. sesquipollicare, flexuosum, obsitum radiculis capillaribus ramosis, intricatis, uni-tripollicaribus, griseis vel ochroleucis, sub cortice tenui includentibus parenchyma densum, flavescens. Odor aromaticus, subcamphoratus, sapor aromatico-amarus.

640. Radix Symphyti.**Radix Consolidae majoris.**

Symphyti officinalis Linn. plantae ex ordine *Boraginearum* in pratis humidis et pomariis apud nos obviae radix, calami scriptorii v. digiti minimi crassitie, extus nigro-fusca, intus albida, tenax, centro medullosa, inodora, saporis mucilaginosi, modice duleis.

Autumno effossa et longitudinaliter difissa siccetur.

641. Radix Taraxaci.

Taraxaci officinalis Wigg. (*Leontodon Taraxacum* Linn.) plantae *Compositae* cosmopolitae et in vulgus notae radix multieeps, cylindrico-fusififormis, fere inodora, saporis primum duleis, deinde amari.

Fodiatur primo vere aut sero autumno et caute siccata servetur.

642. Radix Tormentillae.

Tormentillae erectae Linn. plantae e familia *Rosacearum*, in pratis montanis et campis tota aestate florentis rhizoma horizontale vel obliquum, cylindrico-fusifforme, flexuoso-curvatum, digiti minimi crassitie, fibris longis, tenacibus, filiformibus obsessum. Odor debilis, rosaceus, in sicco fere nullus, sapor valde adstringens.

Fodiatur vere primum ac folia radicalia ternata prodierint, et fibris resectis siccetur.

643. Radix Valerianae.

Valerianae officinalis Linn. plantae sui ordinis, in sylvis et ad sepes Europae crescentis rhizoma breve, subrotundum vel oblongum, truncatum, undique fibris longis, culmi scealini crassitie, carnosus, sordide albis v. ochroleucis vestitus. Odor peculiaris, in sicca multo vehementior quam in recenti, sapor acris-aromaticus, camphoratus, amaritiae aliqua junctus.

Fodiatur vere, simul ac folia radicalia pinnata prodierint, in locis montanis, siccis. Plantae in pratis humidis crescentis radix parum valet.

Servetur in vase bene elauso.

† 644. **Radix Veratri albi.****Radix Hellebori albi.**

Veratri albi Linn. plantae in Europa monticolae, subalpinae, ex ordine *Melanthacearum*, rhizoma fusiforme, pollicem longum, digiti crassitie, e tuberculis ad eollum copiosis agens radieulas plurimas, elongatas, teretes, pendulas, epidermide pallide brunescente, parenchymate cinereo-flavo, spongioso.

Radieis vehementer sternutatoriae odor nullus, sapor nauseoso-amarus, deinde acerrimus.

645. **Radix Zedoariae.**

Curcumae Zedoariae Rosc. plantae e familia *Zingiberacearum* in Asia tropica erescentis, tubera radicalia subglobosa v. hemisphaerica, in taleolas seissa, rugoso-nodosa, dura, ponderosa, griseo-albida v. oehroleuca, odoris fragrantis, saporis grate aromatici, subamphorati.

Radix intus albido-farinosa, situ cariosa, parum aromatica rejiciatur.

646. **Radix Zingiberis.****Zingiber album.**

Zingiberis albi Roxb. (*Amomi Zingiberis* Linn.) plantae *Zingiberaceae*, in Asia tropica cultae rhizoma tuberosum, detracta epidermide coneisum et siccatum advehitur in segmentis compressis, palmatim ramosis, sesqui-bipollicaribus, rugosis, cicatrisatis, griseo-fuscis, ponderosis, tenacibus, intus oehroleucis, fusco-variegatis, resinoso-nitentibus. Odor aromaticus, sapor fervidus.

† 647. **Resina Jalappae.****Magisterium Jalappae.**

R. Radicis Jalappae ruditer contusae q. v.

Infundendo eum

Aquae fervidae s. q.

macera per viginti quatuor horas et exprime.

Deinde affunde

Spiritus vini rectificati

s. q.

ut radices obtegantur, et digere per viginti quatuor horas, deinde exprime, et cum nova spiritus vini quantitate iterum digere, et digestionem tamdiu repete, donec spiritus vini partibus resinosis non amplius impraegnatur.

Tunc tincturas commixtas et filtratas subijce destillationi in balneo aquae, spiritum vini abstrahendo.

Resina residua defuso liquido iteratis vicibus abluatur, donec aqua limpida et coloris expers defluerit.

Resinam ablutam et in aquae fervidae temperatura bene siccata, in bacillos formatam repone in vas clausum.

Resina admodum fragilis, fusco-lutea, fracturae splendentis, saporis acris, odoris nauseosi radicis Jalappae. In spiritu vini facile et perfecte, in Aethere et oleo Terebinthinae non solvitur.

648. Roob Ebuli.

R̄. Baccarum Ebuli

q. v.

Calefac agitando usque ad ebullitionem, deinde liquorem per setaceum trans mitte et residuum sacculis linteis inclusum ope preli exprime. Succum expressum et colatum coque ad extracti spissioris consistentiam, tunc adde:

Sacchari albi

decimam partem,

et leni igne sub continua agitatione evapora ad roob consistentiam.

649. Roob Juniperi.

R̄. Baccarum Juniperi maturarum recent. q. v.

Conquassatas coque in

Aquae fontanae

s. q.

donec mollescant, deinde exprime et cola.

Liquor colando depuratus evaporetur ad mellis spissitudinem, deinde addita

Sacchari albi

parte quarta

leni calore inspissetur in roob.

650. Roob Laffeteur.

Roob Boyveau Laffeteur. Syrupus Sarsaparillae compositus.

R̄. Radicis Sarsaparillae concisae *uncias sedecim,*
macera in

Aquae fontanae *libris octo*
per viginti quatuor horas, dein coque per $\frac{1}{4}$ horae. Cola et exprime.
Residuum coque cum

Aquae fontanae *libris septem,*
et iterum cola et exprime. Residuum denuo coque cum

Aquae fontanae *libris septem,*
et colatura adhuc fervida infundantur

Florum Boraginis

„ **Rosarum**

Foliorum Sennae

Seminum Anisi vulgaris *aa uncia.*

Stent per 12 horas, dein cola et exprime. Liquores obtentos com-
mixtos evapora ad remanentiam *librarum octo.*

Sepone ad sedimentationem, decanta et additis

Sacchari albi

Mellis depurati *aa unciis sedecim*

coque clarificando cum albumine ovi ad syrupi consistentiam.

651. Roob Mororum.

E baccis Mori paretur, ut roob Ebuli.

652. Roob Sambuci.

E baccis Sambuci nigrae paretur, ut roob Ebuli.

653. Roob Spinae Cervinae.

E baccis Spinae cervinae paretur, ut roob Ebuli.

654. Rotulae Menthae piperitae.

R̄. Olei Menthae piperitae *guttas viginti quatuor.*

Solve in lagena vitrea in
Aetheris acetici *guttis triginta,*
 et agitando vas hac solutione intus obduc.
 Deinde immitte
Rotularum Sacchari *uncias duas,*
 vas bene agitando rotulas humecta, tum siccatas in vase vitreo bene
 clauso serva.

655. **Rotulae Sacchari.**

Praeparatum ex officinis conditorum.

656. **Saccharum album.**

Substantia notissima, e succis saccharatis diversarum plantarum, imprimis autem *Sacchari officinarum* Linn. *Graminis* inter tropicos culti, et *Betae vulgaris* Linn. arboris *Chenopodeae*, in officinis propriis parata.

Ad usus pharmaceuticos eligatur saccharum coloris albissimi, inodorum, siccum, in aëre immutabile, durum, fractura crystallina nitente, massa densa compacta, crystallulis minimis dense connatis composita.

657. **Saccharum lactis.**

E sero lactis vaccini paratum, prostat in placentis crystallinis v. in massis cylindricis, e crystallis minutis prismaticis, diaphanis, albis, inodoris, dulciusculis, inter dentes stridentibus, compactis.

Solvitur in aquae fervidae partibus tribus et in frigidae partibus sex, in spiritu vini vix solubile.

Saccharum lactis odoris rancidi rejice.

658. **Sago.**

Sagi Rumphii Willd. *Sagi fariniferae* Gärt. aliarumque *Palmarum* in insulis Sundaicis crescentium amyllum, e trunci medulla bene elutriatum ac humidum, temperatura 60 — 70° C. granulatum atque siccatum, sistit granula irregularia, subdiaphana, dura, amyli granula

minutissima immutata saepissime includentia, alba, flavescentia, quandoque fuseescentia et rutilia.

659. **Salicinum.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sistit crystallos aciculares, albas, saporis amari, in aëre persistentes, in aqua et spiritu vini solubiles, quae ignitae absque residuo avolant, acido sulfurico concentrato impraegnatae colorem coecineum induunt.

660. **Sal thermarum Carolinarum.**

Sal venalis, evaporatione thermarum Carolinarum paratus.

661. **Sandaraca.**

Callitris quadrivalvis Vent. (*Thujae articulatae* Linn.) arboris ex ordine *Cupressinearum* in Africa boreali-occidentali ereseentis, resina sponte effluens in aëre siccata, prostat in granulis subrotundis v. in laerymis elongatis, ex albido citrinis, splendeseentibus, pellueidis, friabilibus, odoris grati, saporis balsamici.

662. **Sanguis Draconis.**

Suecus resinosus, aëre induratus, e fructibus *Calami Rotang* Linn. *Palmae* fruticosae, scandentis, in insulis Moluccis ereseentis colleetus, prostat in baeulis cylindricis, vel in massis ovatis seu conicis, pruni magnitudine, *Palmae* folio obvolutis, atro-rubris, superficie striatis, duris, opacis, fragilissimis, inodoris et fere insipidis. Mastieando salivam rubro inficiat, super prunis odorem spargat balsameum, et trititando pulverem praebat einnabarinum.

† 663. **Santoninum.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Crystalli prismaticae rectangulares aut foliaceae, sint decolores, lucis influxu flavescentes, inodorae, amaricantes, vix in aqua, in 43 partibus spiritus vini et 75 partibus aetheris solubiles.

Serva in vitro nigro.

664. Sapo albus.

Sapo venalis, sit siccus, modice asper, fractura grumulosus, odoris proprii, nec odore nec sapore rancidus.

665. Sapo amygdalinus.

R. Natri carbonici crystallisati *libras quatuor,*

Calcariae causticae *libras duas,*

aspersione cum aqua in pulverem redige, deinde coque cum

Aquae fontanae *libris viginti.*

Ebulliant per quadrantem horae et liquor causticus per linteum coletur, ac in lagena vitrea bene clausa subsidendo depuretur, in vase ferreo bulliendo evaporetur, donec sit frigefactus gravit. specif. 1,35; deinde iterum stet in lagena vitrea bene clausa per aliquot dies, ut subsidendo ulterius depuretur.

Demum effunde in vas porcellaneum, et admisce:

Olei Amygdalarum dulcium *duplum pondus.*

Massam in loco frigido agita continuo cum spathula lignea, donec homogenea sit et spissescere incipiat, deinde in capsulas papyraceas effusam et in loco temperato siccata in tabulas scinde.

Sit albus, durus, nec oleosus nec nimis alcalinus, nequaquam autem rancidus, in aqua et spiritu vini plane solubilis.

666. Sapo venetus.

Ex oleo Olivarum cum Lixivio Natri caustici paratus, sit albus, solidus, tactu submollis, odoris et saporis non ingratis saponacci, facile in pulverem redigendus.

667. Sapo viridis.

Sapo venalis, coctione Lixivae causticae et adipis piscium paratus, massam exhibet mollem, coloris sordide viridis vel fusco-nigrescentis, odoris ingrati, saporis alcalini caustici.

Aëri expositus non durescit, in aqua et spiritu vini facile solvitur.

† 668. **Scammonium.****Scammonium Haleppense.**

Gummiresina e radice napiformi vulnerata *Convolvuli Scammoniae* Linn. plantae *Convolvulaceae* in Syria et Asia minore ereseentis collecta, prostat in massis compactis, levibus, friabilibus, nonnihil porosis, fractura nitentibus, cinereis vel virideseentibus, triturando in pulverem albido-griseum redigendis. Odor debilis nauseosus, sapor nauseoso-subaeris, amareseens.

Scammonium fuseum vel nigrum, admixta farina v. arena inquinatum, Smyrnaeum dictum, rejice.

669. **Sebum ovillum.**

Pinguedo abdominalis *Ovis Arietis* Linn. *Ruminantis* recens, non raneida.

† 670. **Secale cornutum.**

Secalis cerealis Linn. *Graminis* ubique in annonam culti fructus, sub prima evolutione a fungillo mucedineo invasi et deformati, exerescentes in corpus monstrosum, subcylindrico-tetragonum, sursum modice incurvum, sulcis duobus longitudinalibus notatum, sex lineas ad unum pollicem longum, extus fusco-violaceum vel nigricans, intus album, marginem versus sensim violaceum, odoris submucidi, saporis nauseosi, modice aeris.

Colligatur instante messe, serena tempestate in agris, et in vitris optime elausis, nec ultra annum servetur.

Corrosum, raneidum, Ammonium redolens rejiciatur.

671. **Semen Anisi.**

Anisi vulgaris Gärtner. (*Pimpinellae Anisi* Linn.) plantae *Umbelliferae*, in Oriente indigenae, in Europa passim cultae, diaehenium ovatum vel subglobosum, pubesens, griseo-vireseens, mericarpiis quinque-eostatis, eostis aequabilibus, lateralibus, marginantibus, vittis plurimis, inter eostas sitis. Odor vehementer aromaticus, sapor fervidus juncta dulcedine.

672. Semen Cacao.**Faba Cacao.**

Theobromatis Cacao Linn. arboris e familia *Büttneriacearum* in America calidiore spontaneae, nunc inter tropicos totius orbis cultae semina, amygdalarum magnitudine, ovato-oblonga, compressa, sub integumento fragili nucleum includentia furvum, in fragmenta dilabentem. Odor aromaticus debilis, sapor gratus, modice amarus, subadstringens.

Semina Cacao Caraceas dicta, reliquis plerumque majora, turgida et admodum pingua optima censentur.

673. Semen Cardamomi minoris.

Alpiniae Cardamomi Roxb. plantae indicae ex ordine *Zingiberacearum*, semina intra capsulas semiunciales, obtuse triquetras, pallide griseo-flavas, triloculares, magno numero contenta, angulosa, lineam longa, rugosa, extus fusca, intus alba, odoris grate aromatici, saporis fervidi.

674. Semen Carvi.

Cari Carvi Linn. plantae *Umbelliferae*, in pratis imprimis montanis crescentis et frequenter cultae diachenia, duas circiter lineas longa, a latere compressa, subcurvata, fusca, mericarpiis quinque-costatis, costis aequalibus, filiformibus, lateralibus marginantibus, vittis inter costas solitariis. Odor aromaticus, sapor cum quadam amaritie condimentarius.

675. Semen Cinae.**Semen Santonici. Semen Contra.**

Artemisiae Contra Vahl. et *Artemisiae Vahlinae* Kostel. plantarum *Compositarum* in Oriente crescentium, capitula florum ante anthesim collecta, nomine seminum Cinae Halepensis s. Alexandrinorum venalia, oblongo-ovata, vix lineam longa, e flavo-viridia, glabra, subresinoso-nitentia, odoris gravis peculiaris, saporis aromatici ingrati, amari.

676. Semen Cinae conditum.

Semina Cinac electa saccharo condita, ex officinis cupediariorum petantur.

†677. Semen Colchici.

Colchici autumnalis Linn. plantae nostratis ex ordine *Melanthacearum*, semina matura, subrotundo-angulata, milii grano vix majora, fusco-nigricantia, areolato-rugosa, dura, hilo basilari deraso. Odor nullus, sapor admodum amarus, insigniter acris.

678. Semen Coriandri.

Coriandri sativi Linn. plantae *Umbelliferae* Europae australis, apud nos cultae, diachenia globosa, parva, pallide ochroleuca, mericarpiis arcte connatis, novem-costatis, costis quinque depressis flexuosis, quatuor magis prominentibus carinatis, vittis inter costas nullis, in commissura geminis.

Odor recentium ingratus, cimicinus, siccatorum aromaticus.

†679. Semen Crotonis Tiglii.**Grana Tiglii.**

Tiglii officinalis Klotzsch. (*Crotonis Tiglii* Linn.) fruticis *Euphorbiacei* in Asia tropica crescentis, semina ovalia, fabae minoris magnitudine, hinc linea prominula percursa et caruncula umbilicali notata, integumento fragili, sordide cinereo-fusco, maculato-nebuloso, nucleo albo vel flavescente, oleoso, plerumque cum capsulae tricoccae reliquiis mixta.

Odor nullus, sapor acerrimus.

680. Semen Cydoniorum.

Cydoniae vulgaris Pers. (*Pyri Cydoniae* Linn.) arboris *Pomaceae*, passim in hortis satae semina ovata, acutiuscula, dorso convexa, facie plana, subtriquetra, integumenti cartilaginei, fuscii, opaci, strato extimo e cellulis composito mucum copiosum includentibus, quae humore hausto turgescunt et mox diruptae mucilaginem copiosam emittunt.

681. **Semen Foeniculi vulgaris.**

Foeniculi vulgaris Gaertn. (*Anethi Foeniculi* Linn.) plantae *Umbelliferae* Europae meridionalis, apud nos in hortis satae diachenia subtereti-oblonga, virideseenti-fusea, glabra, mericarpiis quinque-costatis, valleculis inter costas solitariis, in commissura geminis.

Odor et sapor aromaticus, juncta duleedine.

682. **Semen Foeniculi romani.**

Foeniculi dulcis DC. plantae *Umbelliferae* in Europa australi cultae diachenia, Foeniculo vulgari dimidio vel duplo majora, pallidiora, minus aromatica, duleedine praevalente.

683. **Semen Foeni graeci.**

Trigonellae Foeni graeci Linn. plantae *Papilionaceae* in Europa australi indigenae semina oblonga, subrhombico-tetragona, utrinque sulco obliquo exarata flavo-fusco, punctato-granulata, odoris gravis, saporis mucilaginosi, nauseoso-subaromatici.

† 684. **Semen Hyoscyami.**

Hyoscyami nigri Linn. plantae *Solanaceae*, ruderalis, semina e capsulis opereculatis collecta, minima, orbiculari-subreniformia, compressa, reticulato-rugosa, cinereo- v. ochroleuco-fusea.

Odor nullus, sapor amarus, cum quadam acrimonia.

Nonnisi bene matura, opereculo capsulae ad tactum secedente legantur.

685. **Semen Lini.**

Lini usitatissimi Linn. plantae sui ordinis, vulgaris notitiae, semina ovato-oblonga, compressa, basi obtusiuscula, apice acuminata, sesquilineam circiter longa, integumento fusco, nitido, nucleo albedo, oleoso.

686. Semen Lycopodii.

Lycopodii clavati Linn. plantae sui ordinis, in sylvis montanis elatioribus crescentis sporae minutissimae, e spicis fructiferis in furno siccatis excussae et per cribrum trajectae. Pulverem sistunt farinosum, tenerrimum, pallide flavum, tactu modice pingues digitis adhaerent, aquae innatant nec facile miscentur, flammis injectae celerrime cum strepitu fulminis instar sine fumo deflagrant.

Odor et sapor nullus.

687. Semen Melonum.

Cucumis Melonis Linn. plantae *Cucurbitaceae*, inter hortenses notissimae, semina obovato-oblonga, compressa, sub integumento flavo, duriusculo nucleum album, oleosum continentia.

688. Semen Papaveris albi.

Papaveris somniferi Linn. variet. cultura ortae, *Papaveraceae*, semina minuta, reniformia, albida, integumento reticulato-venoso, inodora, saporis mitis, oleosi, dulciusculi.

689. Semen Peponum.

Cucurbitae Peponis Linn. plantae *Cucurbitaceae*, in agris cultae semina obovata, compressa, hinc truncata, margine tumido cineta, sub integumento coriaceo, albido, nucleum oleosum continentia.

690. Semen Phellandrii aquatici.

Phellandrii aquatici Linn. plantae *Umbelliferae*, in paludosis Europae crescentis diachenia ovato-oblonga, sursum attenuata, calyce stilisque coronata, subfusca, mericarpis obtuse quinquecostatis, costis lateralibus marginantibus, vittis in valleculis solitariis, in commissura subconcava geminis, curvatis, saturatius coloratis. Odor peculiaris, gravis, sapor aromaticus, acris.

691. Semen Ricini.

Ricini communis Linn. plantae *Euphorbiaceae* in Asia calidiore spontaneae, passim hortis satae semina subovata, cinereo-fusco-variegata, glaberrima, nitida, integumento fragili, caruncula prope basim lateralia, rhaphe longitudinali, nucleo embryonem centalem gerente albido, oleoso. Odor nullus, sapor primum mitis, oleosus, deinde aeris.

Annosa vel a vermibus exesa rejice.

† 692. Semen Sabadillae.

Schoenocauli officinalis A. Gray, plantae *McLanthaceae* in Andibus Mexicanis crescentis capsulae ternatae, facile secedentes, oblongae, acutae, griseo-flavescentes, seminibus duas lineas longis, subteretibus, curvatis, hinc acutis, rugosis, nigro-fuscis. Odor nullus, sapor acerrimus.

693. Semen Sinapis.

Sinapis nigrae Linn. plantae *Cruciferae*, inter indigenas notissimae, etiam cultae, semina exigua, subglobosa, fusco-ferruginea, minutim rugosa et reticulato-venosa, intus flava, trititando pulverem viridescentem praebentia.

Humectata auram explicant volatilem, acerrimam; sapor acerrimus, pungens.

† 694. Semen Stramonii.

Daturae Stramonii Linn. plantae *Solanaceae* nostratis, in rudere crescentis, semina e capsula matura, ovata, aculeata, apice quadri-fariam hiantem collecta, compressa, reniformia, lentis minoris magnitudine, integumento fusco-nigro, opaco, duro, reticulatim venoso et minutim tuberculato, nucleo albo, oleoso. Tritorum odor nauseosus, sapor amarus, juncta quadam acrimonia.

695. Serum lactis aluminatum.

Paretur ut Serum lactis commune, loco Aëti vel Acidi tartarici

Aluminis crudi pulverati

drachmam unam

adhibendo, et filtretur omnis Magnesia carbonica.

696. Serum lactis commune.

R. Lactis vaccini recentis *libras duas.*

Ebulliant, sub initio ebullitionis adde:

Aceti crudi *drachmas duas.*

Coagulatione peracta liquorem semirefrigeratum cola et cum

Ovi gallinacei albumine

in spumam conquassato mixtum iterum coque, et colato adde:

Magnesiae carbonicae *q. s.*

ad neutralisationem Acidi, et deinde Serum refrigeratum per chartam bibulam filtra.

Loco Aceti crudi adhiberi potest:

Acidi tartarici *scrupulus unus.*

Si Serum lactis acidum requiritur,

Magnesia carbonica ommissa

filtretur.

697. Serum lactis tamarindinatum.

Paretur ut Serum lactis commune, loco Acidi tartarici vel Aceti adhibendo:

Pulpaе Tamarindorum *unciam unam,*

et filtretur ommissa Magnesia carbonica.

698. Siliqua duleis.

Ceratoniae Siliquae Linn. arboris *Caesalpinieae* in Europa australi crescentis legumina compressa, rigide coriacea, badia, suturis marginalibus tumidis, transversim pluri-locularia, pulpam subfuscā, dulcem, et semina compressa, splendentia, durissima, includentia.

† 699. Solutio arsenicalis Fowleri.

R. Arsenici albi

Kali carbonici puri *aa grana sexaginta quatuor.*

Sedulo tritis et commixtis adde:

Aquae destillatae *uncias octo,*

coque in cucurbita, usque dum Arsenicum perfecte solutum fuerit.

Solutioni refrigeratae et filtratae adde:

Spiritus Angelicae compositi *unciam dimidiam,*

Aquae destillatae *q. s.*

ut pondus totius liquoris sit *unciarum duodecim.*

Drachma una et dimidia solutionis continent granum unum
Arsenici albi.

Cautissime serva.

700. **Species Althaeae.**

R_y. Herbae Althaeae *libras duas,*

Radice „ *libram unam,*

„ **Liquiritiae** *libram semis,*

Florum Malvae *uncias duas.*

Concisas et commixtas serva.

701. **Species amaricantes.**

R_y. Herbae Absinthii

„ **Centaurei minoris floridae**

Corticum Aurantiorum *aa unciis quatuor.*

Foliorum Trifolii fibrini

„ **Cardui benedicti**

Radice Calami aromatici

„ **Gentianae** *aa uncias duas,*

Corticis Cassiae Cinnamomeae *unciam dimidiam.*

Concisa et contusae misceantur.

702. **Species aromaticae.**

Species resolventes.

R_y. Herbae Ilyssopi

„ **Marrubii**

„ **Origani**

„ **Rutae**

„ **Satureiae**

„ **Scordii**

Foliorum Salviae

„ **Menthae crispae**

Florum Lavandulae *aa uncias duas.*

Concisas misce.

703. Species aromaticae pro cataplasmate.

R̄. Specierum aromaticarum *q. v.*

Redige in pulverem grossum.

704. Species emollientes.

R̄. Foliorum Althaeae

„ **Malvae**

Herbae Meliloti floridae

Seminum Lini

aa libram unam,

libras duas.

Concisa et contusa misce.

705. Species emollientes pro cataplasmate.

R̄. Specierum emollientium *q. v.*

Contunde in pulverem grossiusculum.

706. Species laxantes St. Germain.

R̄. Foliorum Sennae sine resina

minutim concisorum

unciam unam,

Florum Sambuci

drachmas quinque,

Seminum Foeniculi romani

drachmas duas et dimidiam,

Kali tartarici acidi depur. pulv.

drachmam unam et dimid.

Concisa et contusa bene misce.

707. Species Lignorum.

Species ad decoctum Lignorum.

R̄. Radicis Bardanae

„ **Sarsaparillae**

aa libram semis,

„ **Liquiritiae**

Ligni Santali rubri

aa uncias tres,

„ **Juniperi**

„ **Gnajaci**

„ **Sassafras**

aa libram unam.

Concisa misceantur.

708. Species pectorales.**Species ad infusum pectorale.****R̄. Foliorum Hepaticae**„ **Pulmonariae**„ **Scabiosae****Radicis Liquiritiae**„ **Althaeae****Hordei perlati****Siliquarum dulcium****Caricarum***aa libras tres,***Florum Verbasci**„ **Malvae***aa uncias tres,***Fructuum Anisi stellati***unciam unam.*

Concisae et contusae misceantur.

709. Spiritus Aetheris.**Liquor anodynus mineralis Hoffmanni. Spiritus Aetheris sulfurici.****R̄. Aetheris depurati***uncias tres,***Spiritus vini rectificatissimi***uncias novem.*

Misce et in lagena bene clausa serva.

Sit liquor limpidus, decolor, gravitatis specif. 0,820, ab inquinamentis Aetheris et Spiritus vini immunis.

710. Spiritus Aetheris chlorati.**Spiritus Salis dulcis.****R̄. Natrii chlorati***uncias octo,***Mangani hyperoxydati***uncias tres,*

commixtis et in retortam immissis adde mixturam ex :

Acidi sulfurici concentrati*unciis sex,***Spiritus vini rectificatissimi***unciis viginti quatuor.*

Fiat in excipulum refrigeratum leni igne destillatio :

unciarum octodecim.

Liquor obtentus addita ad neutralisationem

Natri carbonici crystallisati *suffic. quantitate*
rectificetur et in vitris bene clausis servetur.

Sit liquor decolor, odoris peculiaris aetherei, saporis similis aromatici, gravitatis specificae 0,830—0,840, reactionis neutrius.

711. **Spiritus Aetheris nitrici.**

Spiritus Nitri dulcis.

Rx. Spiritus vini rectificatissimi *libram unam,*
Acidi nitrici concentrati *uncias tres.*

Immissis in eucurbitam, apparatu refrigeratorio adaptato, fiat leni calore destillatio *unciarum decem.*

Liquor obtentus addita ad neutralisationem solutione diluta

Natri carbonici crystallisati *s. q.*

stet per aliquot dies, saepius agitando, et denuo blanda destillatione rectificatus in lagenulis minoris voluminis, bene repletis et optime clausis, loco frigido servetur.

Sit limpidus, decolor, flavescens, odoris grate aetherei, saporis aetherei, dulciuseuli, ab aedid, quantum fieri potest, liber, grav. specif. 0,830.

712. **Spiritus Angelicae compositus.**

Rx. Radicis Angelicae *libram unam,*

„ **Valerianae**

Baccarum Juniperi maturarum *aa uncias tres,*

concisis et contusis atque in vesicam destillatoriam immissis adde:

Spiritus vini rectificati *libras sex,*

Aquae communis *libras tres.*

Post macerationem per viginti quatuor horas fiat destillatio, donec prodierint *librae sex,*

in quibus solve

Camphorae *unciam unam et dimidiam,*

et filtra.

713. Spiritus Anisi.

<i>R̄.</i> Seminum Anisi contusorum	<i>libram unam,</i>
Spiritus vini rectificati diluti	<i>libras sex et dimidiam,</i>
Aquae fontanae	<i>libras sex.</i>
Macera per duodecim horas et abstrahere <i>libras sex.</i>	

714. Spiritus aromaticus.**Spiritus Carmelitarum. Spiritus Melissae compositus.**

<i>R̄.</i> Foliorum Melissae	<i>libram unam et dimidiam,</i>
Flavedinis corticem Citri recent.	<i>uncias quatuor.</i>
Seminum Coriandri	<i>uncias octo,</i>
” Cardamomi minoris	
Nucis moschatae	
Corticis Cassiae Cinnamomeae	<i>āā uncias duas,</i>
Radiceis Angelicae	<i>unciam unam,</i>
concisas et contusas infunde cum:	
Spiritus vini rectificati	<i>libris sex,</i>
Aquae fontanae	<i>libris octo.</i>
Macera per duodecim horas et abstrahere <i>libras sex.</i>	

715. Spiritus Carvi.

E seminibus Carvi paretur, ut spiritus Anisi.

716. Spiritus Cochleariae.

<i>R̄.</i> Foliorum Cochleariae recentium	<i>libram unam,</i>
Spiritus vini rectificati diluti	
Aquae fontanae	<i>āā libras duas.</i>
Abstrahere	<i>libras duas.</i>

717. Spiritus camphoratus.**Spiritus vini camphoratus.**

<i>R̄.</i> Camphorae	<i>uncias duas,</i>
Spiritus vini rectific. diluti	<i>libram unam.</i>

Stent in loco frigido saepius agitando, donec Camphora soluta sit, deinde filtra et in lagena bene clausa serva.

718. Spiritus Ferri chlorati aethereus.

Tinctura nervino-tonica Bestuscheffii. Spiritus Aetheris ferrati. Liquor anodynus martiatus.

R̄. Ferri sesquichlorati crystallisati *unciam unam,*
 Spiritus Aetheris *libram unam.*

Misce conquassando in lagena vitrea, bene clausa, stet per aliquot dies, dein liquorem limpido a sedimento separa et in lagena epistomio vitreo obturata serva.

Sit limpidus, coloris aurei, subflavescentis, odoris aetherei, saporis styptici ferrosi simulque aetherei.

719. Spiritus Formicarum.

R̄. Formicarum rufarum viventium *libram unam,*
 Spiritus vini rectificati diluti
 Aquae fontanae *aa libras duas.*
 Digere per aliquot dies, dein abstrahere *libras duas.*

720. Spiritus Juniperi.

E baccis Juniperi maturis paretur, ut spiritus Anisi.

721. Spiritus Lavandulae.

R̄. Florum Lavandulae siccatorum *libram unam,*
 Spiritus vini rectificati *libras quatuor et dimid.*
 Aquae fontanae *libras sex.*
 Macera per duodecim horas et abstrahere *libras quatuor.*

722. Spiritus Menthae crispae.

E foliis Menthae crispae paretur, ut spiritus Lavandulae.

723. Spiritus Rosmarini.

E foliis Rosmarini paretur, ut spiritus Lavandulae.

724. Spiritus salis Ammoniaci anisatus.**Liquor Ammonii caustici anisatus.**

R_x. Spiritus vini rectificatissimi *uncias tres,*
 Olei Anisi *drachmam unam.*
 Solutis adde:
 Ammoniac purae liquidae *drachmas sex.*
 Serva in vase vitreo bene clauso.

725. Spiritus salis Ammoniaci lavandulatus.**Liquor Ammonii caustici lavandulatus.**

Cum oleo Lavandulae para, ut spiritum salis Ammoniaci anisatum.

726. Spiritus saponatus.

R_x. Saponis veneti *uncias tres,*
 Spiritus vini rectificati diluti *libram unam et dimid.*
 Aquae Lavandulae *libram dimidium.*
 Digere et filtratum serva.

727. Spiritus Serpylli.

Ex herba Serpylli florida paretur, ut spiritus Lavandulae.

728. Spiritus Vini rectificatissimus.

Præparatum officinarum propriarum.

Sit aquae instar limpidus, decolor, odoris et saporis mere spirituosus, ab omni iniquatione Fermentolei liber.

Contineat in temperatura 15° C. (+ 12° R.) in 100 partibus voluminis 90 partes Alcoholis anhydri

Pondus specificum = 0,8336.

729. Spiritus Vini rectificatus.

R_x. Spiritus Vini rectificatissimi temperaturae 15° C. *100 volumina,*

misce cum

Aquae destillatae ejusd. temperatur. *13,81 voluminibus;*

vel

Ejusdem Spiritus *100 pondera*

cum

Aquae destillatae *16,54 ponderibus.*

Continet in 100 partibus voluminis 80 partes Alcoholis anhydri.

Pondus specificum = 0,8636.

730. **Spiritus Vini rectificatus dilutus.**

**R̄. Spiritus vini rectificatissimi tempera-
turae 15° C.**

100 volumina,

misce cum

Aquae destillatae ejusd. temperatur. *53,64 voluminibus;*

vel

Ejusdem Spiritus *100 pondera*

cum

Aquae destillatae *64,29 ponderibus.*

Continet in 100 partibus voluminis 60 partes Alcoholis anhydri.

Pondus specificum = 0,9131.

731. **Spongia marina.**

Spongiae officinalis Linn. polyporium elasticum, notissimum, porosissimum, liquores sorbens, a concrementis lapideis, quae insunt, ante usum mundandum. Duae praeprimis in commercio sunt varietates: altera tenerior, pallidior, poris minutissimis pervia, vulgo Badeschwamm dicta; altera colore obscuriore et poris majoribus insignis, sub nomine spongiae strumalis (Kropfschwamm) nota.

732. **Spongia pressa.**

Spongia praeparata.

R̄. Spongas marinas tenues,

coctione in

Aqua fontana mundatas,

et adhuc humidas prelo fortiter exprime, et perfecte exsiccatas serva.

† 733. **Stibium chloratum solutum.**

Butyrum Antimonii. Murias Stibii solutus. Causticum antimoniale.

R. Stibii sulfurati nigri pulverati *libram unam,*

Acidi hydrochlorici concentr. crudi *libras quatuor,*

sub divo calefiant in cucurbita vitrea, donec omnis gasis evolutio cessaverit.

Solutio decantata evaporetur sub divo ad gravitatem spec. 1,34—1,35.

Sit liquor limpidus, decolor vel parum flavescens, et aqua dilutus sedimentum copiosum album crystallinum demittat.

† 734. **Stibium oxydatum.**

Antimonium oxydatum. Oxydum Stibii.

R. Stibii sulfurati nigri in pulverem triti *libram unam,*

Acidi hydrochlorici conc. crudi *libras quatuor.*

Sub dio calefac in cucurbita, donec omnis gasis evolutio cessaverit, et solutionem filtratam evapora ad *libram unam c. dimid.*

Residuum sub continua agitatione effunde in vas, continens

Aquae fontanae *libras triginta,*

vel quantum sufficit, ut liquor supernatans addita nova aquae quantitate non amplius turbetur.

Liquore defuso praecipitatum tamdiu aqua eluatur, donec omnis reactio acida cessaverit.

Praecipitatum collectum deinde digere per bihorium cum:

Natri carbonici crystallisati *unciis duabus,*

soluti in

Aquae destillatae *s. q.*

ae tandem cum

Aqua destillata

perfecte elue. Praecipitatum in linteum collectum et expressum leni calore sicca.

Sit pulvis albus, ab Arsenico plane liber, in igne fortiore plane avo-lans, in acido hydrochlorico facile et ex toto solubilis.

† 735. **Stibium sulfuratum aurantiacum.**

Sulfur auratum Antimonii. Oxydum Stibii hydrosulfuratum aurantiacum.

R. Natri carbonici crystallisati *libras quatuor et dimid.*
 in lebetem ferreum immissas solve in
Aquae fontanae fervidae *libris viginti.*
 Tunc adde pultem paratam e
Calcariae causticae *libra una,*
Aquae fontanae *libris sex,*
 et coque per horam dimidiam, deinde adde:
Sulfuris depurati *libram dimidiam,*
Stibii sulfurati nigri subtilissime pul-
verati *libram unam et dimid.*

et coque per horam, aquam evaporatam restituendo.

Lebes obtectus seponatur, donec sedimentum fundum petat, tum liquor limpidus syphone vitreo abstrahatur et evaporando in crystallos redigatur.

Crystalli opalescentes, e flavo albidae aqua abluantur. Deinde

Crystallorum *unciae decem*
 solvantur in

Aquae destillatae *libris quinque,*
 et seorsim parctur mixtura ex:

Acidi sulfurici concentrati puri *unciis tribus,*
 et

Aquae destillatae *libris decem,*
 quae frige facta cum solutione crystallorum bene agitando misceatur.

Præcipitatum aurantiacum sedimentando et abluendo bene edulcoratum leni calore siccatur, in vitro luci impervio et bene clauso serva.

Sit pulvis subtilissimus, rubro-aurantiacus, valde depingens, insipidus, in Kali caustico omnino, et in acido hydrochlorico relicto Sulfure solubilis.

736. **Stibium sulfuratum nigrum.**

Antimonium crudum.

Praeparatum officinarum metallurgicarum in Roscnau Hungariae.

Sistit massas conico-truncatas, coloris nigro-grisei, e crystallis

aeicularibus radiatim dispositis, metallice splendentibus, friabilibus constantes, in aëre immutabiles, in acido hydrochlorico perfecte solubiles, leni igne liquecentes.

Ne sit Arsenieo inquinatum.

† 737. **Stibium sulfuratum rubrum.**

Kermes minerale. Oxydulum Stibii hydrosulfuratum rubrum. Pulvis Carthusianorum.

R̄. Natri carbonici crystallisati *libras duas,*
solve in lebetes ferreo in

Aquae destillatae fervidae *libris viginti.*

Solutioni igni impositae admisce:

Stibii sulfurati nigri alcoholisati *unciam unam,*

eoque per mediam horam saepius agitando, dein fervidus liquor filtretur per chartam emporeticam albam in vas aquam destillatam calefactam continens, ut sensim refrigescat. Praecipitatum ex inde ortum cum aqua destillata cocta et refrigerata ablue, inter chartam bibulam preme, in loco umbroso ac tepido sicea et in vase bene clauso luei impervio serva.

Sit pulvis subtilis, laevis, eleganter rubro-fuscus, microscopio aspectus velutini, inodorus, insipidus.

738. **Stipites Dulcamarae.**

Solani Dulcamarae Linn. *Solanaceae*, fruticis scandentis, in humidis passim crescentis, caules tenaces, calami scriptorii ad minimum crassitie, longitudinaliter rugosi, epidermide flavescenti-grisea, recentes odoris ingrati, siccatione fere inodori, saporis primum amari, deinde dulciusculi, cum aliqua aerimonia. Colligantur sero autumno et remotis omnibus partibus viridibus siccantur.

739. **Strobili Lupuli.**

Humuli Lupuli Linn. suffruticis dioici scandentis e *Cannabinearum* ordine, apud nos sponte crescentis et culti amenta fructifera, subrotunda, composita e squamis membranaceis laxè imbricatis, venoso-

nervosis, basi extus glandulis pallide aurantiacis, farinosis, deciduis (Lupulina) consitis, intus excavatis, nuculas monospermas foventibus. Odor, imprimis recentium, aromaticus, gravis, sapor amarus.

Strobili excussis glandulis farinosis nihil valent.

† 740. **Strychninum.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Crystallos sistit prismaticas, inodoras, amarissimas, in aqua frigida et fervida vix, in acidis facile solubiles, salia exhibentes saporis amarissimi. Strychninum ipsum in spiritu vini rectificato, vix autem in spiritu vini rectificatissimo aut in Aethere solvitur. Brucino inquinatum, cum acido nitrico concentrato calefactum, colorem rubrum induit.

† 741. **Strychninum nitricum.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Crystalli aciculares, sericcae, coloris et odoris expertes, saporis amarissimi, in aqua fervida facile, in spiritu vini difficulter, in Aethere minime solubiles.

742. **Styrax Calamita.**

Storax solidus.

Massa artefacta ex Oriente advecta, variae magnitudinis, rubro-fusca, friabilis ex ligni scobe cum Styraee liquido aliisque resinis balsamicis impraegnata, odoris fortis, balsamici styracini.

743. **Styrax liquidus.**

Storax liquidus.

Balsamum e cortice trunci *Styracis officinalis* Linn. *Styraccae* obtentum; Terebinthinae consistentia, opacum, obscure cinereum, vel cinerascens-fuscum vel nigricans, odoris grate balsamici, styracini, saporis fervide aromatici.

744. **Succinum.**

Resina fossilis arborum primaevarum generis Pini, praeprimis *Pinitis succiniferi* Goëpp. *Coniferue*, carboni candenti injecta odorem spargit proprium, grate aromaticum, destillatione sicea sublimatum acidi succinici et oleum Succini praebens.

745. **Succus Liquiritiae.**

Extractum venale, e radice recenti *Glycyrrhizae glabrae* Linn. in Europa australi coctione atque evaporatione paratum, prostat in baculis cylindricis fusco-nigris, flexione cito fragilibus, in fractura nitentibus, odoris proprii, dulciusculi, saporis dulcis, irritantis.

Succus Liquiritiae venalis substantiis heterogeneis, imo nocivis, imprimis Cupro inquinatus esse solet, ideo ante usum semper a pharmacopola purgandus est. (Vide Extr. Liquir. siccum.)

746. **Sulfur citrinum.****Sulfur venale.**

Ne sit Arsenico sulfurato inquinatum.

747. **Sulfur praecipitatum.****Lac Sulfuris. Magisterium Sulfuris.**

R̄. Calcariae causticae	<i>libram unam,</i>
in lebetæ ferreo cum	
Aquae communis	<i>libris sex</i>
in massam puliformem redactæ adde:	
Sulfuris citrini pulv.	<i>libras duas,</i>
Aquae communis	<i>libras viginti quatuor.</i>
Mixta sub continua agitatione et aquam evaporatam restituendo	
coquantur per horam, dein filtrentur.	
Residuum eoque cum	
Aquae communis	<i>libris quindecim</i>
per dimidiam horam et cola.	

Residuum cum aqua fervida bene ablue. Liquores obtentos sepone per aliquot dies in lagenis bene obturatis.

Limpidum abstrahe et cum aqua communi dilue, ut sit ponderis
librarum quadraginta.

Tum adde miscelam ex

Acidi hydrochlorici conc. puri *libris tribus*

et

Aquae communis *libris sex.*

Praecipitatum inde natum collige et cum aqua communi bene abluetum in miscelam ex

Acidi hydrochlorici conc. puri *unciis quatuor*

et

Aquae communis *libris quatuor*

inijce. Stet per aliquot dies interdum agitando. Praecipitatum ortum cum aqua communi bene lotum in loco tepido sicca et in pulverem subtilissimum redactum serva in vitro bene clauso.

Sit pulvis griseo-aut flavescenti-albus, subtilissimus, in aqua insolubilis, igne penitus avolans.

748. **Sulfur sublimatum crudum.**

Flores Sulfuris venales.

Pulvis citrinus, subtilissimus, Sulfuris crudi sublimatione in officinis propriis obtentus, acido sulfurico adhaerente acidulus.

Ne sit Arsenico inquinatum.

749. **Sulfur sublimatum lotum.**

Sulfur depuratum. Flores Sulfuris loti.

R̄. Sulfuris sublimati crudi *q. v.*

Eluc cum

Aqua destillata

tamdiu, donec ab acido sulfurico adhaerente perfecte sit mundatum, denique collige in manica lintea vel in linteo expanso et in prelo fortiter exprime, optime sicca, per cribrum trajice, et in vase bene obturato serva.

Sit pulvis subtilis, siccissimus, acidi plane expers.

750. Suppositoria e butyro Cacao.**R̄. Butyri Cacao***q. v.*

Formentur lege artis suppositoria.

751. Syrupus Acetositis Citri.**Syrupus Citri.****R̄. Succī fructuum Citri recentium expressi****sedimentatione et filtratione depurati***uncias decem,***Sacchari albi***uncias sedecim.*

Unica ebullitione coque in syrupum.

752. Syrupus Althaeae.**R̄. Radicis Althaeae concisae***unciam unam,***Aquae communis frigidae***uncias octodecim.*Macerā per bīhorium, saepius agitando, tunc cola sine expressione
et in colatura*unciarum quindecim*

solve:

Sacchari albi*libras duas*

unica ebullitione.

753. Syrupus amygdalinus.**Syrupus emulsivus.****R̄. Amygdalarum dulcium decorticatarum***uncias duas,***Amygdalarum amararum decortica-
tarum***unciam dimidiam.*

In mortarium aheneum altum immissas eum

Sacchari albi pulverati*unciis tribus*contunde in pulvem aequabilem, tum sensim inter assiduam triturationem
admisce:**Aquae communis***uncias quinque,*

ut fiat emulsio concentratissima.

Colaturae per pannum laneum expressae adde:

Sacchari albi pulverati*uncias quinque,*

et sub continua agitatione fiat syrupus.

754. Syrupus Aurantiorum corticum.

R̄. Flavedinis corticum Aurantiorum	<i>uncias tres,</i>
Spiritus vini rectificati diluti	<i>uncias tres,</i>
Aquae communis	<i>libras duas.</i>
Digere per nythemmerum in vase clauso.	
Colatura expressa	<i>unciarum viginti</i>
cum	
Sacchari albi	<i>libris tribus</i>
unica ebullitione coquatur in syrupum, cui refrigerato admisce:	
Tincturae Aurantiorum corticum	<i>uncias tres.</i>

755. Syrupus Capillorum Veneris.

R̄. Herbae Adianti concisae	<i>unciam unam et dimidiam,</i>
Aquae communis fervidae	<i>libram unam et dimidiam,</i>
infunde per horam.	
Colaturam	<i>unciarum quindecim</i>
coque cum	
Sacchari albi	<i>libris duabus,</i>
clarificando in syrupum, cui admisce:	
Aquae florum Aurantii	<i>drachmas duas.</i>

756. Syrupus Chamomillae.

R̄. Florum Chamomillae	<i>uncias duas,</i>
Aquae communis fervidae	<i>uncias sedecim.</i>
Infunde per horam, et in colatura expressa solve:	
Sacchari albi	<i>uncias sedecim.</i>
Clarificatione fiat syrupus.	

757. Syrupus Cichorei cum Rheo.

R̄. Foliorum Cichorei	
Radiceis Cichorei	<i>āā unciā unā,</i>
„ Rhei	<i>uncias quatuor,</i>
Kali carbonici puri	<i>drachmam dimidiam,</i>
Aquae communis fervidae	<i>libras quinque.</i>

Stent in infusione per horam.
 Colaturae fortiter expressae *librarum quatuor*
 adde
Sacchari albi *libras sex.*
 Clarificando coque in syrupum.

758. **Syrupus Cinnamomi.**

R̄. Corticis Cassiae Cinnamomeae ruditer
tusi *uncias quinque,*
Aquae Cinnamomi spirituosae *libras duas,*
 digere in vase clauso per viginti quatuor horas et in
 colatura expressa *unciarum viginti*
 solve :
Sacchari albi *uncias triginta et duas.*
 Unica ebullitione coque in syrupum.

+759. **Syrupus Diacodii.**

Syrupus Papaveris albi.

R̄. Caputum Papaveris contusorum *uncias duas,*
Radicis Liquiritiae *unciam unam,*
Aquae communis fervidae *libram unam et dimid.*
 Stent per duas horas; in colatura solve :
Sacchari albi *uncias sedecim,*
 clarificando coque in syrupum.

760. **Syrupus Ferri Jodati.**

R̄. Jodi *drachmas tres,*
Ferri pulverati *drachmam unam.*
Aquae destillatae *unciam unam.*
 Immitte in lagenam vitream satis capacem et continua agitatione
 solve.
 Solutionem dilute viridem filtra et filtrum elue cum
Aquae destillatae *uncia dimidia.*

Liquori filtrato adde:
Sacchari albi *uncias duas,*
 et solve leni calore. Pondus syrupi sit *drachmarum triginta.*
 Syrupi drachma una continet septem grana circiter Ferri jodati.
 Ex tempore parandus.

761. **Syrupus Foeniculi.**

R̄. Seminum Foeniculi contusorum *uncias duas,*
Aquae fervidae *libram unam.*
 Infunde per horam.
 Colaturae *unciarum octo*
 adde
Sacchari albi *libram unam.*
 Solve et clarificando coque in syrupum.

762. **Syrupus kermesinus.**

R̄. Pulveris Coccionellae *unciam dimidiam,*
Kali carbonici puri *grana duodecim,*
Aquae Cinnamomi simplicis
 „ **Melissae**
 „ **Rosarum** *aa uncias sex.*
 Macera per horam. Colatura cum
Sacchari albi *libris duabus,*
 addendo sub unica ebullitione
Aluminis crudi pulverati *grana quatuor,*
 coquatur in syrupum.

763. **Syrupus mannatus.**

Syrupus Sennae cum Manna.

R̄. Foliorum Sennae Alexandrinae *uncias quatuor,*
Fructuum Anisi stellati *drachmas duas,*
Aquae communis fervidae *libras quatuor.*
 Infunde per bihorium et in liquore expresso et colato solve:
Sacchari albi *libras quatuor,*
Mannae cannelatae *libram unam.*
 Clarificando coque in syrupum.

764. Syrupus Menthae.

R̄. Foliorum Menthae crispae	<i>uncias duas.</i>
Infunde per horam cum	
Aquae communis fervidae	<i>unciis sedecim.</i>
Colatura	<i>unciarum decem,</i>
cum	
Sacchari albi	<i>unciis sedecim,</i>
clarificando coquatur in syrupum.	

765. Syrupus Mororum.

R̄. Baccarum Mori	<i>libras quindecim,</i>
conquassatis adde	
Sacchari albi	<i>libram unam.</i>
Stent per aliquot dies, donec fermentatio vinosa peracta sit, deinde	
exprime per sacculum linteum, et	
Succi subsidendo depurati	<i>uncias decem</i>
coque cum	
Sacchari albi	<i>unciis sedecim</i>
unica ebullitione in syrupum.	

766. Syrupus Papaveris Rhoeados.**Syrupus Rhoeados.**

R̄. Florum Papaveris Rhoeados recentium	<i>libram unam,</i>
Aquae communis fervidae	<i>libras duas.</i>
Stent per duas horas.	
Colaturam	<i>unciarum viginti,</i>
cum	
Sacchari albi	<i>libris tribus,</i>
unica ebullitione coque in syrupum.	

767. Syrupus Phytolaccae.

Cum baccis Phytolaccae conquassatis paretur ut syrupus Mororum.

768. Syrupus Pomorum acidulorum.

Cum Pomis acidulis conquassatis paretur ut syrupus Mororum.

769. Syrupus Ribium.

Cum baccis Ribis conquassatis paretur ut syrupus Mororum.

770. Syrupus Rubi Idaei.

Paretur e baccis Rubi Idaei ut syrupus Mororum.

771. Syrupus Sambuci.

Cum baccis Sambuci conquassatis paretur ut syrupus Mororum

772. Syrupus Scillae.

Rx. Aceti Scillae

uncias decem,

Sacchari albi

uncias sedecim.

Coquantur in syrupum.

773. Syrupus simplex.

Syrupus Sacchari.

Rx. Sacchari albi

libras duas,

Aquae communis

uncias quindecim.

Coquendo fiat syrupus.

774. Syrupus Violarum.

Rx. Florum Violarum recentium

libram unam.

Infunde in vase stanneo per duodecim horas cum

Aquae destillatae fervidae

libris duabus.

In colatura expressa solve in lebetæ stanneo blandissimo calore

Sacchari albissimi

libras tres et dimid.

Post refrigerationem in vase vitreo serva.

775. Tabulae de Althaea.

R. Pulveris radiceis Althaeae	<i>unciam unam et semis,</i>
„ radiceis Ireos florentinae	<i>drachmas duas,</i>
„ Sacchari albi	<i>libram unam,</i>
Mucilaginis Tragacanthae	<i>q. s.</i>
ut fiat pasta, quae bene subacta et depsta extendatur in laminam tenuem, quae in tabulas scissa siccetur.	

† 776. Taffetas vesicans.

R. Pulveris Cantharidum	<i>unciam unam et dimid.</i>
Aetheris	<i>uncias quatuor.</i>
Digere per triduum, exprime et in colaturae	<i>unaquaque uncia</i>
solve:	
Mastiches	<i>drachmam dimidiam,</i>
Sandaracae	<i>scrupulos quatuor,</i>
Terebinthinae Venetae	<i>scrupulum unum,</i>
Olei Lavandulae	<i>guttos decem.</i>

Ope penicilli illinatur taffetas 30 pollices longa et 20 pollices lata,
et haec operatio repetatur usque ad perfectam tincturae consumptionem.

777. Terebinthina cocta.**Resina Pini.**

Resina subflava, friabilis, odoris debilis, e destillatione olei Terebinthinae residua.

778. Terebinthina communis.

Balsamum naturale, e truneis vulneratis *Pini sylvestris* Linn. et aliarum
specierum, arborum *Coniferarum*, efluens, spissum, granulosum, albidum
vel ochroleucum, odoris proprii, vehementis, saporis irritantis, amariuseculi.

779. Terebinthina Veneta.**Terebinthina larigna.**

Balsamum e vulnerato truneo *Pini Laricis* Linn. arboris *Coniferae*
effluens, subflavum, pellucidum, odoris amoenius terebinthinacei citreique,
saporis balsamico-amari.

780. Tinctura Absinthii composita.

R̄. Herbae Absinthii	<i>uncias tres,</i>
Flavedinis corticium Aurantiorum	<i>unciam unam,</i>
Radicis Calami aromatici	
„ Gentianae	<i>aa unciam dimidiam,</i>
Corticis Cassiae Cinnamomeae	<i>drachmas duas.</i>
Coneisis et contusis affunde :	
Spiritus vini rectificati diluti	<i>libras tres.</i>

Digere saepius conquassando per dies sex, et tincturam refrigeratam exprime et filtra.

+781. Tinctura Aloës.

R̄. Aloës lucidae contusae	<i>uncias duas,</i>
Spiritus vini rectificati diluti	<i>libram unam.</i>
Digere per aliquot dies saepius agitando, ut Aloë solvatur.	
Servetur tinctura filtrata	<i>unciarum tredecim.</i>

782. Tinctura amara.**Tinctura stomachica.**

R̄. Foliorum Trifolii fibrini	
Herbae Centaurii min. florid.	
Radicis Gentianae	
Flavedinis corticium Aurantiorum	<i>aa unciam unam,</i>
Natri carbonici depurati	<i>unciam semis,</i>
Aquae Cinnamomi spirituosae	<i>libras quatuor et dimidiam.</i>
Digere per triduum, ut tinctura expressa et filtrata sit	
	<i>librarum quatuor.</i>

783. Tinctura Arnicae florum.

R̄. Florum Arnicae concisorum	<i>unciam unam et dimidiam,</i>
Spiritus vini rectificati diluti	<i>libram unam.</i>
Digere per aliquot dies, exprime et filtra, ut sit colatura	
	<i>unciarum decem.</i>

784. Tinctura Arnicae plantae totius.

Tinctura Arnicae.

R. Herbae Arnicae floridae cum
radice recentis concisae *uncias sex,*
 infunde cum
Spiritus vini rectificatissimi *libra una.*
 Stet in vase vitreo bene clauso per triduum. Exprime et filtra.

785. Tinctura aromatica.

R. Radicis Calami aromatici	<i>an unciam unam,</i>
„ Galangae	
Corticum Cassiae Cinnamomeae	
Caryophyllorum	
Nucis Moschatae	<i>an drachmas tres,</i>
Spiritus vini rectificati	<i>libras duas.</i>

Digere per octiduum, ut liquor expressus et filtratus sit ponderis *unciarum viginti et unius.*

786. Tinctura aromatico-acida.

Elixirium Vitrioli Mynsichti.

R^y. Radicis Calami aromatici	<i>āā unciam unam,</i>
„ Galangae	
„ Zingiberis	
Corticum Cassiae Cinnamomeae	
Caryophyllorum	
Nucis Moschatae	<i>āā drachmas tres,</i>
Flavedinis corticum Citri	<i>unciam semis,</i>
Sacchari albi	
Acidi sulfurici diluti	<i>āā uncias tres,</i>
Spirit. vini rectif. diluti	<i>libras duas.</i>
Digere per sex dies. Liqueor expressus et filtratus sit ponderis	
	<i>unciarum viginti septem.</i>

787. Tinctura Asae foetidae.

R̄. Asae foetidae pulveratae *uncias duas,*
Spiritus vini rectificati *libram unam.*
 Digere per tres dies, ut tinctura filtrata sit
unciarum decem.

788. Tinctura Aurantiorum corticum.

R̄. Flavedinis corticum Aurantiorum
concisae *uncias duas,*
Spiritus vini rectificati diluti *libram unam.*
 Digere per triduum. Tinctura expressa et filtrata sit
unciarum decem.

789. Tinctura balsamica.**Balsamum vulnerarium Commendatoris.**

R̄. Aloës
Myrrhae
Olibani *ā unciam semis,*
Styracis liquidi *unciam unam,*
Croci gallici *drachmas duas,*
Balsami peruviani *unciam unam,*
Spiritus vini rectificati *libras tres.*
 Digere per sex dies, ut tinctura filtrata sit
unciarum triginta trium.

† 790. Tinctura Belladonnae.

Paretur ex herba Belladonnae florida siccata ut tinctura Aurantiorum corticum.

791. Tinctura Benzoës.

R̄. Benzoës *uncias duas,*
Spiritus vini rectificati *libras duas.*
 Digere ad perfectam solutionem.
 Tinctura filtrata sit *librarum duarum.*

† 792. **Tinctura Cantharidum.**

R̄. Cantharidum pulveratarum *unciam unam,*
Spiritus vini rectificati diluti *uncias sex.*
 Digere per triduum. Tinctura filtrata sit *unciarum quinque.*

793. **Tinctura Capsici.**

R̄. Fructuum Capsici pulveratorum *unciam unam,*
Spiritus vini rectificatissimi *uncias sex.*
 Digere temperatura ordinaria quotidie agitando per triduum, dein expressam et subsidendo clarificatam decanta ac more solito serva.

794. **Tinctura Castorei.**

R̄. Castorei *unciam unam,*
 contuso et minutim conciso affunde:
Spiritus vini rectificati *uncias sex.*
 Digere per octiduum, saepius agitando.
 Tinctura expressa et filtrata sit *unciarum quinque.*

795. **Tinctura Catechu.**

R̄. Catechu ruditer contusi *uncias tres,*
Spiritus vini rectificati diluti *libram unam.*
 Digere ad perfectam extractionem et filtratam serva.

796. **Tinctura Chamomillae.**

E floribus Chamomillae vulgaris paretur ut tinctura Aurantiorum corticum.

797. **Tinctura Chinae composita.**

Elixirium roborans Whytii.

R̄. Corticis Chinae fuscae pulverat. *uncias tres,*
Radicis Gentianae
Flavedinis corticum Aurantiorum *an unciam unam,*

Spiritus vini rectificati *libram unam et semis,*

Aquae Cinnamomi *libram semis.*

Digere per sex dies, exprime et filtra, ut sit colatura
unciarum viginti.

798. Tinctura Chinae simplex.

R. Corticis Chinae flavae pulverati *uncias duas,*

Spiritus vini rectificati diluti *libram unam.*

Digere per octiduum, saepius conquassando, exprime et filtra.

799. Tinctura Cinnamomi.

E cortice Cassiae Cinnamomeae paretur ut tinctura Aurantiorum corticum.

† 800. Tinctura Colehici seminum.

R. Seminum Colehici contusorum *unciam dimidiam,*

Spiritus vini rectificati diluti *uncias sex.*

Digere per triduum, dein filtra, ut sit colatura
unciarum quinque.

† 801. Tinctura Colocynthidum.

E fructibus Colocynthidis, a seminibus mundatis, paretur ut tinctura Aurantiorum corticum.

802. Tinctura Croci.

Paretur e Croco gallico ut tinctura Aurantiorum corticum.

† 803. Tinctura Digitalis purpureae.

E foliis Digitalis purpureae paretur ut tinctura Aurantiorum corticum.

† 804. Tinctura Euphorbii.

Ex Euphorbio paretur ut tinctura Asae foetidae.

805. **Tinctura Ferri acetici aetherea.**

R̄. Ferri oxydati acetici liquidi	<i>uncias novem,*</i>
Spiritus vini rectificatissimi	<i>uncias duas,</i>
Aetheris acetici	<i>unciam unam.</i>

Misce.

806. **Tinctura Ferri pomati.** **Tinctura Malatis Ferri.**

R̄. Extracti Ferri pomati	<i>uncias duas,</i>
Aquae Cinnamomi vinosae	<i>libram unam.</i>

Solve et filtra.

807. **Tinctura Guajaci.**

E Guajaco ut tinctura Asae foetidae ad pondus *unciarum tredecim.*

† 808. **Tinctura Ipecacuanhae.**

E radice Ipecacuanhae ruditer tusa paretur ut tinctura Aurantiorum corticum.

† 809. **Tinctura Jodi.**

R̄. Jodi	<i>drachmam unam,</i>
Spiritus vini rectificati	<i>uncias duas,</i>

solve terendo in mortario vitreo.

Liquorem limpidum defusum serva in lagena vitrea bene clausa.

810. **Tinctura Lignorum.**

R̄. Ligni Guajaci	
„ Sassafras	
„ Santali rubri	
„ Juniperi	<i>āa unciam unam et dimid.</i>

Concisa et contusa digere in

Spiritus vini rectificati	<i>libris duabus</i>
----------------------------------	----------------------

per octiduum, postea exprime et filtra.

† 811. **Tinctura Lobeliae inflatae.**

R. Herbae Lobeliae inflatae *unciam unam,*
 Spiritus vini rectificati diluti *uncias sex.*
 Digere per triduum, exprime et filtra.

812. **Tinctura Macidis.**

E Macide paretur ut tinctura Capsici.

813. **Tinctura Myrrhae.**

E Myrrha paretur ut tinctura Asae foetidae.

† 814. **Tinctura Nucis vomicae.**

Paretur e Nucibus vomiceis pulveratis ut tinctura Aurantiorum corticum.

† 815. **Tinctura Opii crocata.**

Laudanum liquidum Sydenhami.

R. Croci austriaci *unciam unam,*
 Aquae Cinnamomi spirituosae *libram unam.*

Macera in vase bene clauso ad perfectam Croci extractionem, dein cum expressione cola.

Liquori adde:

Opii puri siccati grosse tusi *uncias duas.*

Stent per octiduum saepius agitando, donec Opium, quantum fieri potest, solvatur, tunc iterum exprime et filtra.

Pondus tincturae sit *unciarum duodecim.*

† 816. **Tinctura Opii simplex.**

Tinctura anodyna simplex.

Ex Opio puro siccato paretur ut tinctura Aloës ad pondus *unciarum duodecim.*

†817. **Tinctura Pulsatillae.**

Ex herba Pulsatillae florida recenti paretur ut tinctura Arnicae plantae totius.

†818. **Tinctura Pyrethri.**

E radice Pyrethri paretur ut tinctura Capsici.

819. **Tinctura Ratanhiae.**

E radice Ratanhiae paretur ut tinctura Aurantiorum corticum.

820. **Tinctura Rhei aquosa.**

Infusum Rhei cum Natro carbonico.

R. Radicis Rhei Chinensis concisae	<i>drachmas tres.</i>
Natri carbonici crystallisati	<i>drachmam unam,</i>
Aquae destillatae	<i>libram semis.</i>

Ebulliat per aliquot momenta, frige facta coletur.

821. **Tinctura Rhei vinosa Darelli.**

R. Radicis Rhei Chinensis contusae	<i>uncias duas,</i>
Flavedinis corticum Aurantiorum	<i>unciam dimidiam,</i>
Seminum Cardamomi minoris contusor.	<i>drachmas duas,</i>
Vini Malaccensis	<i>libras duas.</i>

Digere per triduum, exprime et in liquore solve:

Sacchari albi pulverati	<i>uncias tres.</i>
--------------------------------	---------------------

Solutione peracta filtra,
ut sit colatura *librarum duarum.*

822. **Tinctura Spilanthi oleracei composita.**

Tinctura Paraguay-Roux.

R. Herbae Spilanthi oleracei florentis et recentis	<i>uncias quatuor,</i>
Radicis Pyrethri	<i>uncias duas,</i>
Spiritus vini rectificatissimi	<i>libram unam.</i>

Digere per triduum. Exprime et filtra.

† 823. **Tinctura Stramonii.**

R̄. Seminum Stramonii grosse tusorum	<i>unciam unam,</i>
Spiritus vini rectificati diluti	<i>uncias sex.</i>
Macera per quatuordecim dies et conserva colaturam	
	<i>unciarum quinque.</i>

† 824. **Tinctura Thujae occidentalis.**

R̄. Frondium Thujae occidentalis recentium	<i>uncias quatuor,</i>
Spiritus vini rectificati	<i>libram unam.</i>
Digere per sex dies, exprime et filtra.	

825. **Tinctura Valerianae.**

E radice Valerianae paretur ut tinctura Aurantiorum corticum.

826. **Tinctura Vanillae.**

R̄. Vanillae minutim concisae	<i>unciam unam,</i>
Spiritus vini rectificati	<i>uncias sex.</i>
Digere per octiduum, saepius agitando, et expressam filtra.	

827. **Tragacantha.**

Succus induratus gummosus ex *Astragali* speciebus sect. *Tragacanthae*, plantis *Leguminosis* effluens, subdiaphanus, albus vel flavescens, insipidus, ejus duae species in commercio occurrunt.

- a) Vermicularis (vulgo Morea Traganth) in frustis filiformibus vermicularibus, in Graecia, imprimis circa Patras collecta.
- b) Applanata (vulgo Smyrna Traganth) in frustis latioribus, vix tortis, ex Asia minore et Persia boreali proveniens.

Tragacantham elige bene diaphanam, albam vel parum flavescenscentem, et ejus pars una in aquae partibus quinquaginta in mucilaginem spissam convertatur.

828. Trochisci Castorei.

R̄. Castorei pulverati
Pulveris Sacchari albi
Mucilaginis Tragacanthae
 ut fiant trochisci

drachmas duas,
uncias quatuor,
q. s.
granorum trium.

829. Trochisci Ipecacuanhae.

R̄. Pulveris radiceis Ipecacuanhae
 „ **Sacchari albi**
Mucilaginis Tragacanthae
 ut fiat massa, e qua formentur trochisci

grana quinque,
unciam unam,
q. s.
℞ octoginta.

830. Unguentum aromaticum.

Unguentum nervinum.

R̄. Herbae Absinthii siccatae
Spiritus vini rectificati diluti
 in pulvem contusam digere per aliquot horas, dein coque cum
Axungiae porcinæ
 ad consumptionem humidi et cola.

uncias tres,
unciis octo
libris duabus

In colatura liqueant:

Cerae flavae
Olei Lauri
 Colatis et refrigeratis adde:
Olei Juniperi baccarum
 „ **Menthae crispae**
 „ **Rosmarini**
 „ **Lavandulae**

libra dimidia,
unciae tres.

Misce in unguentum.

aa drachmas duas.

† 831. Unguentum Autenriethi.

Unguentum Tartari stibiati. Unguentum Tartari emetici.

R̄. Kali stibiato-tartarici subtilissime
pulverati
Axungiae porcinæ
 Misce exactissime. Ex tempore parandum.

drachmas duas,
unciam unam.

832. Unguentum basilicum.

R̄. Cerae flavae	
Sebi ovilli	
Picis navalis	
Terebinthinae coctae	
„ communis	<i>aa libram dimidiam,</i>
Olei Olivarum	<i>libram unam.</i>

Leni igne liquata colentur et agitentur, donec in unguentum coëant.

833. Unguentum Calendulae florum.

R̄. Florum Calendulae siccatorum	<i>uncias duas,</i>
Aquae fontanae calidae	<i>s. q.</i>
humectatas et contusas cum	
Butyri recentis	<i>libra una</i>
leni igne coque ad humidi consumptionem, dein exprime, cola et unguentum refrigeratum serva.	

834. Unguentum Cerussae.**Unguentum album simplex.**

R̄. Axungiae porcinae	<i>uncias quinque,</i>
Emplastri Diachyli simplicis	<i>unciam unam,</i>
colliquefactis et refrigeratis admisce sub continua agitatione:	
Cerussae subtiliter pulveratae	<i>uncias tres.</i>

835. Unguentum citrinum.**Unguentum flavum.**

R̄. Axungiae porcinae	<i>libras sex,</i>
Radicis Curcumae subtiliter pulveratae	<i>uncias duas,</i>
Aquae fontanae	<i>libram unam.</i>
Coque leni igne ad consumptionem humidi, deinde adde:	
Cerae flavae	<i>libram unam,</i>
Terebinthinae coctae	<i>uncias novem,</i>
„ communis	<i>uncias tres,</i>
solve coquendo, et humido consumto cola.	

836. Unguentum digestivum.

<i>R.</i> Terebinthinae communis	<i>libras duas,</i>
Olei Olivarum	<i>uncias tres,</i>
Pulveris Mastiches	
„ Myrrhae	
„ Olibani	<i>aa unciam unam.</i>
Misce in unguentum.	

837. Unguentum Digitalis.

<i>R.</i> Foliorum Digitalis purpureae sicca-	
torum	<i>uncias duas,</i>
cum	
Spiritus vini rectific. diluti	<i>unciis quatuor</i>
in pulvem contusa digere per duodecim horas, dein coque cum	
Axungiae porcinae	<i>libra una</i>
ad humidi consumptionem.	
Tum exprime, cola et unguentum refrigeratum conserva.	

838. Unguentum Elemi.**Balsamum Arcaci.**

<i>R.</i> Sebi ovilli	<i>uncias quatuor.</i>
Terebinthinae communis	
Elemi	<i>aa uncias tres,</i>
Axungiae porcinae	<i>uncias duas.</i>
Calore leni colliquefacta colentur, et sub continua agitatione refrigerant.	

839. Unguentum emolliens.**Crème céleste.**

<i>R.</i> Cerae albae	<i>drachmam unam et dimid.</i>
Spermatis Ceti	<i>drachmas tres,</i>
Olei amygdalarum	<i>unciam unam et dimidiam.</i>
Liquefactis et semirefrigeratis adde:	
Aquae Rosarum	<i>unciam unam.</i>

840. **Unguentum Hydrargyri citrinum.****Unguentum Hydrargyri nitrici.**

R̄. Hydrargyri rectificati *unciam unam,*
 solve ope caloris in
 Acidi nitrici diluti *unciis duabus v. q. s.*
 Sub continua agitationeingere in
 Axungiae porcinae liquatae colatae
 et semirefrigeratae *libram unam.*
 Massam semifluidam in capsulas papyraceas effunde, et in frusta
 minora conscinde.

† 841. **Unguentum Hydrargyri fortius.****Unguentum mercuriale fortius.**

R̄. Hydrargyri rectificati *unciam unam,*
 Olei Cacao
 Axungiae porcinae *aa unciam dimidiam.*
 Tere in mortario lapideo vel porcellaneo ad perfectam Hydrargyri
 subactionem, et serva in vase vitreo v. porcellaneo.

842. **Unguentum Hydrargyri mitius.****Unguentum mercuriale mitius. Unguentum Neapolitanum. Unguentum Hydrargyri cinereum.**

R̄. Hydrargyri rectificati
 Sebi ovilli
 Axungiae porcinae *aa libram unam,*
 assidue triturando Hydrargyrum subige, ut globuli metallici etiam
 armato oculo non appareant, dein sensim admiscee:
 Axungiae porcinae colatae et refri-
 geratae *libras duas,*
 et intime commiscee.

843. **Unguentum Juniperi.**

R̄. Baccarum Juniperi contusarum et
 aqua humectatarum *libram unam,*
 Axungiae porcinae *libras duas.*

Coque ad consumptionem humidi, deinde exprime et adde:
Cerae flavae *uncias quatuor,*
 liquefacta colentur, et unguento refrigerato admisceatur:
Olei Juniperi baccarum *uncia una.*

844. **Unguentum Linariae.**

Paretur ex herba Linariae, ut unguentum Calendulae.

845. **Unguentum Macidis.**

R̄. Medullae Ossium bovis *libram unam,*
Macidis cum spiritu vini rectificato
in pultem contusae *uncias duas.*
 Coque leni igne ad humidi consumptionem, dein cola et refrigeratis adde:
Olei Macidis *drachmas duas.*
 Misce in unguentum.

846. **Unguentum Majoranae.**

Cum herba Majoranae paretur, ut unguentum Calendulae.

†847. **Unguentum Mezerei.**

Unguentum epispasticum s. rubefaciens.

R̄. Extracti Mezerei *drachmam unam,*
Unguenti simplicis *unciam unam.*
 Misce in unguentum.

848. **Unguentum Plumbi acetici.**

Unguentum saturninum. Unguentum Lithargyri.

R̄. Axungiae porcinae *libram unam,*
Cerae albae *uncias quatuor;*
 colliquefactis, colatis et semirefrigeratis adde successive sub continua
 agitatione
Plumbi acetici depurati *drachmas duas,*
 solutas in
Aquae destillatae *drachmis sex.*
 Misce.

849. Unguentum pomadinum.**Unguentum rosatum.**

R̄. Axungiae porcinae	<i>libram unam,</i>
lotae in	
Aquae Rosarum	<i>s. q.</i>
Cerae albae	<i>uncias tres.</i>
Colliquefactis, colatis et semirefrigeratis adde :	
Olei Bergamottae	
„ Caryophyllorum	<i>āa drachmam dimidiam.</i>
Fiat unguentum.	

850. Unguentum populeum.**Unguentum Gemmarum Populi.**

R̄. Gemmarum Populi contusarum	<i>libram unam,</i>
Axungiae porcinae	<i>libras sex,</i>
Aquae fontanae	<i>uncias quatuor.</i>
Coque ad humidi consumptionem, deinde exprime et adde :	
Cerae flavae	<i>libram unam.</i>
Liquefacta, colata et semirefrigerata agitentur addendo	
Olei Citri	<i>unciam dimidiam.</i>
Misce.	

†851. Unguentum Sabadillae.**Unguentum contra pediculos. Unguentum ad phthiriasim.**

R̄. Unguenti simplicis leni igne lique-	
facti	<i>libram unam,</i>
adde :	
Pulveris seminum Sabadillae	<i>uncias tres,</i>
Olei Lavandulae	<i>drachmam unam.</i>
Misce in unguentum.	

852. Unguentum simplex.

R̄. Axungiae porcinae	<i>libram unam,</i>
Cerae albae	<i>uncias tres.</i>
Colliquefacta et colata sub continua agitatione refrigescant.	

853. Unguentum sulfuratum.**Unguentum contra scabiem.****R̄. Sulfuris sublimati crudi****Zinci sulfurici***aa unciam unam et dimid.***Unguenti simplicis***libram unam.*

Misceantur in unguentum.

854. Unguentum terebinthinatum.**R̄. Unguenti simplicis***uncias novem,***Terebinthinae communis***libras duas.*

Leni igne colliquefiant et colata sub continua agitatione refrigescant.

855. Vanilla.**Siliqua Vanillae.**

Vanillae aromaticae Sw. et *Vanillae planifoliae* Ait. plantarum suffruticosarum *Orchidearum*, in America calidiore, imprimis in Mexico cultarum fructus capsularis, siliquaeformis, sex pollices circiter longus, calami scriptorii crassitie, compressus, leviter incurvus, utrinque attenuatus, extus pullus, pinguis, intus pulpa pingui, rufescente, semina innumera minima includente faretus, odoris balsamico-benzoini, saporis grate aromatici, modice acidi.

† 856. Veratrinum.

Praeparatum officinarum chemicarum. Sit pulvis albus v. albidus, saporis admodum acris, urentis, inodorus, sed sternutationem vehementissimam excitans, alcaliorum modo reagens et in temperatura altiore liquescens, absque residuo combustibilis, in spiritu vini et aethere, vix autem in aqua solubilis.

† 857. Vinum Colchici.**R̄. Seminum Colchici optime contus.** *unciā unam,***Vini Malaccensis***uncias octo.*

Digere per sex dies, saepius agitando, exprime et filtra.

Tinctura filtrata sit

unciarum octo.

858. **Vinum Malaccense.**

Sit generosum, genuinum, minime metallis nocivis inquinatum.

† 859. **Vinum stibiato-tartaricum.**

Vinum Antimonii. Vinum emeticum.

R̄. Kali stibiato-tartarici *grana duo,*
Vini Malaccensis *unciam unam.*

Solve et serva in vase bene clauso.

† 860. **Zincum chloratum.**

Zincum hydrochloricum. Zincum muriaticum. Murias Zinci.

R̄. Zinci depurati *q. v.*
solve in

Acidi hydrochlorici *q. s.*

Solutionem saturatam filtra et leni calore evapora ad siccitatem.

Sal siccus in vase vitreo bene clauso servetur.

Sit albus, saporis nauseosi, styptici, in igne liquefiat et partim sublimetur, facillime in aqua, et aequè in spiritu vini et in aethere solvatur.

861. **Zincum crudum.**

In officinis metallurgicis paratum, metallum albido-subaeeruleseens, nitidum, structura foliacea, Plumbo, Cadmio, Ferro, Carbone, interdum etiam Cupro et Arsenico inquinatum.

† 862. **Zincum cyanatum sine ferro.**

Zincum hydrocyanicum.

R̄. Zinci carbonici adhuc humidi et
bene loti, ut in praeparatione
Zinci oxydati obtinetur, *q. v.*

solve in

Acidi acetici concentrati puri *s. q.*

Solutioni filtratae adde:

Acidi hydrocyanici *q. s.*

ad perfectam praecipitationem.

Praecipitatum aqua destillata bene lotum et temperatura ordinaria siccatum in vitro luei impervio bene clauso serva.

Sit pulvis albus, insipidus, in aqua insolubilis.

Venenum atrox, quod non dispensandum est, nisi medicus nominatim praescripserit: „Zincum cyanatum sine Ferro.“

863. **Zincum depuratum.**

R̄. Zinci crudi *q. v.*

fluat in crucibulo ignito per dimidiam horam, addendo sub assidua agitatione cum baculo ligneo

Sulfuris frusta et Sebum ovillum.

Quae operatio toties repetatur, quoties Zincum in apparatu Marshii tentatum Arsenici vestigia significat. Tum effunde in dolium aqua repletum, denique collige et siccatum serva.

864. **Zincum ferro-cyanatum.**

Zincum ferroso-hydrocyanicum. Zincum borussicum.

R̄. Kalii ferro-cyanati flavi *unciam unam.*

Solve in

Aquae destillatae *libra una,*

et filtra, deinde adde:

Zinci sulfurici *drachmas sex,*

solutas in

Aquae destillatae *unciis quatuor.*

Praecipitatum ablutum et bene siccatum in vitro clauso serva.

Sit pulvis albus, insipidus, in aqua insolubilis.

Quodsi medicus Zincum cyanatum vel hydrocyanicum ommissa clausula: „sine Ferro“ praescripserit, tunc Zincum ferro-cyanatum dispensandum est.

865. **Zincum oxydatum.****Zincum oxydatum album. Flores Zinci.**

R̄. Natri carbonici crystallisati *uncias novem,*
solve in

Aquae destillatae *libris quatuor.*

Liquori filtrato et ad ebullitionem calefacto continuo agitando sensim adde:

Zinci sulfurici *uncias octo,*
solutas in

Aquae destillatae *libris duabus.*

Liquorem singula praecipitatione refrigeratum singula vice denuo ad ebullitionem calefac, priusquam novam Zinci sulfurici solutionis portionem instillas, ita ut praecipitatum pulverulentum facile resideat.

Praecipitatum depositum, liquore supernatante rejecto, iteratis vicibus aqua destillata bulliente decantatione ablue, dein in filtro collige et, quamdiu Natri sulfurici vestigia in liquore transiente appareant, edulca et demum sicca.

Praecipitatum siccatum contusum in crucibulo hassiano bene obtecto modice incandescat, tandiu portiuncula exempta acido affuso non amplius effervescat.

Oxydum ignitum in pulverem redactum serva in vitro bene clauso.

Sit pulvis albidus parum citrinellus, inodorus, insipidus, in aqua insolubilis, calore flavescat, refrigeratus iterum albescat.

Ne sit metallis alienis, acido carbonico et sulfurico inquinatum.

† 866. **Zincum sulfuricum.****Sulfas Zinci purus. Vitriolum Zinci purum. Vitriolum album depuratum.**

R̄. Zinci crudi *q. v.*
solve in

Acidi sulfurici diluti *s. q.*

et liquorem digere, ita ut pars Zinci insoluta maneat.

Deinde decanta et liquorem calefactum in ampullam vitream infunde, per hanc torrentem

Gas Chlori

trajice, donec odor Chlorig fortis in ampullae orificio evolvatur, dein ampullam epistomio suberino clausam fortiter concute, et per noctem sepone.

Hujus Liquoris	<i>partem vigesimam</i>
praecipita cum	
Natri carbonici crystallisati	<i>sextupla quantitate,</i>
in	

Aquae destillatae	<i>s. q.</i>
soluta.	

Praecipitatum optime edulcatum, in filtro collectum et quantum fieri potest expressum, admisce reliquis

Liquoris Zinci sulfurici	<i>partibus novemdecim,</i>
et digere saepius agitando tamdiu, quam Ferri vestigia evanuerint, dein filtra et addita nona Zinci adhibiti parte acidi sulfurici diluti ad crystallisationem evapora.	

Sint crystalluli prismatici, subpellucidi, albissimi, saporis metallici, styptici, in aëre fatiscentes, in aquae partibus duabus solubiles.

† 867. **Zincum valerianicum.**

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sistit massam crystallinam lamellarem, margaritaceo-nitentem, albam, acidum valerianicum redolentem, in aqua difficile solubilem.

Ne sit Zinco acetico adulteratum.

Reagentia.

*Sint purissima, in vitris epistomio vitreo solliciter obturatis serveantur,
et in scrinio separato clauso teneantur. Quae supra jam exposita sunt,
hic nomine tantum indicantur.*

1. **Acidum aceticum concentratum purum** pond. spec. 1,040.
2. **Acidum hydrochloricum concentratum purum** pond. sp. 1,120.
3. **Acidum nitricum concentratum purum** pond. spec. 1,300.

4. **Acidum oxalicum solutum.**

R. Acidi oxalici infra notati	<i>unciam dimidiam,</i>
Aquae destillatae	<i>uncias quatuor.</i>
Solve et filtra.	

*Acidum oxalicum (supra notatum), praeparatum officinarum chemi-
carum, crystallos sistit prismaticas, decolores, pellueidas, inodoras,
saporis admodum acidi, quae leni calore in pulverem album fatiscunt,
calore auctiore avolant, in octo partibus aquae frigidae, in aequali
quantitate aquae fervidae solvuntur. Ne sint Kali et acido nitrico in-
quinatae.*

5. **Acidum sulfuricum depuratum concentratum** pond. sp. 1,843.
6. **Acidum sulfuricum depuratum dilutum** pond. spec. 1,090.

7. **Acidum tartaricum.**8. **Aether depuratus** pond. spec. 0,730.9. **Ammonia pura liquida** pond. spec. 0,960.10. **Ammonium carbonicum solutum.**11. **Ammonium chloratum depuratum solutum.**

R. Ammonii chlorati depurati *unciam unam,*
 Aquae destillatae *uncias quatuor.*
 Solve et filtra.

12. **Ammonium hydrosulfuratum.**

R. Ammoniae purae liquidae *uncias sex.*

Immitte gas hydrosulfuratum lotum, donec solutio Magnesiae sulfuricae non amplius praecipitatur.

Sit liquor limpidus, recens paratus fere coloris expers, tractu temporis flavescens, odoris hepatici, gravis.

13. **Aqua Calcis.**14. **Aqua Chlorig.**15. **Aqua hydrosulfurata.**

R. Aquae destillatae coctae et in vase
 clauso frige factae *q. v.*
 Immitte gas hydrosulfuratum, quamdiu absorbetur.
 Ex tempore paranda.

16. **Argentum nitricum fusum solutum.**

R. Argenti nitrici fusi *drachmas duas.*
 Solve in
 Aquae destillatae *uncias quatuor.*
 Filtratum serva.

17. **Baryta nitrica soluta.**

R̄. Baryi chlorati crystallisati *q. v.*

Solve in

Aquae destillatae *q. s.*

et solutionem bene dilutam calefac ad ebullitionem, deinde adde Ammonium carbonicum, donec praecipitatio cesset. Praecipitatum bene ablutum solve in

Acidi nitrici diluti calefacti *s. q.*

et lege artis in crystallos redige. Deinde

Barytae nitricae crystallisatae *unciam dimidiam*
solve in

Aquae destillatae *unciis quatuor.*

Solutionem filtra et serva.

18. **Baryum chloratum solutum.**

R̄. Baryi chlorati crystallisati *unciam dimidiam,*
solve in

Aquae destillatae *unciis quatuor.*

Solutionem filtratam serva.

19. **Charta exploratoria coerulea.**

R̄. Laccæ musci pulveratae *unciam dimidiam,*

Aquae destillatae fervidae *libram unam.*

Infunde per viginti quatuor horas.

Liquorem filtratum divide in duas partes aequales, quarum uni adde:

Acidi phosphorici puri *q. s.*
ut effervescencia cesset, dein admisce alterius partis liquoris coerulei

q. s.

ut color illius ruber iterum in coeruleum transeat.

Hoc liquore segmenta chartae emporeticae albae tingantur et bene siccata vitro obturato servantur.

20. **Charta exploratoria lutea.**

R̄. Radicis Cnreumae contus. *unciam,*

Spiritus vini rectificati diluti *uncias sex.*

Digere per duodecim horas.

Liquore filtrato tingantur segmenta chartae emporeticae albae, quae siccata in vase obturato servantur.

21. Charta exploratoria rubra.

R. Laccae musci in aqua destill. solutae *q. v.*

Acidi phosphorici puri *s. q.*

instilla, ut liquor e colore coeruleo in rubrum transeat.

Intinge frusta chartae emporeticae albae, quae siccata in vitro obturato servantur.

22. Cupri lamina.

23. Ferri lamina.

24. Ferrum sesquichloratum solutum.

R. Ferri sesquichlorati crystallisati *unciā dimidiā.*

Solve in

Aquae destillatae *unciis quatuor,*

et filtratum conserva.

25. Ferrum sulfuratum.

Praeparatum officinarum chemicarum.

Sit massa crystallina nigro-coerulea vel metallice flavescens.

26. Ferrum sulfuricum oxydulatum crystallisatum.

27. Kali causticum solutum.

R. Kali carbonici puri *q. v.*

solve in

Aquae destillatae *partibus decem,*

coque in lebetē ferreo et sensim adde

Calceis hydricae recentis *q. s.*

donec portiuncula filtrata non amplius cum acidis effervesceat vel aquam Calceis turbet.

Liquorem adhuc calidum repone in lagenam calefactam ad sedimentationem, dein liquorem purum abstrahe et in patina argentea vel ferrea bene mundata cito evapora ad gravitat. specific. 1,33 et conserva.

28. **Kali chloricum.**

29. **Magnesia sulfurica soluta.**

R̄. Magnesiae sulfuricae	<i>unciam dimidiam.</i>
Solve in	
Aquae destillatae	<i>unciis quatuor.</i>
Solutionem filtra et conserva.	

30. **Natrum carbonicum solutum.**

R̄. Natri carbonici depurati crystallisati	<i>unciam unam,</i>
solve in	
Aquae destillatae	<i>unciis quatuor.</i>
Solutionem filtra et conserva.	

31. **Natrum phosphoricum solutum.**

R̄. Natri phosphorici	-	<i>unciam unam,</i>
solve in		
Aquae destillatae		<i>unciis quatuor.</i>
Filtratum conserva.		

32. **Plumbum aceticum solutum.**

R̄. Plumbi acetici depurati	<i>unciam dimidiam,</i>
Aquae destillatae	<i>uncias quatuor.</i>
Solve et filtra.	

33. **Spiritus vini rectificatissimus.**

34. **Zincum depuratum.**

Ad apparatusum Reagentium adhuc pertinent:

Tubuli vitrei probatorii plures, ad minimum viginti quatuor.

Tubus ferruminatorius (Löthrohr).

Infundibula vitrea parva.

Lamina Platini.

Apparatus Marshi.

Charta emporetica alba.

Lampas cum spiritu vini.

TABULAE.

Pondera medicinalia austriaca.

	Libr.	Libr. sem.	Unc.	Unc. semis	Drachm.	Drach. sem.	Serupul.	Serup. sem.	Gran.
Granum	1
Serupulus semis	1	10
Serupulus	1	2	20
Drachma semis	1	1½	3	30
Drachma	1	2	3	6	60
Uncia semis	1	4	8	12	24	240
Uncia	1	2	8	16	24	48	480
Libra semis	1	6	12	48	96	144	288	2880
Libra	1	2	12	24	96	192	288	576	5760

Libra pond. medicin. austriac. respondet $\frac{3}{4}$ librae pond. civilis austriac.

Mensura (Maass) austriaca aquae destill. respondet uncis 40 pond. medicin.

Mensura austriaca spiritus vini rectificatiss. respondet uncis 32 pond. medicin

Tabula

exhibens relationem variorum ponderum medicinalium tam ad pondus Gallicum Grammatum, sic dictum decimale, quam ad pondus medicinale Austriacum legale.

In:	Libra	Uncia	Drachma	Serupulus	Granum	Serupulus continet Grana	Gramma respondet Granis	Uncia respondet Granis pond. austriac.
	continet Grammata							
Anglia ¹⁾	373,244	31,003	3,875	1,291	0,0645	20	15,431	425,1
Austria	420,009	35,007	4,376	1,459	0,0729	20	13,714	480,0
Badenensi Magno-Ducatu	357,780	29,815	3,727	1,262	0,0631	20	16,099	408,8
Bavaria	360,000	30,000	3,750	1,250	0,0625	20	16,000	411,4
Borussia	350,783	29,232	3,654	1,218	0,0604	20	16,420	400,8
Dania	357,669	29,805	3,725	1,241	0,0620	20	16,116	408,7
Francia	375,000	31,250	3,906	1,302	0,0651	20	15,360	428,5
Hassia	357,664	29,805	3,725	1,241	0,0620	20	16,116	408,7
Hollandia et Belgia . .	375,000	31,250	3,906	1,302	0,0651	20	15,360	428,5
Hispania	344,822	28,735	3,592	1,197	0,0499	24	20,050	394,0
Lusitania	344,160	28,680	3,585	1,195	0,0494	24	20,081	393,3
Roma	339,191	28,266	3,533	1,178	0,0490	24	20,373	387,6
Russia, Helvetia et compluribus Germaniae regionibus (Pond. Noricum medic.) .	357,954	29,829	3,728	1,242	0,0621	20	16,103	409,0
Sardinia	331,961	27,663	3,458	1,153	0,0480	24	20,815	379,3
Sicilia ²⁾	320,761	26,730	2,673	0,891	0,0445	20	22,446	366,5
Suecia	356,437	29,703	3,714	1,238	0,0619	20	16,155	407,3

¹⁾ Angli corporum fluidorum quantitatem non pondere, sed volumine censere solent. Unitas mensurae anglicae Gallone dicitur et capax est 4,543 litres. Usui pharmaceutico inservit Gallone veterum Congius dictus.
Congius (Gallone) constat ex 8 Octariis, et capax est 3785 gramm. aquae destillat.
Octarius (Pinte) constat ex... 20 fluidunciis, et capax est 473 " " "
Fluiduncia constat ex..... 8 fluiddrachmis, et capax est 24 " " "
Fluiddrachma constat ex 60 minimis, et capax est... 3 " " "
Minimum (Minim) respondet circiter guttae, et capax est... 0,05 " " "

²⁾ Uncia Siciliensis componitur decem drachmis.

Tabula

sistens comparationem ponderis et mensurae Gallorum cum Austriae pondere medicinali
et mensura fluidorum.

	Granis	vel Unciis	Drachmis	Gran.
Milligramma respondet . . .	0,013714	.	.	$\frac{1}{73}$
Centigramma " . . .	0,13714	.	.	$\frac{1}{7}$
Decigramma " . . .	1,3714	.	.	$1\frac{3}{8}$
Gramma " . . .	13,714	.	.	$13\frac{7}{10}$
Decagramma " . . .	137,14	.	2	$17\frac{1}{7}$
Hectogramma " . . .	1371,4	2	6	$51\frac{2}{5}$
Kilogramma " . . .	13714,0	28	4	34
Myriagramma " . . .	137140,0	285	5	40

Millilitre respondet 0,000706 mensurae (Maass) austriacae.

Centilitre " 0,00706	"	"
Decilitre " 0,0706	"	"
Litre ¹⁾ " 0,706	"	"
Decalitre " 7,06	"	"
Hectolitre " 70,6	"	"
Kilolitre " 706,9	"	"
Myrialitre " 7069,1	"	"

Pinte respondet . . . 0,931 litre, componitur 2 chopines.

Chopine v. Setier respondet 0,466 " " 2 demisetiers.

Demisetier " 0,233 " " 2 poissons.

Poisson " 0,116 " " 4 roquilles.

Roquille " 0,029 litre.

¹⁾ Litre continet 1000 Grammata aquae destillatae sub temperatura 4° C.

T a b u l a

comparans gravitatem specificam normalem in temperatura 12 — 15° C. pro
medicaminibus liquidis praescriptam cum illa, quae in pharmacopoea
anni 1836 praescripta fuit.

	Pharmacopoeae	
	1854	1836
Acidum aceticum concentratissimum	1,063—1,070	1,070
" " concentratum crudum	1,040	
" " purum	1,040	1,030
hydrochloricum concentratum crudum	1,160	
" " " purum	1,120	1,200
" " dilutum purum	1,060	1,070
nitricum concentratum purum	1,300	1,450
" " crudum	1,350	
" " dilutum purum	1,140	1,170
phosphoricum purum	1,130	1,050
sulfuricum anglicanum	1,840—1,845	
" " concentratum rectificatum	1,845	1,840
" " rectificatum dilutum	1,090	1,090
Aether aceticus	0,890	0,905
" crudus	0,730	
" depuratus	0,730	0,745
Ammonia pura liquida	0,960	0,910
Ammonium aceticum solutum concentratum	1,050	1,050
" " " dilatatum	1,010	1,010
" carbonicum pyro-oleosum solutum	1,060	1,060
" succinicum " 	1,080	
Chloroformium	1,490	
Kali aceticum solutum	1,200	1,200
" carbonicum purum solutum	1,330	1,270
Spiritus Aetheris	0,815	0,835
" " chlorati	0,830—0,840	
" " nitrici	0,830	0,850
" vini rectificatissimus	0,8336	0,830
" " rectificatus	0,8636	0,850
" " " dilutus	0,9131	0,910

Tabula

sistens corporum in aqua solubiliū copiam, quam uncia una aquae destillatae in
temperatura 10—15° C. solutam tenere potest.

Uncia una aquae destillatae solvit:	Unciam	Drachmas	Grana	Uncia una aquae destillatae solvit:	Unciam	Drachmas	Grana
Acidi benzoici	2,4	Kali nitrici	2	.
„ boracici	19	„ stibiato-tartarici	32
„ citrici	1	2	40	„ sulfurici	48
„ gallici	5	„ tartarici acidi	2,5
„ succinici	19	„ „ boraxati	1	.	.
„ tartarici	1	6	.	„ „ neutri	1	.	.
Aluminis crudi	27	„ ferro-cyanati flavi	2	.
Ammonii carbonici siccī	2	40	Kalii iodati	1	2	.
„ chlorati depurati	3	.	„ sulfurati	4	.
„ „ ferrati	2	40	Magnesiae sulfuricae	4	.
Argenti nitrici	1	.	.	Manniti	1	36
Arsenici albi	19	Morphii hydrochlorici	30
Atropini	1,6	„ puri	0,5
Baryi chlorati	3	.	Natrii chlorati	3	.
Chinini sulfurici	0,6	Natri acetici	2	40
Cinchonini sulfurici	8	„ bicarbonici	37
Cupri acetici	35,5	„ boracici	40
„ sulfurici crystallisati	2	40	„ carbonici	4	.
„ „ ammoniati	3	20	„ nitrici	4	.
Ferri lactici	16	„ phosphorici	2	.
„ sulfurici oxydulati	4	.	„ sulfurici	4	.
Hydrargyri bichlorati corrosivi	26,6	Plumbi acetici depurati	5	20
Jodi puri	0,07	Salicini	1	26
Kali bichromici	48	Strychnini puri	0,07
„ carbonici puri	1	1	.	Zinci sulfurici	4	.
„ chlorici	29	„ valerianici	1	33
„ natronato-tartarici	4	.				

T a b u l a

docens quantitatem aquae 100 partibus spiritus vini variae fortitudinis sub temperatura
12° R. admiscendae, ut spiritus vini tenuior gradus designati obtineatur.

Gradus spiritus vini mis- cendi secundum scalam aleoholo- metri austriaci.	Pro spiritu vini					
	rectificato diluto		rectificato		rectificatissimo	
	Spiritus vini 100 partes					
	voluminis	ponderis	voluminis	ponderis	voluminis	ponderis
	exigunt aquae destillatae					
	volumina	pondera	volumina	pondera	volumina	pondera
75	26,45	30,14				
76	28,24	32,28				
77	30,04	34,43				
78	31,83	36,59				
79	33,62	38,77				
80	35,42	40,97				
81	37,22	43,19	1,36	1,58		
82	39,02	45,44	2,72	3,17		
83	40,83	47,71	4,09	4,78		
84	42,65	50,00	5,46	6,41		
85	44,47	52,32	6,84	8,05		
86	46,30	54,65	8,22	9,70		
87	48,12	57,01	9,60	11,38		
88	49,95	59,40	11,00	13,08		
89	51,79	61,83	12,41	14,80		
90	53,64	64,29	13,81	16,54		
91	55,50	66,78	15,22	18,31	1,26	1,52
92	57,36	69,31	16,64	20,10	2,52	3,05
93	59,24	71,87	18,07	21,92	3,80	4,61
94	61,12	74,48	19,51	23,77	5,09	6,20
95	63,01	77,14	20,96	25,65	6,39	7,82

Tabula

exhibens reductionem graduum araeometricorum secundum Beaumé, Cartier, Beck
ad pondus specificum sub temperatura 12,5° C.

A. Pro fluidis aqua levioribus.

Gradus	Beaumé	Cartier	Beck	Gradus	Beaumé	Cartier	Beck
0	.	.	1,0000	31	0,870	0,865	0,8457
1	.	.	0,9941	32	0,864	0,859	0,8413
2	.	.	0,9883	33	0,859	0,853	0,8374
3	.	.	0,9826	34	0,854	0,848	0,8333
4	.	.	0,9770	35	0,849	0,842	0,8292
5	.	.	0,9714	36	0,844	0,837	0,8252
6	.	.	0,9659	37	0,838	0,831	0,8212
7	.	.	0,9604	38	0,833	0,826	0,8173
8	.	.	0,9550	39	0,829	0,821	0,8133
9	.	.	0,9497	40	0,824	0,815	0,8093
10	1,000	.	0,9444	41	0,819	0,810	0,8061
11	0,993	1,000	0,9392	42	0,814	0,805	0,8018
12	0,986	0,992	0,9340	43	0,809	0,800	0,7981
13	0,979	0,985	0,9289	44	0,802	.	0,7944
14	0,972	0,977	0,9239	45	0,800	.	0,7907
15	0,966	0,970	0,9189	46	0,796	.	0,7871
16	0,959	0,962	0,9139	47	0,791	.	0,7834
17	0,952	0,955	0,9090	48	0,787	.	0,7799
18	0,946	0,948	0,9042	49	0,782	.	0,7763
19	0,940	0,941	0,8994	50	0,778	.	0,7727
20	0,933	0,934	0,8947	51	0,773	.	0,7692
21	0,927	0,928	0,8900	52	0,769	.	0,7658
22	0,921	0,921	0,8854	53	0,765	.	0,7623
23	0,915	0,914	0,8808	54	0,760	.	0,7589
24	0,909	0,908	0,8762	55	0,756	.	0,7556
25	0,903	0,901	0,8717	56	0,752	.	0,7522
26	0,898	0,895	0,8673	57	0,748	.	0,7489
27	0,892	0,889	0,8629	58	0,744	.	0,7456
28	0,886	0,883	0,8585	59	0,739	.	0,7423
29	0,881	0,877	0,8542	60	0,735	.	0,7391
30	0,875	0,871	0,8500				

B. Pro fluidis aqua gravioribus.

Gradus	Beaumé	Beck	Gradus	Beaumé	Beck
0	1,000	1,0000	39	1,386	1,2977
1	1,007	1,0059	40	1,400	1,3077
2	1,014	1,0119	41	1,414	1,3178
3	1,022	1,0118	42	1,429	1,3281
4	1,029	1,0241	43	1,443	1,3386
5	1,037	1,0303	44	1,458	1,3492
6	1,045	1,0366	45	1,474	1,3600
7	1,053	1,0429	46	1,489	1,3710
8	1,061	1,0494	47	1,505	1,3821
9	1,069	1,0559	48	1,522	1,3934
10	1,077	1,0625	49	1,538	1,4050
11	1,085	1,0692	50	1,556	1,4167
12	1,094	1,0759	51	1,573	1,4286
13	1,093	1,0828	52	1,591	1,4407
14	1,111	1,0897	53	1,609	1,4530
15	1,120	1,0968	54	1,628	1,4655
16	1,129	1,1039	55	1,647	1,4783
17	1,138	1,1111	56	1,667	1,4912
18	1,148	1,1184	57	1,687	1,5044
19	1,157	1,1258	58	1,707	1,5179
20	1,167	1,1333	59	1,729	1,5315
21	1,176	1,1409	60	1,750	1,5454
22	1,186	1,1486	61	1,772	1,5596
23	1,197	1,1565	62	1,795	1,5741
24	1,207	1,1644	63	1,818	1,5888
25	1,217	1,1724	64	1,842	1,6038
26	1,228	1,1806	65	1,867	1,6190
27	1,239	1,1888	66	1,892	1,6346
28	1,250	1,1972	67	1,918	1,6505
29	1,261	1,2057	68	1,945	1,6667
30	1,273	1,2143	69	1,972	1,6832
31	1,284	1,2230	70	2,000	1,7000
32	1,296	1,2319	71	.	1,7172
33	1,308	1,2409	72	.	1,7347
34	1,320	1,2500	73	.	1,7526
35	1,333	1,2593	74	.	1,7708
36	1,346	1,2687	75	.	1,7895
37	1,359	1,2782	76	.	1,8085
38	1,373	1,2879			

Tabula

docens quantitatem gas hydrochlorici, quae in 100 partibus acidi hydrochlorici,
eujus pondus specificum sub temperatura 10° C. explorandum est, continetur.

(Secundum **Ure**).

Pondus specificum	Gas hydrochloricum	Pondus specificum	Gas hydrochloricum	Pondus specificum	Gas hydrochloricum
1,2000	40,777	1,1349	27,321	1,0657	13,456
1,1982	40,369	1,1328	26,913	1,0637	13,049
1,1964	39,961	1,1308	26,505	1,0617	12,641
1,1946	39,554	1,1287	26,098	1,0597	12,233
1,1928	39,146	1,1267	25,690	1,0577	11,825
1,1910	38,738	1,1247	25,282	1,0557	11,418
1,1893	38,330	1,1226	24,874	1,0537	11,010
1,1875	37,923	1,1206	24,466	1,0517	10,602
1,1857	37,516	1,1185	24,058	1,0497	10,194
1,1846	37,108	1,1164	23,650	1,0477	9,786
1,1822	36,700	1,1143	23,242	1,0457	9,379
1,1802	36,292	1,1123	22,834	1,0437	8,971
1,1782	35,884	1,1102	22,426	1,0417	8,563
1,1762	35,476	1,1082	22,019	1,0397	8,155
1,1741	35,068	1,1061	21,611	1,0377	7,747
1,1721	34,666	1,1041	21,203	1,0357	7,340
1,1701	34,252	1,1020	20,796	1,0337	6,932
1,1681	33,843	1,1000	20,388	1,0318	6,524
1,1661	33,437	1,0980	19,980	1,0298	6,116
1,1641	33,029	1,0960	19,572	1,0279	5,709
1,1620	32,621	1,0939	19,165	1,0259	5,301
1,1599	32,213	1,0919	18,757	1,0239	4,893
1,1578	31,805	1,0899	18,349	1,0220	4,486
1,1557	31,398	1,0879	17,941	1,0200	4,078
1,1537	30,990	1,0859	17,534	1,0180	3,670
1,1515	30,582	1,0838	17,126	1,0160	3,262
1,1494	30,174	1,0818	16,718	1,0140	2,854
1,1473	29,767	1,0798	16,310	1,0120	2,447
1,1452	29,359	1,0778	15,902	1,0100	2,039
1,1431	28,951	1,0758	15,494	1,0080	1,631
1,1410	28,544	1,0738	15,087	1,0060	1,124
1,1389	28,136	1,0718	14,679	1,0040	0,816
1,1369	27,728	1,0697	14,271	1,0020	0,408
		1,0677	13,863		

Tabula

docens quantitatem acidi anhydri, quae in 100 partibus acidi nitrici, cujus
pondus specificum sub temperatura 15° C. explorandum est, continetur.

(Secundum **Ure**).

Pondus specificum	Partes acidi anhydri	Pondus specificum	Partes acidi anhydri	Pondus specificum	Partes acidi anhydri
1,500	79,7	1,383	53,4	1,189	26,3
1,498	78,9	1,378	52,6	1,183	25,5
1,496	78,1	1,373	51,8	1,177	24,7
1,494	77,3	1,368	51,1	1,171	23,9
1,491	76,5	1,363	50,2	1,165	23,1
1,488	75,7	1,358	49,4	1,159	22,3
1,485	74,9	1,353	48,6	1,153	21,5
1,482	74,1	1,348	47,9	1,146	20,7
1,479	73,3	1,343	47,0	1,140	19,9
1,476	72,5	1,338	46,2	1,134	19,1
1,473	71,7	1,332	45,4	1,129	18,3
1,470	70,9	1,327	44,6	1,123	17,5
1,467	70,1	1,322	43,8	1,117	16,7
1,464	69,3	1,316	43,0	1,111	15,9
1,460	68,5	1,311	42,2	1,105	15,1
1,457	67,7	1,306	41,4	1,099	14,3
1,453	66,9	1,300	40,6	1,093	13,5
1,450	66,1	1,295	39,8	1,088	12,7
1,446	65,3	1,289	39,0	1,082	11,9
1,442	64,5	1,283	38,3	1,076	11,2
1,439	63,8	1,276	37,5	1,071	10,4
1,435	63,0	1,270	36,7	1,065	9,6
1,431	62,2	1,264	35,9	1,059	8,8
1,427	61,4	1,258	35,1	1,054	8,0
1,423	60,6	1,252	34,3	1,048	7,2
1,419	59,8	1,246	33,5	1,043	6,4
1,415	59,0	1,240	32,7	1,037	5,6
1,411	58,2	1,234	31,9	1,032	4,8
1,406	57,4	1,228	31,1	1,027	4,0
1,402	56,6	1,221	30,3	1,021	3,2
1,398	55,8	1,215	29,5	1,016	2,4
1,394	55,0	1,208	28,7	1,011	1,6
1,388	54,2	1,202	27,9	1,005	0,8
		1,196	27,1		

Tabula

docens quantitatem acidi anhydri et hydrati, quae in 100 partibus acidi sulfurici diluti, ejus pondus specificum sub temperatura 15° C. explorandum est, continetur.

Secundum Ure			Secundum Bineau		
Pondus specificum	Acidum anhydrum	Acidum concentratum	Pondus specificum	Acidum anhydrum	Acidum concentratum
1,8485	81,54	100	1,842	81,6	100
1,8475	80,72	99			
1,8460	79,90	98			
1,8439	79,09	97			
1,8410	78,28	96			
1,8376	77,40	95	1,837	77,1	94,5
1,8336	76,65	94			
1,8290	75,83	93	1,830	74,9	91,8
1,8233	75,02	92			
1,8179	74,20	91	1,819	73,0	89,5
1,8115	73,39	90			
1,8043	72,57	89			
1,7962	71,75	88	1,796	70,4	86,3
1,7870	70,94	87			
1,7774	70,12	86			
1,7673	69,31	85	1,774	68,5	83,9
1,7570	68,49	84			
1,7465	67,68	83	1,753	66,7	81,7
1,7360	66,86	82			
1,7245	66,05	81	1,732	65,1	79,8
1,7120	65,23	80	1,711	63,6	78,0
1,6993	64,42	79	1,691	62,3	76,3
1,6870	63,60	78			
1,6750	62,78	77	1,671	61,0	74,7
1,6630	61,97	76			
1,6520	61,15	75	1,652	59,7	73,2
1,6415	60,34	74			
1,6321	59,55	73	1,634	58,4	71,6
1,6204	58,71	72			
1,6090	57,89	71	1,615	57,1	70,0
1,5975	57,08	70	1,597	55,8	68,4
1,5868	56,26	69			
1,5760	55,45	68	1,580	54,6	66,9
1,5648	54,63	67	1,563	53,4	65,4
1,5503	53,82	66			

Secundum Ure			Secundum Bineau		
Pondus specificum	Acidum anhydrum	Acidum concentratum	Pondus specificum	Acidum anhydrum	Acidum concentratum
1,5390	53,00	65	1,546	52,2	63,9
1,5280	52,18	64	1,530	51,1	62,6
1,5170	51,37	63	1,514	50,0	61,1
1,5066	50,55	62			
1,4960	49,74	61	1,498	48,7	59,6
1,4860	48,92	60			
1,4760	48,11	59	1,483	47,5	58,2
1,4660	47,29	58	1,468	46,4	56,9
1,4560	46,58	57	1,453	45,2	55,4
1,4460	45,68	56			
1,4360	44,85	55	1,438	44,1	54,0
1,4265	44,03	54			
1,4170	43,22	53	1,424	42,9	52,5
1,4073	42,40	52	1,410	41,8	51,2
1,3977	41,58	51	1,397	40,7	49,9
1,3884	40,77	50			
1,3788	39,95	49	1,383	39,5	48,4
1,3697	39,14	48	1,370	38,3	46,9
1,3612	38,32	47			
1,3530	37,51	46	1,357	37,2	45,5
1,3440	36,69	45	1,345	36,2	44,3
1,3345	35,88	44	1,332	35,1	43,0
1,3255	35,06	43	1,320	34,0	41,6
1,3165	34,25	42			
1,3080	33,43	41			
1,2999	32,61	40			
1,2913	31,80	39	1,296	31,8	38,9
1,2826	30,98	38			
1,2740	30,17	37			
1,2654	29,35	36	1,262	28,4	34,8
1,2572	28,54	35			
1,2490	27,72	34			
1,2409	26,91	33			
1,2334	26,09	32			
1,2260	25,28	31			
1,2184	24,46	30			
1,2108	23,65	29			
1,2032	22,83	28	1,209	23,1	28,3
1,1956	22,01	27			
1,1876	21,20	26			
1,1792	20,38	25			
1,1706	19,57	24			

Secundum Ure			Secundum Bineau		
Pondus specificum	Acidum anhydrum	Acidum concentratum	Pondus specificum	Acidum anhydrum	Acidum concentratum
1,1626	18,75	23	1,161	18,3	22,4
1,1549	17,94	22			
1,1480	17,12	21			
1,1410	16,31	20			
1,1330	15,49	19			
1,1246	14,68	18			
1,1165	13,86	17	1,116	13,3	16,3
1,1090	13,05	16			
1,1019	12,23	15			
1,0953	11,41	14			
1,0887	10,60	13			
1,0809	9,78	12			
1,0743	8,97	11	1,075	8,9	10,9
1,0682	8,15	10			
1,0614	7,34	9			
1,0544	6,52	8			
1,0477	5,71	7			
1,0405	4,89	6			
1,0336	4,08	5	1,036	4,5	5,4
1,0268	3,26	4			
1,0206	2,46	3			
1,0140	1,63	2			
1,0074	0,8154	1			

T a b u l a

docens quantitatem gas Ammoniae, quae in 100 partibus Ammoniae purae liquidae, cujus pondus specificum sub temperatura 15° C. explorandum est, continetur.

Pondus specificum	Partes gas Ammoniae	Pondus specificum	Partes gas Ammoniae	Pondus specificum	Partes gas Ammoniae
0,8194	27,940	0,9177	21,200	0,9564	10,600
0,8937	27,633	0,9227	19,875	0,9614	9,275
0,8967	27,038	0,9275	18,550	0,9662	7,950
0,8983	26,751	0,9320	17,225	0,9716	6,625
0,9000	26,500	0,9362	15,900	0,9768	5,500
0,9045	25,175	0,9410	14,575	0,9828	3,975
0,9090	23,850	0,9455	13,250	0,9887	2,650
0,9133	22,525	0,9510	11,925	0,9945	1,325

Tabula

medicamina exhibens, quae sub clave domini vel ejus vices gerentis asservanda sunt.

Acidum hydrocyanicum.

Arsenicum album.

Atropinum.

Pulvis Cosmi.

Solutio arsenicalis Fowleri.

Strychninum.

Strychninum nitricum.

Veratrinum.

Zincum cyanatum sine ferro.

T a b u l a

exhibens medicamenta, quae a reliquis seclusa asservanda sunt.

Acidum hydrochloricum concentratum.

„ nitricum concentratum.

„ sulfuricum concentratum.

Aether.

„ aceticus.

Agaricus albus.

Aloë lucida.

Ammonia pura liquida.

Amygdalinum.

Aqua amygdalarum concentrata.

„ Chlori.

„ Laurocerasi.

Argentum nitricum crystallisatum.

„ „ fusum.

Aurum natronato-chloratum.

Baryum chloratum.

Cantharides.

Chloroformum.

Cuprum aceticum crystallisatum.

„ chloratum ammoniacale solutum
concentratum.

Cuprum chloratum ammoniacale cum Hy-

drargyro solutum concentratum.

„ subaceticum crudum.

„ sulfuricum.

„ „ ammoniatum.

Electuarium aromaticum cum Opio.

Euphorbium.

Extractum Aconiti.

„ Aloës.

„ Belladonnae.

„ Conii maculati.

„ Digitalis.

„ Elaterii.

„ Filicis maris.

Extracta Hyosciami.

Extractum Lactueae.

„ Mezerei.

„ Nucis vomicae.

„ Opii.

„ Scillae.

„ Secalis cornuti.

Faba St. Ignatii.

Folia Belladonnae.

„ Digitalis.

„ Hyosciami.

„ Stramonii.

„ Toxicodendri.

Frondes Sabinae.

Fructus Colocynthis.

Gutti.

Herba Aconiti.

„ Belladonnae florida.

„ Conii maculati.

„ Gratiolae.

„ Lobeliae inflatae.

„ Pulegii.

Hydrargyrum bichloratum ammoniatum.

„ „ corrosivum.

„ bijodatum rubrum.

„ chloratum mite.

„ jodatum flavum.

„ oxydatum rubrum.

„ oxydulatum nigrum Hahne-
manni.

Jodum.

Kali bichromicum crudum.

„ stibiato-tartaricum.

Kalium jodatum.

Kreosotum.

Liquor acidus Halleri.

Morphium.

„ aceticum.

Morphium hydrochloricum.

Nux vomica.

Oleum Crotonis Tiglii.

„ Hyosciami seminum.

Opium.

Phosphorus.

Plumbum aceticum crudum.

„ „ depuratum.

„ „ solutum.

„ „ basicum solutum.

Radix Belladonnae.

„ Gratiolae.

„ Hellebori nigri.

„ Jalappae.

„ Ipecacuanhae.

„ Veratri albi.

Resina Jalappae.

Scammonium.

Secale cornutum.

Semen Colechici.

„ Crotonis Tiglii.

„ Hyosciami.

„ Sabadillae.

„ Stramonii.

Stibium chloratum solutum.

„ sulfuratum aurantiacum.

„ „ rubrum.

Tinctura Aloës.

„ Belladonnae.

„ Cantharidum.

„ Colechici seminum.

Tinctura Colocynthidum.

- „ Digitalis purpureae.
- „ Euphorbii.
- „ Ipecacuanhae.
- „ Jodi.
- „ Lobeliae inflatae.
- „ Nucis vomicae.
- „ Opii crocata.
- „ „ simplex.

Tinctura Pulsatillae.

- „ Stramonii.
- „ Thujae occidentalis.

Vinum Colehici.

- „ stibiato-tartaricum.

Zincum chloratum.

- „ sulfuricum.
 - „ valerianicum.
-

Tabellarische Uebersicht

der vorzüglichsten giftig wirkenden Stoffe und der Haupt- und stellvertretenden Mittel dagegen.

Giftig wirkende Stoffe.	Hauptmittel dagegen.	Stellvertretende Mittel dagegen.
Aetz- und kohlensaure Alkalien.	Weinsäure-Lösung.	Essig. Citronensaft. Oehl-Mixturen.
Antimon-Präparate, insbesondere Brechweinstein.	Tannin.	Decoete von Galläpfeln, Eichenrinden, China, Tormentilla.
Arsenik-Präparate.	Magnesiamilch. Eisenoxydhydrat.	Dünne Kalkmilch. Kalkwasser. Schleimige und öhlige Getränke. Eiweisslösungen.
Blausäure und blausäurehaltige Wässer.	Chlorwasser (Aq. Chlori). Bleichkalk-Lösung (1 Dr. Bleichkalk mit 10 Tropfen Salzsäure und 6 Unzen Wasser).	Gleichzeitig kalte Begiessungen.
Bleisalze.	Schwefelsaure Alkalien. Bittersalz.	Kochsalz. Gerbestoffhaltige Mittel.
Brom.	Magnesiamilch. Stärkekleister.	Mehlbrei.
Chlordämpfe.	Alkohol mit Zucker (innerlich). Alkohol einathmen.	Geistige Getränke.
Chromsaure Salze.	Dünner Brei aus Zuckersyrup und Eisenfeile.	Zuckerwasser. Milch. Schleimige Decoete.
Jod und Jod-Präparate.	Magnesiamilch. Stärkekleister.	Mehlbrei.

Giftig wirkende Stoffe.	Hauptmittel dagegen.	Stellvertretende Mittel dagegen.
Kalksalze und Aetzkalk.	Schwefelsaure Bittererde. Schwefelsaures Natron. Zuckersyrup.	Kohlensaures Natron. Schleimige und öhlige Mixturen.
Kohlen-Oxyd, Kohlensäure.	Hirschhornsalz (Sal cornu cervi) u. dgl. als Riech- mittel.	Kalte Begiessungen.
Kreosot.	Eiweisslösung.	Schleimige Getränke.
Kupfersalze.	Inniges Gemenge von 7 Thei- len angefeuchteter Eisen- feile und 4 Theilen Schwe- felblumen.	Magnesiamilch mit Milch- zucker. Molken. Eiweiss- lösungen.
Mineralsäuren.	Magnesiamilch.	Zuckersyrup. Oehlige und schleimige Getränke.
Pflanzengifte. a) Scharfe.	Chlorwasser. Bleichkalk-Lö- sung (wie bei Blausäure). Brechmittel.	Schleimige Getränke.
b) Narkotische.	Wie oben bei scharfen Pflanzengiften, nebstdem noch starke Riech- und Hautreizmittel.	Schwarzer Kaffee. Gerbe- stoffhältige Decocte.
Phosphor.	Mischung von 1 Theil Mag- nesiamilch mit 6 Theilen Chlorwasser.	Bleichkalk-Lösung (wie bei Blausäure). Schleimige Ge- tränke. Dicker Mehlbrei.
Quecksilbersalze.	Wie bei Kupfersalzen.	Eiweisslösungen. Milch.
Silberpräparate.	Kochsalz.	Milch. Eiweisshältige und schleimige Getränke.
Zinksalze.	Tannin.	Gerbestoffhältige Decocte. Eiweisslösungen.
Zinnsalze.	Magnesiamilch.	Eiweiss. Milch.

Index generalis.

				Pagina.	Numerus.
A.					
Acetas	Ammoniac solutus				
	concentratus . .	13	39		
	„ Ammoniac solutus				
	dilutus	14	40		
	„ Lixivae solutus .	113	434		
	„ Morphii	130	488		
	„ Plumbi acidulus				
	depuratus . . .	148	575		
	„ Plumbi acidulus				
	solutus	148	576		
	„ Sodae	133	496		
Acetum	antisepticum . .	1	1	Acetum Scillae	2 4
	„ aromaticum . .	1	1	„ scilliticum . . .	2 4
	„ cardiacum . . .	1	1	Acidum aceticum concen-	
	„ Colehiei	2	2	tratisissimum . .	2 5
	„ concentratum cru-			„ aceticum concen-	
	dum	3	6	tratum crudum .	3 6
	„ concentratum pu-			„ aceticum concen-	
	rum	3	7	tratum purum .	3 7
	„ crudum	2	3	„ aceticum dilutum	2 3
	„ e spiritu vini . .	2	3	„ arsenicosum . .	28 99
	„ glaciace	2	5	„ benzoicum . .	3 8
	„ Ligni empyreu-			„ benzoilicum . .	3 8
	maticum	8	22	„ boracicum . . .	4 9
	„ Lithargyri . . .	149	577	„ boricum	4 9
	„ Plumbi	149	577	„ borussicum . .	6 16
	„ plumbicum . . .	149	577	„ chloro - nitrosum	4 10
	„ prophylacticum .	1	1	„ Citri	4 11
	„ quatuor latronum	1	1	„ citricum	4 11
	„ radicale	2	5	„ gallicum	5 12
	„ Saturni	149	577	„ hydrochloratum	
				concentratum .	5 14
				„ hydrochloratum	
				dilutum	5 15
				„ hydrochloricum	
				concentratum cru-	
				dum	5 13
				„ hydrochloricum	
				concentratum purum	5 14
				„ hydrochloricum	
				dilutum purum .	5 15
				„ hydrocyanatum .	6 16
				„ hydrocyanicum .	6 16

	Pagina.	Numerus.		Pagina.	Numerus.
Acidum muriaticum concentratum crudum	5	13	Aether crudus	11	30
„ muriaticum concentratum purum	5	14	„ depuratus	11	31
„ muriaticum dilutum	5	15	„ sulfuricus	11	31
„ nitricum concentratum purum .	6	17	„ „ crudus	11	30
„ nitricum crudum .	7	18	„ vegetabilis	10	29
„ „ dilutum purum	7	19	„ Vitrioli	11	31
„ nitroso - muriaticum	4	10	Aethiops antimonialis . .	113	428
„ oxalicum	223	4	„ martialis	76	291
„ „ solutum	223	4	„ mineralis	113	429
„ phosphoricum glaciale	7	20	Agaricus albus	11	32
„ phosphoricum purum	7	21	„ Chirurgorum	11	33
„ pyrolignosum	8	22	„ quercinus praeparatus	11	33
„ pyroxylicum	8	22	Alcali minerale	134	499
„ Salis concentratum	5	14	„ vegetabile mite depuratum	116	439
„ „ fumans	5	13	„ volatile siceum . . .	14	42
„ succinicum	8	23	Aloë lucida	12	34
„ „ empyreumaticum	8	23	„ socotrina	12	34
„ sulfuricum anglicanum	8	24	Alumen calcinatum	12	36
„ sulfuricum concentratum crudum	8	24	„ crudum	12	35
„ sulfuricum concentratum rectificatum	8	25	„ spongiosum	12	36
„ sulfuricum rectificatum dilutum . .	9	26	„ ustum	12	36
„ tannicum	9	27	Ammonia pura liquida . .	13	38
„ Tartari	10	28	Ammoniacum	13	37
„ tartaricum	10	28	Ammonium aceticum solutum concentratum . .	13	39
Aerugo crystallisata	52	183	Ammonium aceticum solutum dilutum	14	40
„ vulgaris	54	189	Ammonium carbonicum pyro - oleosum solutum	14	41
Aether aceticus	10	29	Ammonium carbonicum sicum	14	42
			„ carbonicum solutum	15	43
			„ chloratum crudum	15	44
			„ chloratum depuratum . . .	15	45
			„ chloratum depuratum solut.	224	11

	Pagina.	Numerus.
Ammonium chloratum fer-		
ratum . . .	15	46
" hydrosulfura-		
tum . . .	224	12
" muriaticum		
crudum . . .	15	44
" muriaticum de-		
puratum . .	15	45
" muriaticum		
martiatum . .	15	46
" succinicum py-		
ro-olcosum .	16	47
Amygdalae amarae . . .	16	48
" dulces . . .	16	49
Amygdalinum	17	50
Amylum Marantae . . .	17	51
" Tritici	17	52
Antidotum Arsenici albi .	77	293
" " " .	127	475
Antimonium crudum . .	190	736
" oxydatum .	189	734
Aqua Amygdalarum ama-		
rarum concentrata	18	53
" Amygdalarum ama-		
rarum diluta . . .	18	54
" Anisi	18	55
" antihysterica foetida	18	56
" antimiasmatica Köch-		
lini composita . .	54	188
" antimiasmatica Köch-		
lini simplex . . .	54	186
" aromatica spiritiosa	19	57
" Aurantii florum . .	19	58
" Caleariae	19	59
" Calcis	19	59
" carminativa regia .	20	61
" " simplex	20	60
" Carvi	20	62
" Castorei	21	63
" Cerasorum nigrorum	21	64
" Chamomillae . . .	21	65

	Pagina.	Numerus.
Aqua Chlorig	21	66
" Cinnamomi simplex	22	67
" " spiritiosa	22	68
" Cochleariae	22	69
" destillata simplex .	22	70
" Foeniculi	22	71
" foetida Pragensis .	18	56
" fortis	7	19
" Fragorum	22	72
" Goulardi	25	92
" hydrosulfurata . .	224	15
" Juniperi	23	73
" Kreosoti	23	74
" Lavandulae	23	75
" Laurocerasi	23	76
" laxativa Viennensis.	115	434
" Melissae	23	77
" Menthae crispae .	23	78
" " piperitae .	23	79
" Naphae	19	58
" oxymuriatica . . .	21	66
" Persicae foliorum .	24	80
" Petroselini	24	81
" phagedenica decolor	24	82
" " lutea .	24	83
" plumbica	24	84
" regia	4	10
" Rosarum	24	85
" Rubi Idaci	25	87
" Rutae	25	86
" Salviae	25	88
" Sambuci	25	89
" Thedenii	25	93
" Tiliae	25	90
" Valerianae	25	91
" vegeto - mineralis		
Goulardi	25	92
" vulneraria acida		
Thedenii	25	93
" vulneraria cum al-		
cohole	26	94

	Pagina.	Numerus.
Aqua vulneraria spiritiosa	26	94
Aquila alba	111	423
Arcanum duplicatum . .	120	448
Argentum foliatum . . .	26	95
" nitricum cry-		
stallisatum . .	26	96
" nitricum fusum	27	97
" " "		
solutum . . .	224	16
" purum . . .	27	98
Arrow-root	17	51
Arsenicum album	28	99
Asa dulcis	33	118
" foetida	28	100
Atropinum	28	101
Aurum natronato-chlorat-		
tum	29	102
" natronato - muria-		
ticum	29	102
" praecipitatum pu-		
rum	29	103
Axungia porcina	30	104

B.

Baccae Ebuli	30	105
" Juniperi	30	106
" Lauri	30	107
" Mori	31	108
" Phytolaccae . .	31	109
" Ribis	31	110
" Rubi Idaei . . .	31	111
" Sambuci	31	112
" Spinae Cervinae .	32	113
Balsamum Araeci . . .	213	838
" Copaivae . . .	32	114
" Embryonis . . .	19	57
" Nucistae . . .	141	541
" Opodeldoc . .	126	469
" peruvianum ni-		
grum	32	115

	Pagina.	Numerus.
Balsamum vitae Hoffmanni	32	116
" vulnerarium		
Commendatoris	204	789
Baryta muriatica	33	117
" nitrica soluta . .	225	17
Baryum chloratum	33	117
" " solutum .	225	18
Benzoë	33	118
Bicarbonas Sodae	133	497
Bichromas kalieus	115	437
Bismuthum	33	119
" nitricum prae-		
cipitatum . . .	34	120
" subnitricum .	34	120
Bolus Armena	34	121
Boras Sodae	133	498
Borax depurata	133	498
" tartarisata . . .	120	450
" Veneta	133	498
Bulbus Allii	34	122
" Colehiei	35	123
" Scillae	35	124
Butyrum Antimonii	189	733
" Cacao	35	125
" recens	36	126

C.

Calcaria carbonica cruda	36	127
" " depurata	36	128
" caustica	36	129
" chlorata	36	130
" hypo-chlorosa .	36	130
" muriatica	37	133
" oxymuriatica .	36	130
" phosphorica .	37	131
" sulfurata	37	132
Calcium chloratum	37	133
" oxydatum	36	129
Calomel	111	423
Calx viva	36	129

	Pagina.	Numerus.		Pagina.	Numerus.
Camphora	37	134	Cetaceum	44	154
Candelae fumales	38	135	Charta exploratoria coe-		
Cantharides	38	136	rulea	225	19
Capilli Veneris	101	383	„ exploratoria lutea. .	225	20
Capita Papaveris	39	137	„ „ rubra	226	21
Capsicum	94	358	Chininum citricum	44	155
Capsulae Papaveris	39	137	„ hydrochloricum . . .	45	156
Carbo Ligni depuratus . .	39	138	„ muriaticum	45	156
„ Ossium	39	139	„ sulfuricum	45	157
„ Spongiae	39	140	Chloras kalicus	117	442
„ vegetabilis	39	138	„ Lixivae	117	442
Carbonas Ammoniae al-			Chloretum Hydrargyri . .	111	423
calinus	14	42	Chlorina liquida	21	66
„ Ammoniae pyro-			Chloroformium	45	158
oleosus solutus.	14	41	Cinchoninum sulfuricum . .	46	159
„ Ammoniae so-			Cineres elavellati calcinati	116	438
lutus	15	43	Cinnabaris factitia	114	430
„ Lixivae erudus	116	438	Cinnamomum acutum	50	173
„ „ purus	116	439	Citras Ferri oxydati	75	287
„ Magnesiae	127	472	Coccionella	46	160
„ Sodae acidulus.	133	497	Colla piscium	114	432
„ „ alcales-			Collodium	46	161
cens	134	499	Colophonium	47	162
„ Sodae siccus	134	500	Conchae marinae	47	163
Caricae	40	142	„ praeparatae	47	164
Carragheen	40	141	Conserva Rosarum	47	165
Caryophylli	40	143	Corallium rubrum	47	166
Cassia fistula	40	144	Cornu Cervi ustum album	144	556
Castoreum	41	145	„ „ „ nigrum	39	139
Cataplasma ad decubitum	150	581	Cortex Aurantiorum	47	167
Catechu	42	146	„ Casearillae	48	168
Causticum antimoniale . .	189	733	„ Cassiae Cinnamo-		
Cera alba	42	147	meae	48	169
„ flava	42	148	„ Cassiae lignae		
Ceratum Cetacei	42	149	droguistarum Vien-		
„ citrinum	43	150	neusium	48	169
„ fuseum	43	151	„ Chinae fuseus	49	170
„ ad labia flavum	43	152	„ „ regius	49	171
„ „ „ rubrum	43	153	„ „ ruber	50	172
Cerussa	149	578	„ Cinnamomi Zeyla-		
„ veneta	149	578	nici	50	173

	Pagina.	Numerus.
Cortex Citri	50	174
„ Granati radiceis . .	50	175
„ Mezerei	51	176
„ Nucum Juglandis . .	51	177
„ Nucum Juglandis interior	155	600
„ Nucum Juglandis viridis exterior . .	51	177
„ peruvianus	49	170
„ Quereus	51	178
„ Salicis	51	179
„ Simarubae	52	180
Crème céleste	213	839
Cremor Tartari	120	449
„ „ boraxatus	120	450
„ „ solubilis	120	450
Creta alba	36	127
„ depurata	36	128
Crocus austriacus	52	181
„ gallicus	52	181
Crystalli Tartari	120	449
Cubebae	52	182
Cuprum acetieum crystalli- satum	52	183
Cuprum aluminatum . . .	53	184
„ ammoniacale	55	191
„ chloratum ammo- niacale solutum concentratum	53	185
„ chloratum ammo- niacale solutum dilutum	54	186
„ chloratum ammo- niacale cum Hy- drargyro solutum concentratum	54	187
„ chloratum ammo- niacale cum Hy- drargyro solutum dilutum	54	188
„ subaceticum crudum .	54	189

	Pagina.	Numerus.
Cuprum sulfuricum	54	190
„ „ ammoniatum . . .	55	191

D.

Decoctum Nucum Juglan- dum compositum	55	192
„ Pollini	55	192
„ Sarsaparillae compositum for- tius	55	193
„ Sarsaparillae compositum mitius . .	56	194
„ Zittmanni fortius . . .	55	193
„ „ mitius	56	194
Deuto - Joduretum Hy- drargyri	111	422
Draco mitigatus	111	423

E.

Ebur ustum	39	139
Elacosaccharum Anisi . .	56	195
„ Aurantiorum	57	196
„ Citri	57	197
„ Macis	57	198
„ Vanillae	57	199
Electuarium anodynum . .	58	201
„ aperiens	58	202
„ aromaticum	57	200
„ „ eum Opio	58	201
„ lenitivum	58	202
„ stomachicum	57	200
Elemi	58	203
Elixir acidum Halleri . .	126	470
Elixirium roborans Whytii	205	797
„ Vitrioli Myn- siehti	203	786
Emplastrum ad hernias . .	63	216
„ „ rupturas	63	216

	Pagina.	Numerus.		Pagina.	Numerus.
Emplastrum album . . .	60	206	Emulsio amygdalina . . .	64	218
„ anglicanum . . .	59	204	„ communis . . .	64	218
„ Cantharidum . . .	59	205	„ Olei Amygdala-		
„ Cantharidum per-			rum	64	219
petuum	61	210	„ oleosa	64	219
„ Cerussae	60	206	Ergotina	73	273
„ Cicutae	60	207	Euphorbium	65	220
„ citrinum	43	150	Explementum ad dentes .	65	221
„ Conii maculati . . .	60	207	Extractum Absynthii . .	65	222
„ de Galbano ero-			„ Aconiti	66	223
catum	61	211	„ Acori	66	224
„ de Meliloto	62	213	„ Aloës	66	225
„ diachylon com-			„ amaricans com-		
positum	60	208	positum	66	226
„ diachylon gum-			„ Angelicae	66	227
miresinosum	60	208	„ Arnicae florum . . .	66	228
„ diachylon sim-			„ „ radicis	67	229
plex	61	209	„ Belladonnae	67	230
„ Euphorbii	61	210	„ Calendulae	67	231
„ fuscum	62	214	„ Cardui benedicti . . .	67	232
„ glutinosum	59	204	„ Cascarillae	67	233
„ Hydrargyri	61	212	„ Centaurii mi-		
„ Lithargyri com-			noris	67	234
positum	60	208	„ Chamomillae	67	235
„ Lithargyri sim-			„ Chelidonii ma-		
plex	61	209	joris	67	236
„ mercuriale	61	212	„ Chinae fuscae	68	237
„ Minii adustum . . .	62	214	„ Cichorei	68	238
„ noricum	62	214	„ Cinae	68	239
„ oxycroceum	63	215	„ Conii maculati	68	240
„ Plumbi compo-			„ Colombo	68	241
situm	60	208	„ Cubebae	69	242
„ Plumbi simplex . . .	61	209	„ Digitalis	69	243
„ saponatum	64	217	„ Duleamarum	69	244
„ saponato - cam-			„ Elaterii	69	245
phoratum	64	217	„ Fellis Tauri	75	285
„ spermatis Ceti . . .	42	149	„ Ferri pomati	71	260
„ vesicatorium or-			„ Filicis maris	69	246
dinarium	59	205	„ Fumariae	69	247
„ vesicatorium per-			„ Gentianae	69	248
petuum	61	210	„ Graminis	70	249

	Pagina.	Numerus.
Extractum Guajaci ligni .	70	250
„ haemostaticum	73	273
„ Hellebori nigri	70	251
„ Hyosciami folio- rum	70	252
„ Hyosciami semi- num	70	253
„ Juglandis folio- rum	70	254
„ Juglandis nucum	70	255
„ Lactucæ viro- sæ	70	256
„ Liquiritiæ li- quidum . . .	70	257
„ Liquiritiæ sic- cum	71	258
„ Lupuli . . .	71	259
„ Malatis Ferri .	71	260
„ Martis cum succo pomorum . .	71	260
„ Mezerei . . .	71	261
„ Millefolii . .	72	262
„ Nucis Vomicae	72	263
„ Opii	72	264
„ Punicae granati	72	265
„ Quassiae . .	72	266
„ Ratanhiae . .	72	267
„ Rhei	72	268
„ Salviae . . .	72	269
„ Saponariae .	72	270
„ Sarsaparillae .	73	271
„ Saturni . . .	149	577
„ Scillae . . .	73	272
„ Secalis cornuti	73	273
„ Taraxaci . .	73	274
„ Trifolii fibrini	73	275
„ Tormetillae .	73	276
„ Valerianae .	73	277

F.

	Pagina.	Numerus.
Faba Cacao	175	672
„ febrifuga	73	278
„ St. Ignatii . . .	73	278
Farina Fabarum . . .	74	279
„ Foeni graeci . .	74	280
„ Lini placentarum	74	281
„ „ seminum .	74	282
„ secalina	74	283
„ Sinapis seminum	74	284
Fel Tauri inspissatum .	75	285
Ferrum carbonicum sac- charatum . . .	75	286
„ citricum . . .	75	287
„ jodatum saccha- ratum	75	288
„ lacticum . . .	76	289
„ limatum . . .	76	290
„ oxydato - oxydu- latum	76	291
„ oxydatum aceti- cum liquidum .	77	292
„ oxydatum hydri- cum in aqua .	77	293
„ oxydatum nati- vum rubrum . .	78	294
„ phosphoricum oxydatum . .	78	295
„ phosphoricum oxydulatum . .	78	296
„ pulveratum . .	79	297
„ sesquichloratum crystallisatum .	79	298
„ sesquichloratum solutum . . .	79	299
„ sesquichloratum solutum . . .	226	24
„ sulfuratum . .	226	25
„ sulfuricum oxy- dulatum . . .	80	300

	Pagina.	Numerus.		Pagina.	Numerus.
Flavedo corticis Auran-			Folia Cochleariae . . .	86	324
tiorum . . .	48	167	" Digitalis . . .	86	325
" corticis Citri .	50	174	" Farfarae . . .	86	326
Flores Arnicae . . .	80	301	" Hepaticae . . .	86	327
" Aurantii . . .	81	302	" Hyosciami . . .	87	328
" Benzoës . . .	3	8	" Juglandis . . .	87	329
" Boraginis . . .	81	303	" Laurocerasi . . .	87	330
" Brayerae . . .	81	304	" Malvae . . .	87	331
" Calendulae . . .	81	305	" Melissaе . . .	88	332
" Chamomillae vul-			" Menthae crispae .	88	333
garis . . .	82	306	" " piperitae	88	334
" Chamomillae roma-			" Nicotianae . . .	88	335
nae . . .	82	307	" Persicae . . .	89	336
" Cyani . . .	82	308	" Pulmonariae . .	89	337
" Koussou . . .	81	304	" " maculatae	89	337
" Lavandulae . . .	82	309	" Rosmarini . . .	89	338
" Lili albi . . .	83	310	" " hortensis	89	338
" Malvae . . .	83	311	" Salviae . . .	89	339
" Naphae . . .	81	302	" Scabiosae . . .	89	340
" Papaveris Rhoea-			" Scolopendrii . .	90	341
dos . . .	83	312	" Sennae alexandrinae	90	342
" Rosarum . . .	83	313	" " sine resina	90	343
" Salis ammoniaci			" Stramonii . . .	90	344
martiales . . .	15	46	" Taraxaci . . .	91	345
" Salis ammoniaci			" Theae . . .	91	346
simplices . . .	15	45	" Toxicodendri . .	91	347
" Sambuci . . .	83	314	" Trifolii fibrini . .	92	348
" Sulfuris loti . .	194	748	" Uvae ursi . . .	92	349
" " venales . .	194	749	" Vineae pervineae	92	350
" Tiliae . . .	84	315	Formica rufa . . .	92	351
" Verbasei . . .	84	316	Fraga . . .	93	352
" Violarum . . .	84	317	Frondes Sabinae . . .	93	353
" viridis aeris . .	52	183	" Taxi . . .	93	354
" Zinei . . .	220	865	" Thujae oeciden-		
Folia Althaeae . . .	84	318	talıs . . .	93	355
" Anthos . . .	89	338	Fructus Anisi stellati . .	93	356
" Arnicae . . .	84	319	" Aurantii . . .	94	357
" Aurantii . . .	85	320	" Capsici annui . .	94	358
" Belladonnae . . .	85	321	" Cerasorum nigro-		
" Cardui benedicti .	85	322	rum . . .	94	357
" Cichorei . . .	85	323	" Citri . . .	94	360

	Pagina.	Numerus.
Fructus Colocynthis	95	361
„ Elaterii	95	362
„ Pruni siccati	95	363
„ Tamarindi	95	364

G.

Galbanum	96	365
Gallae Quercus turcicae	96	366
Gelatina Carragheen	96	367
„ Lichenis islandici	97	368
„ Lichenis islandici pulverata	97	369
„ Liquiritiae pellu- cida	97	370
Gemmae Populi	98	371
Glandes Quercus	98	372
„ „ tostae	98	373
Globuli martiales	117	443
Grana Tiglli	176	679
Graphites	98	374
„ elutriatus	98	375
Guajacum nativum	99	377
Gummi Ammoniacum	13	37
„ arabicum	99	376
„ Gambiense	122	456
„ Guajaci	99	377
„ Guttae	100	379
„ Mimosae	99	376
Gummiresina Asae foe- tidae	28	100
Gutta Percha	99	378
Gutti	100	379

H.

Helminthochorton	100	380
Hepar Sulfuris calcareum	37	132
„ „ kalinum	122	454
„ „ vulgare	122	455
Herba Absinthii	100	381

	Pagina.	Numerus.
Herba Aconiti	100	382
„ Adianti	101	383
„ Asteri montani	101	384
„ Belladonnae florida	101	385
„ Calendulae	102	386
„ Cannabis	102	387
„ Centaurii minoris florida	102	388
„ Chelidonii majoris	102	389
„ Chenopodii ambro- sioidis	103	390
„ Conii maculati	103	391
„ Equiseti	103	392
„ Fumariae	103	393
„ Galeopsidis grandi- florae	104	394
„ Gratiolae	104	395
„ Hepaticae nobilis	86	327
„ Hyssopi	104	396
„ Jaceae	104	397
„ Lactucae virosae	105	398
„ Linariae	105	399
„ Linguae cervinae	90	341
„ Lobeliae inflatae	105	400
„ Majoranae	105	401
„ Marubii albi	106	402
„ Meliloti florida	106	403
„ Millefolii florida	106	404
„ Origani	106	405
„ Polygalae amarae	106	406
„ Pulegii	107	407
„ Pulsatillae	107	408
„ Rutae	107	409
„ Saponariae	107	410
„ Satureiae	108	411
„ Scolopendrii	90	341
„ Scordii	108	412
„ Serpylli florida	108	413
„ Spilanthi	109	414
„ Tanacetii florida	109	415
„ Valerianae celticae	109	416

	Pagina.	Numerus.
Herba Violae tricoloris . . .	104	397
Herbae Liberianae . . .	104	394
Hirudines	109	417
Hordeum crudum . . .	110	418
„ perlatum . .	110	419
Hydrargyrum admidato-		
bichloratum	110	420
„ ammoniato-		
muriaticum	110	420
„ bichloratum		
ammoniatum	110	420
„ bichloratum		
corrosivum	110	421
„ bijodatum		
rubrum . .	111	422
„ chloratum		
mite . . .	111	423
„ jodatum fla-		
vum . . .	112	424
„ muriaticum		
corrosivum	110	421
„ muriaticum		
mite . . .	111	423
„ oxydatum		
rubrum . .	112	425
„ oxydulatum		
nigrum Hah-		
nemanni .	112	426
„ perchlora-		
tum . . .	110	421
„ perjodatum	111	422
„ rectificatum	113	427
„ stibiato-sul-		
furatum .	113	428
„ subjodatum	112	424
„ sulfuratum		
nigrum . .	113	429
„ sulfuratum		
rubrum fac-		
titium . .	114	430
Hydrochloras Calcariae .	37	133

	Pagina.	Numerus.
Hydrojodas Lixivae . .	121	453
Hydromel infantum . .	114	431

I.

Ichthyocolla	114	432
Indicum	114	433
Infusum laxativum . . .	115	434
„ Rhei cum Natro		
carbonico . . .	209	820
„ Sennae composi-		
tum	115	434
Jodum	115	435

K.

Kali aceticum solutum .	115	436
„ bichromicum crudum	115	437
„ borussicum . . .	121	452
„ carbonicum crudum	116	438
„ „ e Tartaro .	116	439
„ „ purum . .	116	439
„ „ „ solutum	116	440
„ causticum fusum .	116	441
„ „ solutum .	226	27
„ chloricum	117	442
„ chronicum crudum .	115	437
„ ferrato-tartaricum .	117	443
„ ferroso - hydrocyani-		
cum	121	452
„ hydricum fusum . .	116	441
„ hydrojodicum . . .	121	453
„ hydrojodonicum . .	121	453
„ muriaticum oxygena-		
tum	117	442
„ natronato - tartaricum	118	444
„ nitricum depuratum	118	445
„ „ fusum .	119	446
„ oxymuriaticum . .	117	442
„ stibiato-tartaricum .	119	447
„ sulfuricum	120	448
„ tartaricum acidum de-		
puratum	120	449

	Pagina.	Numerus.
Kali tartaricum boraxatum	120	450
„ tartaricum neutrum	121	451
Kalium ferro-cyanatum		
flavum	121	452
jodatum	121	453
sulfuratum	122	454
„ pro balneo	122	455
Kermes minerale	191	737
Kino	122	456
Kreosotum	122	457

L.

Lac Sulfuris	193	747
Lactas Ferri	76	289
„ Oxyduli Ferri cum		
aqua	76	289
Laetucarium	123	459
Lapides Canerorum	123	459
„ „ prae-		
parati	123	460
Lapis causticus Chirur-		
gorum	116	441
„ divinus	53	184
„ Haematites	78	294
„ infernalis	27	97
„ Pumex	124	461
Laudanum liquidum Sy-		
denhami	208	815
Lichen Carragheen	40	141
„ islandicus	124	462
Lignum Guajaci	124	463
„ Juniperi	124	464
„ Quassiae surina-		
mense	125	465
„ sanctum	124	463
„ Santali rubrum	125	466
„ Sassafras	125	467
Limatura martis alcoholi-		
sata	79	297
Linimentum ammoniatum	126	468

	Pagina.	Numerus.
Linimentum saponato-		
camphoratum	126	469
„ volatile	126	468
Liquor acidus Halleri	126	470
„ Ammonii acetici		
concentratus	13	39
„ Ammonii acetici		
dilutus	14	40
„ Ammonii carboniei	15	43
„ Ammonii carboniei		
pyro-oleosi	14	41
„ Ammonii caustici	13	38
„ Ammonii caustici		
anisatus	187	724
„ Ammonii caustici		
lavandulatus	187	725
„ Ammonii succiniei	16	47
„ anodynus mineralis		
Hoffmanni	183	709
„ anodynus martia-		
tus	186	718
„ Chlori	21	66
„ Ferri acetici	77	292
„ mercurialis	24	82
„ salis Tartari	116	440
„ terrae foliatae Tar-		
tari	115	436
Lithargyrum	150	580
Lixiva fusa	116	441
Lupulinum	71	259

M.

Macis	126	471
Magisterium Bismuthi	34	120
„ Jalappae	168	647
„ Sulfuris	193	747
Magnesia alba	127	472
„ calcinata	127	474
„ carbonica	127	472

	Pagina.	Numerus.
Magnesia hydrica . . .	127	475
„ Muriae . . .	127	472
„ pura . . .	127	474
„ sulfurica . .	127	473
„ „ soluta	227	29
„ usta . . .	127	474
„ „ in aqua .	127	475
„ vitrariorum .	128	477
Malicorium Aurantii . .	47	167
Maltum Hordei . . .	128	476
Manganum hyperoxydatum		
nativum . .	128	477
„ nativum . .	128	477
Manna calabrina can-		
nellata . . .	128	479
„ calabrina electa	128	478
„ metallorum . .	111	423
Mannitum	128	480
Marcasita	33	119
Massa pilularum Ruffi .	129	481
Mastiche	129	482
Mastix	129	482
Meconium	144	554
Medulla bovis praeparata	129	483
„ ossium praeparata	129	483
Mel	129	484
„ depuratum . . .	130	485
„ despumatum . . .	130	485
„ Rosarum	130	486
„ rosatum	130	486
Mellago Graminis . . .	70	249
Mercurius dulcis . . .	111	423
„ jodatus flavus	112	424
„ „ ruber	111	422
„ praecipitatus		
albus . . .	110	420
„ praecipitatus		
niger Hahne-		
manni . . .	112	426
„ solubilis Hah-		
nemanni . . .	112	426

	Pagina.	Numerus.
Mercurius sublimatus cor-		
rosivus . . .	110	421
„ vivus rectifica-		
tus	113	427
Minium	149	579
Mixtura oleosa	64	219
Morphina	130	487
Morphium	130	487
„ aceticum . .	130	488
„ hydrochloricum	131	489
„ muriaticum .	131	489
„ purum . . .	130	487
Moschus Tunquinensis .	131	490
Mucilago Cydoniorum se-		
minum . . .	132	491
„ Gummi arabici	132	492
„ Tragacanthae .	132	493
Murias Ammoniae . . .	15	44
„ „ purus . .	15	45
„ Auri et Sodae . .	29	102
„ Calcis	37	133
„ Ferri ammoniacalis	15	46
„ Hydrargyri corro-		
sivus	110	421
„ Hydrargyrimitis .	111	423
„ Morphii	131	489
„ Sodae	133	495
„ Stibii solutus . .	189	733
„ Zincii	218	860
Muscae hispanicae . . .	38	136
Muscus Carragheen . .	40	141
Myrrha	132	494

N.

Naphtha aceti	10	29
„ vegetabilis . .	10	29
„ Vitrioli	11	31
Natrium chloratum . . .	133	495
Natrum aceticum crystalli-		
satum	133	496

	Pagina.	Numerus.
Natrum bicarbonicum	133	497
„ boracicum purum	133	498
„ boricum	133	498
„ carbonicum cry-		
stallisatum	134	489
„ carbonicum siccum	134	500
„ „ solum	227	30
„ nitricum depura-		
tum	134	501
„ phosphoricum	134	502
„ „ solum	227	31
„ sulfuricum crystal-		
lisatum	135	503
„ sulfuricum siccum	135	504
Nitras Argenti	26	96
„ Lixivae depuratus	118	445
„ „ fusus	119	446
„ Sodae depuratus	134	501
Nitrum cubicum depura-		
tum	134	501
„ depuratum	118	445
„ tabulatum	119	446
Nuces Juglandis	135	505
Nuclei Cerasorum	135	506
Nux moschata	135	507
„ vomica	136	508

O.

Oculi Canerorum	123	459
Oleum Amygdalarum dul-		
cium	136	509
„ animale aethereum	136	510
„ „ Dippellii	136	510
„ „ foetidum	137	511
„ Anisi	137	512
„ anthelminticum		
Chaberti	137	513
„ Anthos	142	547
„ Aurantii florum	137	514

	Pagina.	Numerus.
Oleum Aurantiorum corti-		
cum	138	515
„ Bergamottae	138	516
„ Cacao unguinosum	35	125
„ Cajeputi depura-		
tum	138	517
„ camphoratum	138	518
„ Carvi	138	519
„ Caryophyllorum	138	520
„ Castoris	142	545
„ Cerae	138	521
„ Chamomillae	139	522
„ Cinnamomi	139	523
„ Citri	139	524
„ contra Taeniam	137	513
„ Cornu Cervi	137	511
„ Crotonis Tiglii	139	525
„ de Cedro	139	524
„ Foeniculi	139	526
„ Hyosciami folio-		
rum coctum	140	527
„ Hyosciami semi-		
num pressum	140	528
„ Jecoris Aselli em-		
pyreumaticum	140	530
„ Jecoris Aselli fla-		
vum	140	529
„ Jecoris Aselli fus-		
cum	140	530
„ Juglandis nucum	140	531
„ Juniperi baccarum	140	532
„ Lauri	140	533
„ Lavandulae	141	534
„ Liliorum	141	535
„ Lini seminum	141	536
„ Macidis	141	537
„ Majoranae	141	538
„ Martis	79	299
„ Menthae crispae	141	539
„ „ piperitae	141	540
„ Neroli	137	514

	Pagina.	Numero.
Oleum Nucis mosehatae	141	541
„ Olivarum . . .	142	542
„ Ovorum . . .	142	543
„ Palmae Christi .	142	545
„ Papaveris albi .	142	544
„ Petrae album .	146	567
„ „ rubrum	146	566
„ Ricini . . .	142	545
„ Rosarum . . .	142	546
„ Rosmarini . . .	142	547
„ Rutae . . .	143	548
„ Succini reetifica- tum	143	549
„ Tartari per deli- quium	116	440
„ Terebinthinae commune . . .	143	550
„ Terebinthinae ree- tificatum . . .	143	551
„ Valerianae . . .	143	552
„ Vitrioli anglicanum	8	24
„ „ depuratum	8	25
Olibanum	143	553
Opium purum	144	554
„ Smyrnaeum . .	144	554
Os Sepiae	144	555
Ossa calcinata	144	556
„ usta	144	556
„ „ alba	144	556
Ova gallinaecea . . .	144	557
Oxydulum Stibii hydrosul- furatum rubrum	191	737
Oxydum Arseniei album .	28	99
„ Hydrargyri . .	112	425
„ „ nitrico- ammoniacale .	112	426
„ Stibii	189	734
„ „ hydrosul- furatum aurantia- eum	190	735
Oxymel Colechiei . .	144	588

	Pagina.	Numero.
Oxymel Seillae	144	559
„ simplex	145	560

P.

Panaeaea mereurialis . .	111	423
Passulae minores . . .	145	560
Pasta Althaeae	145	563
„ eaustica Viennensis	145	562
„ gummosa albumi- nata	145	563
„ Liquiritiae flava .	146	564
Pastilli Bilinenses . . .	146	565
„ funales	38	135
Petroleum	146	566
„ reetificatum . .	146	567
Phosphorus	146	568
Phosphas ferrieus . .	78	295
„ ferrosus . . .	78	296
„ Sodae	134	502
Pilulae Augustini . . .	147	569
Piper nigrum	147	570
Piperinum	147	571
Pix liquida	147	572
„ navalis	148	573
„ nigra solida	148	573
Plumbago	98	374
Plumbum aetieum basi- eum solutum .	149	577
„ aetieum basi- eum solutum dilutum . .	24	84
„ aetieum cru- dum . . .	148	574
„ aetieum depu- ratum . . .	148	575
„ aetieum solu- tum	148	576
„ aetieum solu- tum	227	32
„ carbonicum .	149	578

	Pagina.	Numerus.
Plumbum hyperoxydatum		
rubrum . . .	149	579
oxydatum . .	150	580
tannicum . .	150	581
Poma acidula	150	582
Potassa	116	438
Potio antiemetica . . .	150	583
laxans Viennensis	115	434
Riveri	150	583
Protochloretum Hydrargyri	111	423
Protojoduretum Hydrargyri	112	424
Pulpa Cassiae	151	584
Prunorum	151	585
Tamarindorum . .	151	586
Pulvis aërophorus . . .	151	587
Seidlitzensis	152	588
alterans Plummeri	152	589
antihectico - scrofulosus	152	590
arsenicalis Hellmundi	152	591
Carthusianorum .	191	737
Cosmi	152	591
dentifricius albus	152	592
" niger	153	593
" ruber	153	594
Doweri	153	595
fumalis Dris Engel	153	596
" nobilis . .	154	597
" ordinarius	154	598
gummosus . .	155	599
Ipecacuanhae cum Opio	153	595
Nucum moschatarum compositus .	152	590
Plumeri	152	589
Putamen nucum Juglandis	155	600

R.

Radix Acori	157	608
Aleannae	155	601

	Pagina.	Numerus.
Radix Althaeae	155	602
Angelicae	155	603
Arnicae	156	604
Bardanae	156	605
Belladonnae	156	606
Caincae	157	607
Calami aromatici .	157	608
Caricis arenariae .	157	609
Caryophyllatae . .	158	610
Chinae nodosae orientalis	158	611
Cichorei	158	612
Colombo	159	613
Consolidae majoris	167	640
Curcumae	159	614
Enulae	159	615
Filicis maris . . .	160	616
Galangae	160	617
Gentianae	160	618
Graminis	161	619
Gratiolae	161	620
Helenii	159	615
Hellebori albi . . .	168	644
" nigri	161	621
Imperatoriae . . .	162	623
Inulae	159	615
Ipecacuanhae . . .	162	624
Ireos florentinae .	162	625
Jalappae	162	622
Lapathi acuti . . .	163	626
Levistici	163	627
Liquiritiae	163	628
Ononidis	163	629
Petroselini	164	630
Polypodii	164	631
Pyrethri	164	632
Ratanhiae	164	633
Rhabarbari	165	634
Rhei	165	634
Salep	165	635
Saponariae	165	636

	Pagina.	Numerus.		Pagina.	Numerus.
Radix Sarsaparillae . . .	166	637	Sal culinaris	133	495
„ Senegae	166	638	„ Epsomensis	127	473
„ Serpentariae Vir-			„ essentielle Benzoës . . .	3	8
ginianae	166	639	„ essentialis Gallarum . . .	5	12
„ Symphyti	167	640	„ essentielle Tartari . . .	10	28
„ Taraxaci	167	641	„ mirabilis dilapsus . . .	135	504
„ Torméntillae	167	642	„ „ Glauberi	135	503
„ Valerianae	167	643	„ „ perlatus	134	502
„ Veratri albi	168	644	„ „ siccus	135	504
„ Zedoariae	168	645	„ polychrestum Glaseri . . .	120	448
„ Zingiberis	168	646	„ „ Seignetti	118	444
Resina Benzoës	33	118	„ Prunellae	119	446
„ Jalappae	168	647	„ sedativus Hombergi . . .	4	9
„ Pini	201	777	„ Sedlicensis	127	473
Roob Boyveau Laffecteur . . .	170	650	„ Seignetti	118	444
„ Ebuli	169	648	„ Succini	8	23
„ Juniperi	169	649	„ Tartari	116	439
„ Mororum	170	651	„ thermarum Carolina-		
„ Sambuci	170	652	rum	172	660
„ Spinae Cervinae	170	653	Salicinum	172	659
Rotulae Menthae piperitae . . .	170	654	Sandaraca	172	661
„ Sacchari	171	655	Sanguis Draconis	172	662
S.			Santoninum	172	663
Saccharum album	171	656	Sapo albus	173	664
„ lactis	171	657	„ amygdalinus	173	665
„ Mannae	128	480	„ Venetus	173	666
„ Saturni cru-			„ viridis	173	667
dum	148	574	Scammonium	174	668
„ Saturni depu-			„ Haleppense	174	668
ratum	148	575	Sebum ovillum	174	669
„ Saturni solu-			Secale cornutum	174	670
tum	148	576	Semen Anisi	174	671
Sago	171	658	„ Cacao	175	672
Sal acidum Benzoës	3	8	„ Cardamomi	175	673
„ acidus Boracis	4	9	„ Carvi	175	674
„ amarus	127	473	„ Cinae	175	675
„ ammoniacum crudum	15	44	„ „ conditum	176	676
„ „ depuratum	15	45	„ Colchici	176	677
„ „ martiatum	15	46	„ Contra	175	675
„ Anglieus	127	473	„ Coriandri	176	678
			„ Crotonis Tiglii	176	679

	Pagina.	Numerus.		Pagina.	Numerus.
Semen Cydoniorum . .	176	680	Species Lignorum . .	182	707
„ Foeniculi vulgaris	177	681	„ pectorales . .	183	708
„ „ romani	177	682	„ resolventes . .	181	702
„ Foeni graeci . .	177	683	Sperma Ceti	44	154
„ Hyoseyami . . .	177	684	Spiritus Aetheris . .	183	709
„ Lini	177	685	„ „ chlorati	183	710
„ Lycopodii . . .	178	686	„ „ ferrati .	186	718
„ Melonum . . .	178	687	„ „ nitrici .	184	711
„ Papaveris albi .	178	688	„ „ sulfurici	183	709
„ Peponum . . .	178	689	„ Angelicae compo-		
„ Phellandrii aqua-			situs	184	712
tici	178	690	„ Anisi	185	713
„ Ricini	179	691	„ aromaticus . .	185	714
„ Sabadillae . . .	179	692	„ camphoratus . .	185	717
„ Santonici . . .	175	675	„ Carmelitarum .	185	714
„ Sinapis	179	693	„ Carvi	185	715
„ Stramonii . . .	179	694	„ Cochleariae . .	185	716
Semina Anisi stellati . .	93	356	„ Cornu Cervi rec-		
„ Badiani	93	356	tificatus	14	41
Serum lactis aluminatum	179	695	„ Cornu Cervi suc-		
„ „ commune	180	696	cinatus	16	47
„ „ Tamarindi-			„ Formicarum . .	186	719
natum	180	697	„ Juniperi . . .	186	720
Siliqua dulcis	180	698	„ Lavandulae . .	186	721
„ Vanillae	217	855	„ Melissa compo-		
Solutio arsenicalis Fow-			situs	185	714
leri	180	699	„ Menthae crispae	186	722
Species ad decoctum Lignorum	182	707	„ Mindereri . .	14	40
„ ad infusum pectorale	183	708	„ Nitri dulcis . .	184	711
„ Althacae . . .	181	700	„ Rosmarini . .	186	723
„ amaricantes . .	181	701	„ salis acidus . .	5	15
„ aromaticae . .	181	702	„ „ Ammoniaci		
„ „ pro ca-			anissatus . .	187	724
taplasmate . .	182	703	„ „ Ammoniaci		
„ emollientes . .	182	704	aquosus . .	15	43
„ „ pro ca-			„ „ Ammoniaci		
taplasmate . .	182	705	causticus . .	13	38
„ laxantes St. Ger-			„ „ Ammoniaci		
main	182	706	lavandulatus	187	725
			„ „ dulcis . .	183	710
			„ „ fumans . .	5	13

	Pagina.	Numerus.		Pagina.	Numerus.
Spiritus saponatus . . .	187	726	Sulfas Magnesiae . . .	127	473
„ Serpylli . . .	187	727	„ Sodae	135	503
„ Terebinthinae . . .	143	551	„ Zinci purus . . .	220	866
„ vini camphoratus . .	185	717	Sulfur auratum Antimonii	190	733
„ „ rectificatis-			„ citrinum	193	746
„ „ „ sinus . . .	187	728	„ depuratum	194	749
„ „ rectificatus . . .	187	729	„ praecepitatum . . .	193	747
„ „ rectificatus . . .			„ sublimatum crudum	194	748
„ „ dilutus . . .	188	730	„ „ lotum	194	748
„ Vitrioli	9	26	„ venale	193	746
Spodium	39	139	Sulfuretum Calcis . . .	37	132
Spongia marina	188	731	„ Hydrargyri sti-		
„ praeparata	188	732	„ biatum	113	428
„ pressa	188	732	„ Hydrargyri ni-		
„ strumalis	188	731	„ grum	113	429
„ usta	39	140	„ Lixivae	122	454
Stibium chloratum solutum	189	733	Suppositoria e butyro		
„ oxydatum	189	734	„ Cacao	195	750
„ sulfuratum auran-			Syrupus Acetositis Citri	195	751
„ tiacum	190	735	„ Althaeae	195	752
„ sulfuratum nigrum . .	190	736	„ amygdalinus . . .	195	753
„ „ rubrum	191	737	„ Aurantiorum cor-		
Stipites Dulcamarae . . .	191	738	„ ticum	196	754
Storax liquidus	192	743	„ Capillorum Ve-		
„ solidus	192	742	„ neris	196	755
Strobili Lupuli	191	739	„ Chamomillae . . .	196	756
Strychninum	192	740	„ Cichorei		
„ nitricum	192	741	„ Rheo	196	757
Styrax Calamita	192	742	„ Cinnamomi	197	758
„ liquidus	192	743	„ Citri	195	751
Succinum	193	744	„ Diacodii	197	759
Succus Catechu	42	146	„ emulsivus	195	753
„ Liquiritiae	193	745	„ Ferri jodati . . .	197	760
„ „ depuratus . . .	71	258	„ Foeniculi	198	761
Sulfas Aluminæ et Lixivæ			„ Kermesinus	198	762
„ cum aqua	12	35	„ mannatus	198	763
„ Aluminæ et Lixivæ			„ Menthæ	199	764
„ anhyder	12	36	„ Mororum	199	765
„ Cupri ammoniacalis .	55	191	„ Papaveris albi . .	197	759
„ „ crystallisatus . .	54	190	„ „ Rhocados . . .	199	766
„ Lixivæ	120	448	„ Phytolaccae . . .	199	767

	Pagina.	Numerus.
Syrupus Pomorum acidu-		
lorum	200	768
„ Rhoeados . .	199	766
„ Ribium . . .	200	769
„ Rubi Idaei . .	200	770
„ Sacchari . . .	200	773
„ Sambuci . . .	200	771
„ Sarsaparillae		
compositus . .	170	650
„ Scillae . . .	200	772
„ Sennae cum		
Manna	198	763
„ simplex . . .	200	773
„ Violarum . . .	200	774

T.

Tabulae de Althaea . .	201	775
Taffetas vesicans . . .	201	776
Tanninum	9	27
Tartarus boraxatus . .	120	450
„ depuratus . . .	120	449
„ emeticus	119	447
„ martiatus	117	443
„ natronatus	118	444
„ stibiatus	119	447
„ tartarisatus . . .	121	451
„ vitriolatus . . .	120	448
Tartras kalicus	121	451
„ Lixivae acidulus	120	449
„ „ et Antimonii	119	447
„ „ „ Ferri	117	443
„ „ „ Sodae	118	444
„ „ „ neuter	121	451
„ „ „ stibiatus . .	119	447
Taxus	93	354
Terebinthina cocta . .	201	777
„ communis	201	778
„ larigna	201	779
„ Veneta	201	779
Terra foliata Tartari cry-		
stallisata	133	496

	Pagina.	Numerus.
Terra Japonica	42	146
„ ponderosa salita . .	33	117
Theriaca	58	201
Thus	143	553
Tinctura Absinthii com-		
posita	202	780
„ Aloës	202	781
„ amara	202	782
„ anodyna simplex	208	816
„ Arnicae	203	784
„ „ florum	202	783
„ „ plantae		
totius	203	784
„ aromatica	203	785
„ aromatico-acida	203	786
„ Asae foetidae . . .	204	787
„ Aurantiorum cor-		
ticum	204	788
„ balsamica	204	789
„ Belladonnae . . .	204	790
„ Benzoës	204	791
„ Cantharidum . . .	205	792
„ Capsici	205	793
„ Castorei	205	794
„ Catechu	205	795
„ Chamomillae . . .	205	796
„ Chinae composita	205	797
„ „ simplex	206	798
„ Cinnamomi	206	799
„ Colchici seminum	206	800
„ Colocynthidum . .	206	801
„ Croci	206	802
„ Digitalis purpu-		
reae	206	803
„ Euphorbii	206	804
„ Ferri acetici ae-		
therea	207	805
„ Ferri pomati . . .	207	806
„ Guajaci	207	807
„ Jodi	207	809
„ Ipecacuanhae . . .	207	808

	Pagina.	Numerus.
Tinctura Lignorum . . .	207	810
„ Lobeliae inflatae	208	811
„ Macidis . . .	208	812
„ Malatis Ferri .	207	806
„ Myrrhae . . .	208	813
„ nervino - tonica		
Bestuschefii . .	186	718
„ Nucis vomicae .	208	814
„ Opii crocata . .	208	815
„ „ simplex .	208	816
„ Paraguay - Roux	209	822
„ Pulsatillae . .	209	817
„ Pyrethri . . .	209	818
„ Ratanhiae . . .	209	819
„ Rhei aquosa . .	209	820
„ Rhei vinosa Da-		
relii	209	821
„ Spilanthes oleracei		
composita . .	209	822
„ stomachica . .	202	782
„ Stramonii . .	210	823
„ Thujae occiden-		
talis	210	824
„ Valerianae . .	210	825
„ Vanillae . . .	210	826
Tragacantha	210	827
Trochisci Castorei . . .	211	828
„ Ipecacuanhae .	211	829

U.

Unguentum ad decubitus	150	581
„ ad phthiriasim	216	851
„ album simplex	212	834
Unguentum aromaticum .	211	830
„ Autenriethi .	211	831
„ basilicum . .	212	832
„ Calendulae flo-		
rum . . .	212	833
„ Cerussae .	212	834
„ citrinum . .	212	835

Unguentum contra pedicu-		
los	216	851
„ contra scabiem	217	853
„ digestivum .	213	836
„ Digitalis . .	213	837
„ Elemi . . .	213	838
„ emolliens . .	213	839
„ epispasticum	215	847
„ flavum . .	212	835
„ fuscum . .	43	151
„ Gemmarum Po-		
puli . . .	216	850
„ Hydrargyri ci-		
nereum . .	214	841
„ Hydrargyri ci-		
trinum . . .	214	840
„ Hydrargyri for-		
tius	214	841
„ Hydrargyri mi-		
tius	214	842
„ Hydrargyri ni-		
trici . . .	214	846
„ Juniperi . .	214	843
„ labiale . .	43	152
„ Linariae .	215	844
„ Lithargyri .	215	848
„ Macidis . .	215	845
„ Majoranae .	215	846
„ mercuriale for-		
tius	214	841
„ mercuriale mi-		
tius	214	842
„ Mezerci . .	215	847
„ Neapolitanum	214	842
„ nervinum . .	211	830
„ Plumbi acetici	215	848
„ pomadinum .	216	849
„ populeum .	216	850
„ rosatum . .	216	849
„ rubefaciens .	215	847
„ Sabadillae .	216	851

	Pagina.	Numerus.
Unguentum saturninum	215	848
„ simplex	216	852
„ sulfuratum	217	853
„ Tartari eme-		
tici	211	831
„ Tartari sti-		
biati	211	831
„ terebinthina-		
tum	217	854

V.

Vanilla	217	855
Veratrinum	217	856
Vinum Antimonii	218	859
„ Colehiei	217	857
„ emeticum	218	859
„ Malaccense	218	858
„ stibiato-tartaricum	218	859
Viride aeris	54	189
Vitriolum album depuratum	220	866
„ coeruleum	54	190
„ Cupri	54	190

	Pagina.	Numerus.
Vitriolum Martis	80	300
„ Zinci purum	220	866

Z.

Zahnkitt	65	221
Zincum borussicum	219	864
„ chloratum	218	860
„ crudum	218	861
„ cyanatum sine		
Ferro	218	862
„ depuratum	219	863
„ ferro-cyanatum	219	864
„ ferroso-hydrocya-		
nicum	219	864
„ hydrochloricum	218	860
„ hydrocyanicum	218	862
„ muriaticum	218	860
„ oxydatum	220	865
„ „ album	220	865
„ sulfuricum	220	866
„ valerianicum	220	867
Zingiber album	168	646



